VIII. 1. 3
52318/B
Antiqua
Zyt
D. XIII
18/E
390/17

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30498764

5238/B

48062

# NOUVEAU SISTEME DU MICROCOSME,

OU

## TRAITÉ DE LA NATURE DE L'HOMME:

Dans lequel on explique la cauſe du mouvement des fluides; le principe de la vie, du ſang & des humeurs; la generation, & les autres operations des parties du corps humain.

Par le Sr. DE TYMOGUE.

A LA HAYE,
Chez M. G. DE MERVILLE.

M. DCC. XXVII.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY



# A SON EXCELLENCE,

## MONSEIGNEUR

# LE DUC DE NOAILLES,

PAIR DE FRANCE, GRAND D'ESPAGNE, CHEVALIER DES ORDRES DU ROI, ET DE L'ORDRE DE LA TOISON D'OR, PREMIER CAPITAINE DES GARDES DU CORPS DU ROI, LIEUTENANT-GENERAL DE SES ARMÉES, CI-DEVANT COMMANDANT EN CHEF CELLES DE CATALOGNE, GOUVERNEUR ET CAPITAINE-GENERAL DES COMTÉS ET VIGUERIES DE ROUSSILLON, CONFLENT, ET CERDAIGNE, GOU-

habile ouvrier, pour briller avec tout leur éclat.

Votre amour, MONSEIGNEUR, pour ce qui peut éclairer l'esprit sur des effets naturels dont on a ignoré les vraies causes, ou sur des causes dont on n'a pas consideré les effets avec assez d'attention, me flate que ce Traité de Phisique ne Vous paroitra pas indigne d'occuper VOTRE EXCELLENCE dans quelques momens de son loisir. Je m'estimerois heureux, s'il pouvoit meriter son aprobation, persuadé que je suis qu'Elle ne me l'accorderoit que par un discernement qui s'attache au vrai, & qui ne prend point le change sur les seules aparences du vraisemblable.

Quelques systêmes que l'on ait établis, & même accrédi-

tés,

tés, touchant les matieres que je traite, il ne s'agit, MONSEIGNEUR, que de voir ſi ce que j'avance conduit ſurement à la fin que je me ſuis propoſée.

Si mes obſervations ſont juſtes, les préjugés du contraire ne prévaudront pas dans l'eſprit de ceux qui ſeront aſſez judicieux pour me ſavoir bon gré de m'être apliqué à des découvertes, qui leur auroient été inconnues, tant que je n'aurois ſuivi que les routes ordinaires. J'ai été obligé de m'en écarter, ſans néanmoins perdre de vue les Auteurs celèbres, que j'ai regardés comme des guides ſûrs pour y rentrer.

En me conformant, MONSEIGNEUR, à l'uſage des Epitres Dédicatoires, je devrois dans celle-ci Vous louer par ce ſang

noble & pur avec lequel les familles les plus anciennes, & les plus distinguées, ont contracté des alliances ; par ces triomphes & ces victoires qui ont fait rougir les plaines du *Roussillon* & de la *Catalogne* d'un sang ennemi ; par ces titres glorieux qui ont été la récompense de vos exploits militaires, & qui ont conservé le succès de votre valeur & de vos entreprises ; par l'estime de LOUIS XIV. de glorieuse memoire, & de son auguste Successeur, auprès duquel on n'est veritablement recommandable qu'autant que la probité, la sagesse, la fidelité, la prudence, & la solide vertu, l'ont fait meriter.

C'est, MONSEIGNEUR, ce qui est connu dans l'univers : c'est ce que la posterité ne pou-

ra

ra ignorer : c'eſt ce qu'un Orateur plus éloquent que moi exalteroit avec facilité, & ſans adulation. Mais l'impuiſſance où je ſuis de trouver des expreſſions dignes d'un ſi grand ſujet, me réduiſent à l'admirer.

Le Livre, MONSEIGNEUR, que j'ai l'honneur de Vous preſenter, fera connoître au Public, ſi Vous daignez le regarder d'un œil favorable, que V. E. dans ſon élévation, & dans la ſplendeur de ſon rang, ne mépriſe point un Auteur docile, qui ne ſoumet ſes lumieres aux ſiennes que pour en devenir plus capable de s'attirer ſa conſideration, en perfectionnant un Ouvrage dont l'entrepriſe lui paroiſſant d'une grande utilité, juſtifiera le zele & les bonnes intentions de celui qui a l'hon-

neur d'être avec le plus profond respect,

MONSEIGNEUR,

DE VOTRE EXCELLENCE,

Le très humble & très
obéissant serviteur,

DE TYMOGUE.

PRE-

# PREFACE.

LE *Traité du* Microcoſme, *ou* petit Monde, *que j'expoſe ici aux yeux du Public, & aux reflexions des Savans, n'eſt pas le fruit d'une imagination échauffée par la lecture d'un grand nombre d'Auteurs, ni l'effet d'un motif vain & ambitieux de me faire un nom, & un merite qui me diſtingue entre les Philoſophes, par la ſingularité & la nouveauté des principes que j'établis pour fondement de mon Ouvrage. Il m'importe peu que l'on me connoiſſe. Pourvu que je puiſſe produire quelque choſe qui ſoit utile, je ſerai aſſez content de moi-même, ſans rien attendre de la part des hommes.*

But de l'Auteur.

*Ce ne ſont point des idées vagues & incertaines que je propoſe, ni des principes inventés à plaiſir. Fondé ſur les connoiſſances que j'ai acquiſes par l'étude de la Nature, j'ai lieu de croire que ce ſont les vrais principes naturels que Dieu a créés, tels qu'ils ſont & qu'ils ſeront toujours, pour la production des Mix-*

Ses principes ſoutenus par d'anciens Philoſophes.

*Mixtes, & que les principes d'*Epicure, *par leſquels on prétend tout expliquer, n'ont jamais exiſté que dans l'idée de ceux qui les ont inventés, ou qui les ſuivent. Mes principes, qui ſont ceux de la Nature dont je ne fais qu'expliquer les productions dans le corps humain, ont été reconnus par des Philoſophes de l'Antiquité la plus reculée, & adoptés par ceux qui les ont ſuivis après l'écoulement de pluſieurs ſiècles. Cependant ceux qu'on a imaginés dans le dernier, ont prévalu, & ſont devenus à la mode, pendant que les premiers, que je renouvelle dans ce Traité, & dont la vieilleſſe étoit regardée comme un defaut, ont été rejettés & proſcrits, parceque la nouveauté plaît davantage, & que tout ce qui n'en porte pas le caractere n'eſt point gouté.*

Remarques ſur le goût du ſiècle.

*Tel eſt le genie qui règne aujourd'hui. Les idées, quelque naturelles qu'elles puiſſent être, ne ſont point reçues, ſi les explications qu'on en donne, ne ſont revétues des ornemens recherchés de la plus fine Réthorique, & de la plus ſubtile érudition. Il faut avec cela de la politeſſe & de l'énergie dans les expreſſions. En un mot les meilleures choſes, qui ſont deſtituées de ces agrémens, deviennent fades & inſipides à tout Lecteur qui ſe pique d'avoir de l'eſprit. On*

*ſe*

*ſe ſert même de comparaiſons, de raports, & de demonſtrations méchaniques, pour apuyer ſes ſentimens & ſes idées; & pendant que par un prétendu mouvement, on multiplie ſans néceſſité les figures, & les diverſes configurations & modifications des parties de la matiere, pour la forme & l'exiſtence des corps inanimés & animés, on laiſſe la Nature dans l'inaction; trop heureuſe encore ſi on lui donnoit quelque petite part dans la production des êtres: mais on veut au contraire que le mouvement & le hazard faſſent tout, ſans qu'elle y contribue en rien, ſinon par une ſoumiſſion aveugle au mouvement qui la dirige, & au hazard qui la détermine; nouveautés odieuſes qui ſont néanmoins ſuivies & adoptées par le plus grand nombre des Savans, & enſeignées dans les Ecoles publiques, comme des principes certains qu'on n'oſeroit révoquer en doute.*

Inſtabilité de l'eſprit humain, & conſtance de la Nature.

*Ils ſubſiſteront, ces principes, auſſi bien que le ſiſtême qui a déplacé la terre du centre du monde, où on l'avoit laiſſée en repos depuis tant de ſiècles, parcequ'il n'eſt pas aïſé, ſans miracles, ou ſans des demonſtrations, de faire revenir les hommes de leurs préventions; ils ſubſiſteront, dis-je, juſqu'à ce que d'autres principes d'une invention encore plus ſub-*

*ſubtile, ou plus naturelle, leur ſuccèdent, & que quelque petite pierre, ſe détachant d'une montagne, faſſe tomber ce nouveau ſiſtême fondé ſur l'argile, comme la ſtatue que vit en ſonge* Nabuchodonoſor. *Mais malgré les changemens & l'inſtabilité des diverſes opinions des hommes, la Nature demeurera ferme & conſtante, telle qu'elle a été, & qu'elle ſera toujours. Ses principes ſeront les mêmes, & ne changeront jamais; & ceux qui s'attacheront moins à l'étude des Auteurs qu'à celle de la Nature même, les découvriront, s'ils ſavent faire uſage des moyens qu'elle preſente, & qui ne ſont cachés qu'aux ignorans, & aux preſomptueux.*

Critique des opinions reçues.

*C'eſt l'aplication que je me ſuis donnée pour les connoître, qui me les a fait apercevoir, & qui m'a déterminé à expliquer leurs effets, & leurs productions. Je le ferai d'une maniere ſuccinte & d'un ſtile le plus ſimple & le plus intelligible qu'il me ſera poſſible. Je ne me flate pas de perſuader tout le monde de la certitude de mes principes, & de la vraiſemblance de mes idées; mais j'eſpere que les Savans d'entre les Modernes, qui ſont initiés dans les miſteres cachés de la Nature & de l'Art, ſeront de mon ſentiment, ainſi que ceux qui ſont moins prévenus*

*venus en faveur de la nouveauté, & qui ne s'y ſont pas arrêtés ſans former bien des doutes. Que les autres plus entétés ſe laiſſent bercer dans leurs idées ſur l'immenſité des cieux ; ſur le nombre & la diſtance indefinie des aſtres & de leurs tourbillons ; ſur leur grandeur & leur mouvement ; ſur ceux de la terre & de la lune, conſiderées comme Planettes ; ſur les trois prétendus élemens que le mouvement & le hazard ont produits du choc de la matiere premiere ; que ces Philoſophes, dis-je, ſe repoſent & s'endorment ſur le fonds de ces idées ſi merveilleuſes, ou qu'ils donnent carriere à leur eſprit ſur des choſes qui me paroiſſent ſi fort au deſſus de ma conception, je ne ſerai point de leur ſentiment. Ils diront & penſeront de moi tout ce qu'ils jugeront à propos ; je ſcai à quoi m'en tenir. J'ai découvert la verité que j'ai cherchée, & je l'ai découverte dans la voie ſimple de la Nature. Je pourois faire des demonſtrations, dont l'évidence prouveroit que ce qui paſſe aujourd'hui, au jugement des Savans, pour des paradoxes, eſt très veritable, & que les choſes qu'ils tiennent pour certaines, ne ſont que des paradoxes ; mais j'ai des raiſons pour remettre ces experiences à un autre tems.*

Je

Plan general de ce Traité.

*Je me borne dans ce Traité à décrire l'homme tel qu'il eſt par ſa nature, conſideré comme* Microcoſme, *ou* petit Monde; *tel qu'il eſt dans ſon principe, dans ſon progrès, & dans ſa fin. Cet Ouvrage eſt mon coup d'eſſai. Une critique judicieuſe diſcernera le bon du mauvais; & je ſaurai toujours gré à ceux qui me feront apercevoir mes fautes, dont je tâcherai de me corriger.*

Importance de connoître le corps humain.

*De toutes les connoiſſances dont l'homme eſt capable, il ne me paroît pas, après celle qui regarde le ſalut de ſon ame, qu'il y en ait une plus importante, plus digne de ſes recherches, & qui le touche de plus près que celle de ſon corps, & de ſa nature materielle. En effet de quelle importance ne nous eſt-il point de ſavoir ce qui ſe paſſe au dedans de nous; de quelle maniere nous ſommes produits, nous ſubſiſtons, nous multiplions notre eſpèce? C'eſt ce que je tâcherai d'expliquer dans ce Traité.*

Eloge de l'Abrégé d'anatomie de *Keill.*

*Je ſouhaite de tout mon cœur qu'il puiſſe être de quelque utilité. J'aurois pu m'étendre davantage ſur une matiere ſi importante, & ſur la deſcription de toutes les parties du corps humain, que j'ai omiſes, en raportant, pour apuyer mes ſentimens, les autorités des Philoſophes & des plus celèbres Anatomiſtes; & par là j'au-*

*j'aurois pu rendre cet Ouvrage plus complet : mais outre que je n'aime point les longs discours, le peu de tems que me laissent les occupations, & les devoirs de mon état, ne me le permettent pas. Si l'on veut être instruit de l'anatomie, afin de supléer à ce qui manque ici, on peut avoir recours à l'Abrégé de* Keill, *traduit par Mr.* Noguez, *Docteur en Médecine. C'est un excellent Livre, & un des plus exacts que nous ayons dans ce genre. Il a servi de plan à mon Ouvrage. Je ne me suis pas fait scrupule de le copier en beaucoup d'endroits ; je fais même gloire d'être son disciple sur beaucoup de choses, que j'aurois ignorées sans son secours. Mon Ouvrage n'a pas, je l'avoue, à beauconp près, autant d'érudition, d'ordre, & d'exactitude que le sien, si on en excepte le fonds de la matiere que je crois avoir pénétré, & expliqué plus particulierement que lui. Au reste, si je n'ai point cité d'Auteurs, c'est que je les ai moins étudiés que la Nature. C'est pourquoi, je tire d'elle toutes mes autorités pour apuyer mes sentimens.*

*On trouvera peut-être beaucoup de répétitions dans mon Ouvrage. Je les ai*

Excuses de l'Auteur pour son Ouvrage.

*ai cru néceſſaires pour faciliter l'intelligence de la matiere. Si je ſuis repréhenſible en ce point, j'eſpere que l'on me fera grace ſur l'aveu que j'ai déja fait, que cet Ouvrage eſt mon coup d'eſſai. On me la feroit d'autant plus volontiers, cette grace, ſi l'on me connoiſſoit, & ſi l'on étoit informé du peu de tems que j'ai employé à le compoſer. Je laiſſe à un chacun la liberté d'en dire ſon ſentiment. Si l'on en juge ſans prévention, on rendra juſtice à ce qu'il y a de bon, ſur lequel de plus habiles que moi pourront travailler plus utilement. Je me rendrai ce temoignage, que je n'ai agi que pour une bonne fin.*

Et envers les Savans dont il combat les opinions.

*Je n'ai point eu deſſein, en compoſant ce Traité, de révolter contre moi les Savans, que j'honore & que j'eſtime, mais bien de les faire revenir de leurs préventions, ſur des principes qui m'ont paru n'avoir aucun fondement ſolide. C'eſt donc contre ces principes que je me déclare. Je m'y ſuis cru autoriſé par une certitude morale & poſitive que j'ai de mes propres experiences, laquelle me fait preferer ceux des Anciens. Mais après tout, n'eſt-on pas libre d'expliquer ce que l'on penſe de la Nature, & n'eſt-il pas même expédient de ſe former des idées*

*dignes*

*dignes de la ſageſſe de ſon auteur, & qui puiſſent contribuer à ſa gloire? C'eſt le deſſein que je me ſuis propoſé, & qui m'a porté à répandre dans pluſieurs Chapitres des traits de Morale qui y ont quelque raport, parceque Dieu, qui eſt l'auteur de la Nature, eſt auſſi l'auteur de la Loi, & qu'on ne peut bien examiner, connoître, & expliquer la créature, ſans rendre la gloire qui eſt dûe au Créateur. Agir autrement, c'eſt s'égarer, & prendre le faux pour le vrai.*

# AVIS DU LIBRAIRE.

COmme les éclairciſſemens touchant un Livre anonime, ou pſeudonime, ſont ordinairement bien reçus, je me flate que le Public me ſaura quelque gré de lui aprendre à qui il doit celui-ci. L'Auteur avoit d'abord reſolu de ſe cacher, & moi-même j'ai cru long-tems qu'il s'apelloit effectivement Mr. DE TYMOGUE. Un Courier, dépéché à un Miniſtre, m'avoit aporté de *Paris* le Manuſcrit de cet Ouvrage, & mon Pere m'avoit ordonné de l'imprimer, en me marquant ſimplement que c'étoit un de ſes amis qui l'avoit compoſé. Il eſt vrai que je ne l'avois jamais vu en liaiſon avec perſonne qui portat ce nom-là; mais il pouvoit avoir fait de nouvelles connoiſſances, depuis ſept ans que ma mauvaiſe fortune m'a ſéparé de lui. Voi-

là

là tout ce que je ſavois, & je m'en contentois par reſpect pour la diſcrétion à laquelle mon Pere paroiſſoit s'être engagé envers l'Auteur.

Je mis donc ce Traité ſous preſſe; & un jour, comme je travaillois à ranger le titre à ma fantaiſie, pour le faire publier dans les Gazettes tel qu'il devoit être, il me vint dans l'eſprit que le mot DE TYMOGUE pouvoit bien être un nom ſupoſé, & peut-être l'anagrame de celui de l'Auteur. Je ne me trompois point; mais quelle fut ma ſurpriſe, lorſqu'après avoir derangé les lettres du mot DE TYMOGUE, j'y trouvai EDME GUYOT, qui eſt le nom de mon Pere? Une découverte ſi ſignificative, & l'interêt particulier que mon Pere me ſembloit prendre à cet Ouvrage, me perſuaderent qu'il venoit de lui; & je ne fus pas longtems ſans lui faire part des raiſons que j'avois de le croire. Je pris en même tems la liberté de lui repreſenter, que je ne voyois point d'inconvenient pour lui à ſe faire connoître. *Si votre Ouvrage eſt parfaitement bon*, lui diſois-je, *il vous fera honneur*; *& s'il ne l'eſt que médiocrement, du moins vous aura-t-on obligation d'avoir cherché la verité dans une ſcience dont vous ne faites pas profeſſion. Quoiqu'il en ſoit, on ſaura à qui parler, & cette connoiſſance, qui*

*ne manquera pas de vous procurer quelque entrevue avec nos Savans de* Paris, *vous mettra en état d'établir encore mieux votre ſiſtême, ou de le rectifier; en un mot de trouver cette verité ſi précieuſe, & de la découvrir aux autres.*

Mon Pere, peut-être trop prévenu pour mes raiſonnemens, gouta celui-ci; & après avoir encore eſſuyé quelques inſtances, il m'a enfin permis de le nommer. Je déclare donc ici que Mr. Guyot, Conſeiller du Roi, Preſident du Grenier à Sel, à *Verſailles*, eſt l'Auteur du *Traité du Microcoſme.*

Il ne me reſte plus qu'à prier les Lecteurs d'excuſer les fautes qui pouront ſe trouver dans cet Ouvrage. Comme mon Pere, qui ne vouloit point être connu, n'avoit pas eu la liberté de choiſir un bon Copiſte, ni le tems de corriger les fautes de celui auquel il a été obligé de ſe confier, parcequ'il ſouhaitoit que ſon Livre parût au commencement de l'année, je n'ai pu avoir une copie auſſi exacte que cela eût été néceſſaire, ſurtout pour une matiere tout à fait au deſſus de ma portée. Ainſi j'attends de l'équité des Savans, qui trouveront dans ce Traité des endroits defectueux, qu'ils voudront bien ſuſpendre leur jugement juſ-

qu'à

qu'à ce que mon Pere, aïant eu le Livre entre les mains, puiſſe les rectifier par un Avertiſſement que je l'ai prié de me donner, & que je placerai dans l'*Hiſtoire Litteraire de l'Europe* que j'imprime tous les mois. En attendant, je prie le Public de ſe contenter de l'*Errata* qui ſuit, & que j'ai dreſſé de moi-même, ou ſur les lumieres que mon Pere m'a données dans le cours de l'impreſſion, à l'égard de certains termes qui me cauſoient quelque ſcrupule.

# ERRATA.

Page 5. ligne 19. *ſe réuniſſent*, liſez *ſe remuent*. P. 8. l. 7. *qui le ſpécifie*, lif. *qui la ſpécifie*. & l. 14. *de la*, otez *la*. P. 13. l. 31. & P. 14. l. 4. *féve*, lif. *ſéve*. P. 19. l. 18. & 19. *& ces diverſes ſubſtances ſont*, lif. *& les diverſes ſubſtances de la terre & de l'eau ſont*. P. 26. l. 7. *de la Nature*, lif. *de la matiere*. P. 38. l. 3. & 4. *dans les orifices*, lif. *dans cet orifice*. P. 39. l. 9. *ſix fois auſſi long*, ajoutez, *que le ſujet dont on le prend*, & l. 14. *de l'extrême*, lif. *de l'externe*. P. 43. l. 13. *qu'au veſicule*, lif. *qu'à la veſicule*. P. 44. l. 27. *laquelle*, lif. *leſquelles*. P. 65. l. 11. *ſe contiennent*, lif. *ſe continuent*. P. 74. l. 31. & P. 75. l. 1. *répondant à tous*, lif. *qui ſe répandent dans tous*. P. 75. l. 13. *& animé*, otez *&*. P. 85. l. 26. & 27. *de cette diaſtole*, otez ces mots. P. 138. l. 2. *des veines*, lif. *des urines*. P. 151. l. 16. *capſulaires*, lif. *ſcapulaires*. P. 269. l. 3. *ſépare les parties*, lif. *ſépare par des eſquilles les parties*.

TABLE

# TABLE
## DES
# CHAPITRES.


CHAPITRE I. *Definition de l'homme.* Page 1

CHAP. II. *Des principes en general.* 7

CHAP. III. *Des quatre élemens, & des trois principes.* 15

CHAP. IV. *De l'esprit universel.* 21

CHAP. V. *Description de l'homme.* 28

CHAP. VI. *Description de la route des alimens, & du canal intestin.* 36

CHAP. VII. *Des principes du mouvement dans le corps animal, & de la construction des poumons.* 45

CHAP. VIII. *De la construction du cœur.* 57

CHAP. IX. *Des arteres en general.* 66

CHAP. X. *De la circulation du sang.* 76

CHAP. XI. *De la perfection du sang des arteres, & de son usage en general.* 90


CHAP.

CHAP. XII. *De l'uſage du ſang des arteres pour la ſenſation, & les fonctions des muſcles.* 95

CHAP. XIII. *Des mouvemens volontaires.* 102

CHAP. XIV. *De l'uſage du ſang des arteres pour les glandes deſtinées à la production des fluides néceſſaires à la diſſolution des alimens, pour le premier dégré de digeſtion dans l'eſtomac.* 110

CHAP. XV. *De l'uſage du ſang des arteres dans les glandes, pour la production de la bile, & des autres fermens qui contribuent à former le chyle, par un deuxieme dégré de digeſtion dans les inteſtins.* 122

CHAP. XVI. *De la cauſe, & de l'effet de la contraction extraordinaire, & contre Nature, de la veſicule du fiel, dans les fièvres reglées qui ont leur principe dans l'eſtomac.* 132

CHAP. XVII. *Des veines lactées, & de l'uſage du ſang des arteres & des glandes, pour la perfection du chyle, par le troiſieme & quatrieme dégré de digeſtion.* 141

CHAP. XVIII. *Des veines en general.* 148

CHAP. XIX. *De l'uſage du ſang des arteres dans les glandes, pour la production*

*duction du lait, & pour la mucosité des articulations.* 158
CHAP. XX. *Des parties de la generation en general.* 165
CHAP. XXI. *Dissertation sur les parties de l'homme destinées à la generation.* 173
CHAP. XXII. *Dissertation sur les parties de la femme destinées à la generation.* 188
CHAP. XXIII. *De la conception, de ses suites, & des parties qui se forment avec le fœtus.* 210
CHAP. XXIV. *De la nutrition du fœtus, de sa situation dans la matrice, & de ses differences d'avec les adultes.* 221
CHAP. XXV. *Des differentes productions des arteres spermatiques de l'homme & de la femme, & de l'origine de la spécification des deux sexes.* 227
CHAP. XXVI. *De l'origine de la difference des ressemblances, des affections, & des inclinations.* 239
CHAP. XXVII. *Idée generale de la lymphe.* 258
CHAP. XXVIII. *De l'origine de la lymphe, de son excellence & de ses propriétés.* 262
CHAP. XXIX. *De quelques effets remarquables*

*marquables & ſinguliers de la lymphe; de la tranſpiration naturelle, ou forcée, de ſon humeur ſuperflue par les pores de la peau.* 268

CHAP. XXX. *Explication de l'évacuation interne de la ſeroſité.* 273

CHAP. XXXI. *De l'urine, & des parties deſtinées à ſa ſéparation, & à ſon évacuation.* 285

CHAP. XXXII. *Des glandes contre Nature, & des croiſſances accidentelles du corps humain.* 293

CHAP. XXXIII. *Des productions vermineuſes du corps humain.* 300

NOU-

## EXPLICATION de la I.e Figure.

A. *La Trachée Artere par où l'air entre dans les poumons.*
BB. *Les poumons dilatés dans l'inspiration par l'impulsion de l'air.*
C. *Le diaphragme dilaté vers la region inferieure par les poumons.*
D. *Le ventre ou l'abdomen dilaté par le diaphragme.*
E. *Le coeur en systole.*
F.F. *Les oreillettes en diastole.*
G. *L'aorte descendante et toutes les arteres en diastole.*
HH. *Les reins.*
I. *La vessie dans sa tension naturelle.*

aaaa. *Bronches des poumons.*
b. *Tronc de la veine pulmonaire.*
c. *Tronc de l'aorte ou grande artere.*
d. *Tronc de la veine cave.*
e. *Tronc de l'artere pulmonaire.*
f. *La veine cave ascendante.*
g. *L'aorte descendante.*
h.h. *Veines emulgentes.*
i.i. *Arteres emulgentes.*
l.l. *Les uretaires où passe l'urine.*

m.m. *Les veines spermatiques.*
n.n. *Les arteres spermatiques.*

## EXPLICATION de la II.e Figure.

A. *La Trachée Artere par où l'air sort des poumons.*
BB. *Les poumons contractés par la puissance des fibres pour expulser l'air dans l'expiration.*
C. *Le diaphragme dilaté vers la region superieure par les muscles de l'abdomen.*
D. *Le ventre ou abdomen contracté par la puissance des fibres de ses muscles.*
E. *Le cœur en diastole.*
F.F. *Les oreillettes en systole.*
G. *L'aorte descendante et toutes les arteres en systole.*
HH. *Les reins.*
I. *La vessie contractée pour expulser l'urine.*
L. *La matrice.*
MM. *Ligamens de la matrice.*
N. *Le col de la matrice.*
aaaa. *Bronches des poumons.*
b. *Tronc de la veine pulmonaire.*
c. *Tronc de l'aorte ou grande artere.*
d. *Tronc de la veine cave.*
e. *Tronc de l'artere pulmonaire.*
f. *La veine cave ascendante.*
g. *L'aorte descendante.*
h.h. *Veines emulgentes.*
i.i. *Arteres emulgentes.*
l.l. *Les uretaires où passe l'urine dans la vessie.*
m.m. *Les veines spermatiques.*
n.n. *Les arteres spermatiques.*
o.o. *Les ligamens larges.*
p.p. *Les ovaires ou testicules.*
q.q. *Les trompes de fallope.*
r.r. *Les ligamens ronds.*
t.t. *Expansion en patte d'oye qui se termine dans les aines.*

I.e FIGURE, L'HOMME.




II.e FIGURE, LA FEMME.



# NOUVEAU SISTEME DU MICROCOSME, OU TRAITÉ DE LA NATURE DE L'HOMME.

## CHAPITRE I.

### *Definition de l'Homme.*

L'HOMME, que je prétends definir ici, eſt apellé par excellence *Microcoſme*, ou *petit Monde*, parcequ'il eſt un abrégé des merveilles du *Macrocoſme*, ou *grand Monde*. Il eſt compoſé de deux ſubſtances ; l'une ſpirituelle & l'autre corporelle.

CHAP. I.

Remarques sur l'ame de l'homme.

La substance spirituelle, ou l'ame de l'homme, est immaterielle & immortelle, créée à l'image de Dieu. Elle est très simple, & n'a point de parties. Elle est le principe interieur de toutes les operations du corps vivant. Elle y est répandue comme une lumiere, qui a son centre dans le cerveau d'où, comme d'un flambeau, partent tous ses rayons. Elle y reside ainsi que sur un trône, & c'est de là qu'elle commande à tous les membres. Son empire est tellement absolu sur le corps, que sa simple volonté, sans effort & sans préparation, en fait mouvoir sur le champ & immédiatement toutes les parties. On distingue dans l'ame sept principales propriétés, qui en sont les differentes modifications: l'entendement, la volonté, le sentiment, la liberté, la memoire, l'imagination, & les habitudes diverses qu'elle contracte.

Principes fondamentaux de son corps.

La substance materielle, ou le corps de l'homme, a deux principes fondamentaux qui reçoivent diverses modifications: l'un est l'eau, & l'autre la terre. Ils sont passifs & assujettis à l'action de l'air & du feu, qui les gouvernent. Cette double substance est ou fluide, ou solide. Celle qui est solide se divise en *parties similaires*, & *dissimilaires*, ou *organiques*.

CHAP. I.

A proprement parler, il n'y a d'autres *parties ſimilaires* que les fibres, dont toutes les autres parties ſont formées. On entend communément par *parties ſimilaires*, celles qui à nos ſens paroiſſent ſimples & d'une même eſpèce, & qui ſont deſtinées à la compoſition des *diſſimilaires*, ou *organiques*. Les parties qui portent le nom de *ſimilaires*, ſont les arteres, les veines, les nerfs, les membranes, les ligamens, les muſcles, les tendons, la graiſſe, les vaiſſeaux, les os, les cartilages, les ongles, les poils, & les glandes. Les autres parties s'apellent *diſſimilaires*, ou *organiques*.

Des parties ſimilaires & diſſimilaires.

On comprend ſous le nom de *fluides* le chyle, le lait, le ſang, la ſeroſité, la lymphe, les eſprits, la ſalive, la bile; le ſuc du pancréas, du ventricule, des inteſtins, de l'œſophage, du cerveau; les humeurs des yeux, de la poitrine, du pericarde, de l'abdomen, de la tunique vaginale, des teſticules, des proſtates, des veſicules ſeminaires; la mucoſité des narines, des amigdales, des articulations, de l'urètre, du vagin; ce qui diſtile de l'oreille; l'urine & la ſueur.

Des fluides.

Toutes ces diverſes ſubſtances apartiennent à la lymphe qui eſt l'élement humide, comme les ſolides apartiennent à

Cauſes de leur difference.

CHAP. I.

la terre. Elles en ſont par conſéquent des productions. Leur difference vient des matrices, où elles ont été produites, & qui les ont déterminées à être telles, pour ſervir aux divers uſages auxquels elles ſont deſtinées, ſelon les loix de la Nature. Elles ont auſſi pu contracter, dans les lieux où elles ont paſſé, des qualités qui ont contribué à leur difference.

L'homme chef-d'œuvre du créateur.

Le corps de l'homme, pétri de boue, eſt d'autant plus digne d'admiration que le ſceau de l'ouvrier, qui l'a formé, y eſt empreint. Il ſemble avoir pris plaiſir à faire un chef-d'œuvre avec une matiere ſi vile. Son habileté éclate encore plus dans les principes actifs, & dans les matrices qui forment & produiſent la diverſité des ſubſtances, dont cet ouvrage admirable eſt compoſé, que dans leurs differentes operations, qui entretiennent ſon être, & nous en font voir l'excellence & la perfection. Ainſi en remontant à la ſource, on reconnoît la ſageſſe, la pureté & la ſimplicité du Créateur; & quand même ce premier Etre n'auroit pas formé l'homme de ſes propres mains, au lieu qu'il a tiré du néant toutes les autres créatures, on n'en ſeroit pas moins convaincu que l'homme eſt veritablement ſon image, puis que ce premier Etre

Son excellence conduit à la connoiſſance de Dieu.

a raſſemblé en lui tout ce qu'il pouvoit y avoir de perfections réelles dans les deux diverſes manieres dont l'homme exiſte. CHAP. I.

Admirable union de l'ame & du corps.

Quoique l'ame & le corps ſoient ſi differens, ces deux êtres ſont néanmoins ſi intimement unis enſemble dans l'homme, & font un compoſé ſi juſte, qu'il y en a qui ont été tentés de croire que c'étoit un tout ſimple & indiviſible : ce qui ne peut être en cette vie, mais ſeulement dans l'autre, après la reſurrection generale.

Leur dépendance réciproque.

Tant que ce compoſé ſubſiſte en ſon entier, il y a une dépendance réciproque entre l'ame & le corps. Rien n'eſt plus abſolu que l'empire de l'ame ſur le corps. Quand elle veut, tous les membres du corps ſe réuniſſent à l'inſtant, comme s'ils étoient entrainés par les plus puiſſantes machines. D'un autre côté, rien n'eſt plus manifeſte que le pouvoir du corps ſur l'eſprit. Si le corps ſe meut par la ſenſation des objets, l'eſprit auſſi-tôt eſt forcé de penſer à ces objets avec plaiſir, ou avec douleur, & l'ame eſt aiſément entrainée vers eux, comme par un poids qui l'attire, & contre lequel elle peut cependant ſe roidir, ſi elle veut, pour éviter de ſe laiſſer porter à ce qui peut lui être nuiſible. Enfin ce

CHAP. I.

Leur difference.

compoſé, qui fait l'homme, ne peut ſubſiſter ſans l'union intime de ces deux êtres. Si l'ame en eſt ſéparée, le corps ſe détruit, & retourne dans la terre dont il a été formé; mais l'ame exiſte éternellement, & ne ſauroit être détruite.

## CHAPITRE II.

### *Des principes en general.*

L'HOMME, dans l'ordre de la création, a été la derniere créature qui a reçu l'être, comme la plus parfaite pour la fin que Dieu s'étoit propoſée. Il y a lieu de croire que ce divin architecte l'avoit principalement en vue, dans ſes idées éternelles, en donnant l'être aux autres créatures qui l'ont précédé, puis qu'il paroît qu'elles ont été faites pour l'homme, qui en a été comme le modele, non pas à la verité dans ſon être ſpirituel, fait à l'image de Dieu, quoiqu'il ſemble néanmoins avoir en cela quelque raport avec elles, ſur tout à l'égard des animaux ; mais dans ſon être materiel, & dans la production & la multiplication de ſon eſpèce ; en quoi il reſſemble beaucoup aux autres créatures, compriſes dans les trois familles de la Nature, ſavoir animaux, végétaux, & mineraux, qui ſont tous formés & compoſés, comme l'homme, d'un même principe & des mêmes élemens, & qui ne ſont diffe-

L'homme, modele des autres créatures qui ont été faites pour lui.

Raport entre lui & elles.

CHAP. II.

rens, quant à la matiere, que par les diverſes modifications qu'elle a reçues des principes qui l'ont déterminée & ſpécifiée; car pour ce qui regarde la maniere de ſe produire, elle eſt à peu près la même, puiſque rien ne ſe produit ſans ſemence, & ſans une matrice qui le ſpécifie.

Materiaux des corps.

Les materiaux qui ont été employés à la conſtruction des Mixtes, ou des corps, & qui ont formé dans les animaux la lymphe, & les fibres dont ils ſont compoſés, ſont les quatre élemens, & les autres ſubſtances de la terre & de l'eau, que l'on comprend ſous le nom de la matiere.

Principes des formes.

Les principes qui, comme des inſtrumens, dirigent, déterminent & ſpécifient la matiere, ſont particulierement unis & affectés à cette matiere: je les nomme *matrices*. Il y en a de pluſieurs genres, & d'une infinité d'eſpèces, de même qu'il y a dans la Nature une infinité de Mixtes divers, parfaits, ou imparfaits. Ces principes des formes ne peuvent rien produire d'achevé & de parfait, ni multiplier l'eſpèce avec la matiere ſeule, ſans être fécondés d'une ſemence, & munis d'une matiere convenable à chaque Mixte en particulier. Sans cela, & ſans une digeſtion & un régime requis, & proportioné à la nature de cha-

chaque choſe, ils ne produiſent que des monſtres, & des avortons. CHAP. II.

La ſemence de tous les Mixtes eſt une quinteſſence celeſte, unique en ſon eſpèce, qu'on apelle *eſprit univerſel*, ou *ame du monde*, qui eſt toute en toutes choſes, par ſa vertu qui ſe revèt de toutes les formes. C'eſt le principe de la vie & de la fécondité. Comme c'eſt une ſubſtance ſimple & très pure, & une production celeſte, le feu de la Nature eſt ſon véhicule, ſon domicile, & l'inſtrument dont cette même Nature ſe ſert pour réduire la matiere de puiſſance en acte, & pour mettre toutes choſes en évidence. Cette ſubſtance celeſte, qui fait tout, eſt néanmoins aſſujettie à l'action des élemens, & aux principes des formes, qui la déterminent, la ſpécifient & la gouvernent, chacun ſelon ſa vertu & ſon eſpèce. L'eſprit univerſel, ſemence des Mixtes.

Les *élemens* ſont le feu, l'air, l'eau & la terre. Des quatre élemens.

Il y en a de ſimples, & de compoſés.

Les *élemens ſimples* ſont des êtres complets dans leur eſpèce, & qui ont reçu leur perfection au moment de leur création. Nous les ſupoſons incorruptibles, & inalterables dans leur nature, permanens dans leurs formes, infinis dans leur durée, & conſtans dans leurs vertus. Elemens ſimples.

On doit conjecturer que ces *élemens*,

CHAP. II.

tels que nous les ſupoſons, étoient, dans leur ſimplicité premiere, unis avec des ſubſtances pures & incorruptibles, pour la production des créatures; mais que le péché d'*Adam* aïant attiré la malédiction de Dieu ſur lui, & ſur les créatures qui étoient déja formées, elles en porterent les taches, & que les ſubſtances, qui formoient auparavant des créatures incorruptibles, ſe trouvant corrompues, ſouillerent les *élemens*: ce qui produiſit la corruption & la mort dans celles qu'elles formerent & qu'elles nourirent dans la ſuite. Le feu, à la fin des tems, rétablira l'incorruptibilité & l'immortalité premiere, que le péché avoit banies, & détruira la corruption, à l'exception des réprouvés, en qui elle ſera tellement enracinée, que le feu éternel, qui agira ſur eux, ne pourra jamais l'anéantir.

Elemens compoſés.

Les *élemens compoſés* ſont ceux qui ſont perceptibles à nos ſens, & qui ſervent à nos uſages. Ils ſont formés des *élemens* ſimples, & des ſubſtances de la terre & de l'eau, qui leur ſervent de lien & d'envelope; & quoi qu'ils ſemblent être contraires, leurs operations dépendent néanmoins les unes des autres.

Trois principes produits

Les ſubſtances corruptibles de la terre & de l'eau, qui entrent dans la compoſi-

tion

tion des corps, s'uniſſent aux *élemens*, & forment avec eux les trois principes, *ſel*, *ſoufre* & *mercure*, leſquels on remarque dans tous les êtres ſublunaires. CHAP. II. par les élemens.

La matiere la plus pure de toutes les ſubſtances qui compoſent le globe de la terre, eſt celle qui ſert de bâſe, & de moyen néceſſaire pour la production des Mixtes.

Comme il y a dans la Nature une infinité de principes des formes, ou de *matrices* qui ſpécifient les êtres, il y en a auſſi de pluſieurs ſortes dans les animaux, & ſur tout dans l'homme, & dans la femme, non ſeulement pour la forme de l'eſpèce, mais auſſi pour la production des diverſes ſubſtances qui forment & entretiennent leur être. Differentes matrices dans les animaux.

Les *premieres matrices* qui reçoivent la ſemence pour la production de l'eſpèce, ſont les arteres ſpermatiques de l'homme, dans leſquelles ſe forme de cette ſemence une infinité de petits œufs, qui étant enſuite introduits dans les teſticules, produiſent une infinité de petits animaux ſemblables à des vers, ce qui doit être ainſi; car la Nature nous montre qu'un ver vient toujours d'un œuf, & qu'il faut un lieu & une chaleur convenable pour le faire éclore. Or cela convient mieux aux teſticules, dont la chaleur eſt plus Premiere matrice dans l'homme pour la generation.

tem-

CHAP. II.

temperée que dans les arteres ſpermatiques.

Deuxieme matrice.

Les teſticules ſont donc les *ſecondes matrices* où la ſemence prend la forme animale, & où chaque ver ſort de ſa coquille, comme le poulet de la ſienne.

Troiſieme matrice dans la femme.

La *troiſieme matrice*, c'eſt l'œuf de la femme, dans lequel un de ces petits vers s'introduit. C'eſt là qu'il croît pour ſe dépouiller enſuite de ſa forme exterieure de ver, laquelle il quite peu après qu'il eſt tombé, & qu'il a pris racine dans la matrice de la femme : *quatrieme* & derniere *matrice*, où il prend la forme humaine & le nom d'*embrion*, ou de *fœtus*, qui ſe manifeſte au jour, en tombant comme un fruit au bout de neuf mois, qui eſt le terme de ſa maturité.

Quatrieme matrice.

Autres matrices des femmes.

Les femmes ont auſſi des *matrices* particulieres dans la formation des œufs : les premieres ſont les *arteres* que l'on apelle improprement *ſpermatiques*, dans leſquelles elles reçoivent le principe de leurs œufs ; & les ſecondes ſont leurs *ovaires*, où ces œufs ſe produiſent. Mais quoique les œufs ſemblent être deſtinés uniquement à la production de l'eſpèce, ils ont néanmoins un autre uſage néceſſaire & important pour la ſanté, & pour être le ſigne de la vraie diſpoſition où il faut que ſoit la femme

pour

pour concevoir. Il tombe tous les mois un de ces œufs dans la matrice de la femme ; ce qui excite ſes règles, ou purgations, & qui marque ſa fécondité. CHAP. II.

Toutes ces *matrices* ſont deſtinées à la generation, & à la production de l'eſpèce. Il y a outre cela dans l'homme & dans la femme une infinité de glandes, qui ſont autant de *matrices*, deſtinées à la production des ſubſtances, & employées à divers uſages, ſoit pour la diſſolution & tranſmutation des alimens, ſoit pour former le chyle, le ſang, la lymphe, les humeurs, ou les parties ſolides de notre corps. Matrices communes dans l'homme & dans la femme pour la production de leurs diverſes ſubſtances.

Il y a auſſi une infinité de glandes dans les parties de la generation, dont la production facilite leurs operations, & le flus rapide de la ſemence dans le mouvement & l'action du coït, comme nous l'expliquerons en ſon lieu dans la ſuite de ce traité. Ce que nous avons dit de l'homme doit s'entendre, à peu près, de tous les autres animaux.

Les végétaux, comme moins parfaits que les animaux, n'ont que trois *matrices*: deux qui leur ſont propres & particulieres, & une qui leur eſt commune à tous, & qui eſt univerſelle. Trois matrices dans les végétaux.

La *premiere* de celles qui ſont propres à chacun d'eux, c'eſt leur féve, où l'eſ- Premiere matrice.

CHAP. II.

l'eſprit univerſel eſt introduit par le moyen de leur racine, laquelle le ſucce & l'attire de la terre. C'eſt dans cette féve où il ſe digere, & ſe ſpécifie.

Seconde matrice.

La *ſeconde matrice* eſt le grain, ou le noyau dans lequel eſt renfermée la vertu & propriété de produire un végétal de la même eſpèce.

Troiſieme matrice.

La *troiſieme matrice*, qui eſt commune à tous les végétaux, c'eſt la terre, dans laquelle la ſemence tombe, quand elle a acquis ſa maturité, & où elle ſe putrifie & végète. La même terre fournit, avec l'eau, les ſubſtances nutritives qui font croître le végétal, pour mettre en évidence ſon corps, ſes branches, ſes feuilles, ſes fleurs & ſes fruits.

Deux matrices dans les mineraux.

Les mineraux n'ont que deux *matrices*, ſavoir la terre minerale qui eſt particuliere & propre à chacun d'eux ; & la terre en general qui leur eſt commune à tous : ils n'ont qu'une même ſemence qui eſt l'eſprit univerſel, commun à tous les êtres.

## CHAPITRE III.

### *Des quatre élemens, & des trois principes.*

LEs quatre *élemens*, ſavoir le feu, l'air, l'eau & la terre, ſont les principes phyſiques qui entrent dans la compoſition de tous les corps, & par conſéquent dans celle de l'homme. Ils ſont des parties homogênes qui s'uniſſent enſemble, par les qualités qui leur conviennent : c'eſt de leur aſſemblage, & de leur union avec d'autres ſubſtances qui s'y mêlent, que ſont compoſés tous les êtres que nous voyons. Ils ne ſont pas tels que ceux que nous connoiſſons, qui ſont des corps compoſés & mêlangés d'autres ſubſtances, mais des corps ſimples & ſans mêlange, tels qu'ils ont été formés au moment de leur création. Ils ne ſont pas auſſi tous tels qu'on les a definis juſqu'à preſent : nous avons ſur cela une idée toute differente, que nous allons expliquer. De la nature des élemens.

L'idée la plus parfaite que nous puiſſions avoir des particules du *feu*, c'eſt qu'elles ſont liquides, de figure ſpherique, Qualités du feu.

CHAP. III.

que, égales, de qualité chaude & ignée en puiſſance, lumineuſes comme le ſoleil, étant de la même nature. Elles ne ſont point perceptibles à notre vue, à cauſe de leur petiteſſe, & parcequ'elles ſont ſéparées, & cachées dans les petits corps de l'air comme dans des étuis: elles y ſont tranquiles, ſans action, & comme engourdies, juſqu'à ce qu'elles ſoient miſes en mouvement par quelque cauſe agiſſante & déterminante, qui les remue. Elles ſont le domicile & le véhicule de l'eſprit univerſel, qui eſt la ſemence de toutes choſes. Elles paroiſſent à nos ſens plus ou moins chaudes, à proportion que le ſoleil les voit plus ou moins obliquement, & que les vapeurs humides de la terre lui font plus ou moins d'obſtacles, ou que les exhalaiſons chaudes ſont plus ou moins fortes: ce qui fait la difference de la chaleur, & du froid, que l'on reſſent en été & en hiver. En effet les vapeurs humides de la terre, qui ſont élevées dans la moyenne région de l'air, & qui forment les nuées que nous voyons, ſont congelées en neige, parceque la chaleur, qui vient de la terre, ne peut exciter celle de l'air de cette région, où elle ne ſauroit parvenir: ce qui fait qu'il y règne un froid extrême, auſſi-bien que ſur les hautes montagnes, lequel eſt cauſé

Ses proprietés.

Ses divers dégrés de chaleur.

sé par l'air, & les vents, surtout par ceux qui viennent d'ailleurs que des parties du *Midi*.

Qualités de l'air.

Les petits corps de l'*air* sont de figure cilindrique, secs, creux, roides, quoique flexibles, égaux, chauds en puissance dans leur interieur, par le feu qu'ils contiennent, & de couleur bleue: ce qui se connoît à celle du ciel & des lointains. Ils sont froids de leur nature, comme on le remarque lorsqu'ils sont agités par le vent, ou qu'ils ne sont point échauffés par la presence du soleil, ou du feu actuel: ce qui cause la fraicheur des nuits sous la Ligne, le soleil étant douze heures sous l'horison, & le grand froid vers les pôles. Ils souffrent avec peine le resserrement, & la compression dans une cavité, & se dilatent avec un effort violent qu'ils font pour se redresser, lorsqu'ils sont sur le point de recouvrer leur liberté.

Figure des corps de l'air.

Leur figure cilindrique se manifeste dans la congelation de l'eau, avec laquelle ils sont toujours mêlés, ainsi que dans celle des sels, & du salpêtre, qui se forment d'abord par des lignes droites, parceque l'air détermine l'eau à prendre sa figure. Le nitre étant un air congelé, rien ne peut le retenir lorsqu'il est allumé par un moyen inflammable, tel qu'est le charbon, ou le soufre, à cause de la contrariété de leurs qualités

CHAP. III.

à l'égard des ſiennes, & de ſon reſſort, qui lui fait occuper un eſpace infiniment plus grand que celui qu'occupoit le corps qu'il formoit auparavant. L'*air* eſt la cauſe par ſon poids du mouvement dans le corps animal, par ſon impulſion ſur les poumons. Il eſt ſuſceptible de l'humide par ſa ſechereſſe: il entre dans la compoſition de tous les corps qu'il penètre, & il les environne, ainſi que le globe de la terre qu'il rend fixe & arrétée par ſa preſſion au centre de l'univers.

Ses propriétés.

Qualités de l'eau.

L'*eau* eſt un corps fluide, compoſé de globules ronds, égaux, froids, humides au ſouverain dégré, & de couleur blanche. Elle eſt le menſtrue ſur lequel étoit porté l'eſprit du Seigneur. Par ſon froid & ſon humidité elle ſe joint facilement à l'air, & à la terre. C'eſt par le moyen de l'air qu'elle penètre les corps, & qu'elle diſpoſe les ſemences à produire leurs diverſes eſpèces, par le moyen d'une chaleur proportionée, qu'excite en elle le mouvement. Elle eſt limpide, ou diaphane, ainſi qu'on le voit dans la congelation.

Ses propriétés.

Qualités de la terre.

Les petits corps de l'*élement* de la *terre* ſont, ſuivant les aparences, de figure ou de forme cubique, égaux, froids & ſecs. Leur forme ſe manifeſte par la congelation des ſels, & ſurtout du ſel marin:

rin: du moins ils ont une inclination à former un cube. Par les qualités qui leur conviennent, ils s'uniſſent à l'eau, & à l'air, & aux autres ſubſtances terreſtres qui entrent dans la compoſition des Mixtes. Ils circulent avec les autres *élemens* dans la maſſe du globe de la *terre*, auſſi-bien que dans l'air que nous reſpirons: ce qui ſe remarque dans les *matrices* ſalines, & minerales, ou vitrioliques dépouillées, qui ſe rechargent abondament de ſel, & de vitriol, lorſqu'elles ſont expoſées à l'air.

CHAP. III. Ses propriétés.

Le *feu* eſt le véhicule de la ſemence; l'*air* eſt l'inſtrument & le réceptacle du *feu*; l'*eau* eſt le véhicule de l'*air*, & la *terre* par ſa vertu eſt leur aimant, leur bâſe, & leur commun réceptacle; & ſes diverſes ſubſtances ſont leur lien, & le moyen de leur union. De leurs actions ſont produits les trois principes, *ſel*, *ſoufre*, & *mercure*, qu'on remarque dans tous les Mixtes, après leur décompoſition, & dont tous les corps ſont formés; de ſorte qu'il ſe trouve dans les corps trois ſortes de figures parfaites des *élemens*, produites de l'immobilité du point, & de ſon mouvement; ſavoir le cercle, le quarré, & le cilindre. Cette derniere étant compoſée des deux autres, peut produire toutes les lignes courbes imaginables.

Accord des élemens.

Cauſe de la production des trois principes.

Trois figures parfaites dans les élemens.

CHAP. III.

Ajoutons que le point, la ligne & la ſuperficie, qui conſtituent ces trois figures, ont divers raports, provenans du nombre de trois, lequel renferme de grands miſteres.

Le *mercure*, le *ſoufre*, & le *ſel* étant la principale matiere des corps, celui de l'homme en eſt compoſé : néanmoins tout ſon être materiel ſe réduit à deux ſubſtances ; l'une qui eſt ſolide, formée de l'air & de la terre ; & l'autre qui eſt fluide, formée de l'eau, ſavoir la lymphe, véhicule univerſel de toutes les ſubſtances, & l'inſtrument de l'ame & de l'eſprit, pour toutes les actions du corps : ce que j'expliquerai en ſon lieu.

## CHAPITRE IV.

### *De l'eſprit univerſel.*

IL y a dans la Nature deux ſortes de principes, que Dieu a créés pour la production de tous les Mixtes. L'un eſt unique, & ſe raporte à la matiere, étant de ſon reſſort; l'autre eſt infini en nombre, en genre & en difference, mais univoque en vertu & en puiſſance, & ſe raporte à la forme. La premiere ſorte de principe, qui eſt unique en ſon eſpèce, c'eſt *l'eſprit univerſel.* La ſeconde, ce ſont les diverſes *matrices* qui déterminent la matiere à la forme, ſoit pour la production de chaque eſpèce, ſoit pour celle des diverſes ſubſtances alimentaires qui entrent dans leur compoſition, ou qui ſe forment en elles. Ceci doit s'entendre particulierement des animaux, & ſurtout de l'homme que j'ai pour objet. Je commence donc par traiter de ce premier principe unique, qui s'unit à la matiere pour la production de chaque choſe.

Deux principes de la production des Mixtes.

L'eſprit univerſel.

Les matrices.

Dieu a créé & produit un premier principe de toutes choſes, que l'on nomme eſ-

Idée generale de l'eſprit

CHAP. IV.

*eſprit univerſel*, ou *ame du monde*, ſans lequel rien ne peut être produit. C'eſt ce même *eſprit* qui, avant la ſéparation des parties de l'univers, étoit répandu & * porté ſur les eaux, & qui a été deſtiné par le Créateur à ſervir de ſemence primitive, & de premier moteur de toutes choſes. Quelques Anciens nous le repreſentent ſous la forme de *Prothée*, parcequ'il ſe revèt de toutes les formes, & qu'il ſe joint & s'aſſimile indifféremment à toutes les natures, dans leſquelles il ſe ſpécifie, & ſe détermine à produire tel ou tel Mixte. C'eſt un être en puiſſance, qui n'agit point, s'il n'eſt excité. Mais quand il eſt réduit de puiſſance en acte, il en naît ce qui en doit naître.

univerſel.

Comment il eſt introduit dans les animaux.

Les petits corps de l'air, qui contiennent le feu de la Nature, domicile & véhicule de cet *eſprit*, ou de cette ſemence celeſte, ſont attirés dans les *animaux* par le moyen de leurs poumons, afin que cet *eſprit* ſoit converti en leur ſemence, & ſubſtance ſpéciale & materielle.

Dans les végétaux.

Il eſt introduit dans les *végétaux* par le moyen de leurs racines, qui ſucent continuellement cet *eſprit*, qu'elles diſtribuent dans toutes les parties de la plante,

* *Et Spiritus Dei ferebatur ſuper aquas.*

te, & qui devient enſuite la ſemence de la même eſpèce. CHAP. IV.

La terre, qui eſt la *matrice* des végétaux, & qui contient toutes les *matrices* des *mineraux*, dans leſquelles eſt leur principe formel, attire ſans ceſſe cet *eſprit univerſel*, pour s'en ſervir à la production de toutes les eſpèces de *mineraux* qu'elle renferme dans ſon ſein. Si cette ſemence ſemble être ſterile, & paroît terminée dans ceux-ci, ce n'eſt point une conſéquence qu'il n'y en ait pas quelqu'un d'entre eux qui ſe puiſſe multiplier. Nous ne nous ſentons même point de répugnance à le croire, parceque la connoiſſance que nous en avons, & l'experience, nous y autoriſent. Et dans les mineraux.

Cet *eſprit*, qui eſt répandu par tout, eſt le point ſeminal contenu en chaque choſe. C'eſt le principe de la vie, & le premier mobile qui remue, & meut la matiere, qui la dévelope, & la met en évidence dans la production de chaque Mixte. C'eſt une quinteſſence que Dieu a bien voulu aſſujettir aux élemens, & aux principes des formes, qui ſont les *matrices* employées à la production de toutes choſes. Le ſoleil en eſt la ſource: ce corps lumineux influe comme mâle, & communique ſans ceſſe cette ſemence ſur la terre, dans l'air & dans l'eau, qui Sa definition. Son origine.

CHAP. IV.

la reçoivent pour réparer, & remplacer celle qui ſe conſomme dans la production de tous les Mixtes de la Nature.

Son action dans les animaux.

Cette ſemence du premier mâle, laquelle contient en ſoi la puiſſance motrice, commence ſon action ſur l'humide, dans lequel elle introduit la putrefaction, où ſont contenues toutes les qualités & les vertus du premier Cahos. On l'apelle pour lors *humidité mercuriale*, ou *hermaphrodite*, parcequ'elle participe des deux natures. A l'égard des animaux, elle eſt reçue d'abord dans les arteres ſpermatiques, comme dans ſes premieres *matrices*, & enſuite dans les teſticules qui ſont les ſecondes, où ſe produit le fruit de cette ſemence. Mais c'eſt dans la premiere qu'elle reçoit la ſpécification. Les *matrices* des femelles n'en ſont que les réceptacles: elles fourniſſent ſeulement les ſubſtances nutritives. Du reſte la reſſemblance, auſſi-bien que les affections & les inclinations que l'on remarque dans les enfans, & qui ont raport à celles de leurs meres, ne ſont autre choſe que les effets de l'impreſſion des ſubſtances nutritives de l'embrion, ſur leſquelles les idées de la mere ont influé. Ces inclinations & ces affections ne ſont pas de l'eſſence de la ſemence: elles y ſont ſeulement entées, ne provenant que

De la ſource des affections de l'homme.

des

des qualités que les ſubſtances nutritives prennent des *matrices* qui les ont formées; comme une ſemence végétable les prendroit d'une terre, dans laquelle elle ſeroit jettée, ou tranſplantée ; ce qu'on pourroit éprouver par exemple dans une plante de vigne, priſe en *Bourgogne*, & qui aïant été tranſplantée en *Champagne*, contracteroit le goût du vin naturel de cette Province. Cela prouve que le lieu contribue beaucoup à déterminer la choſe.

De la ſemence de la femme.

Le *ſperme* de la femelle, qui ſert à la generation, n'eſt qu'un menſtrue humide ou une ſubſtance paſſive, inutile à la ſemence, mais néceſſaire à la production du fœtus, & à la ſenſibilité delicieuſe de la femelle.

De la végétation.

L'*eſprit univerſel*, qui eſt le principe de la fécondité, agit preſque de la même maniere dans les végétaux que dans les animaux. La terre eſt la *matrice*, dans laquelle le grain, ou la ſemence, fermente & ſe putrifie. Il ſe forme dans cette ſemence, ou dans le grain, un petit cahos qui ſe dévelope peu à peu, & qui s'étend enſuite en long & en large, en racines & en branches. La ſubſtance blanche, qu'on remarque au commencement dans ce grain, eſt le menſtrue humide, ou la premiere nouriture de la plante, pendant

CHAP. IV.

qu'elle eſt tendre, & delicate, après quoi la terre lui en fournit une plus ſolide, & proportionnée aux forces qu'elle acquiert en croiſſant.

Productions infinies de l'eſprit univerſel.

Il y a une infinité d'animaux, d'inſectes & de végétaux, qui ſe forment de la corruption de la Nature, & dont la generation & la production ne tombent point ſous les ſens : c'eſt qu'il y a dans l'air, dans la terre & dans l'eau, une infinité de *matrices*, qui n'ont d'autre ſemence que l'*eſprit univerſel*, parceque cet *eſprit* ſe porte continuellement à produire toutes choſes, lorſqu'il trouve des lieux tant ſoit peu diſpoſés à le réduire de puiſſance en acte : ce qui donne l'être & la forme à tant de camaïeux, & de plantes pierreuſes, qui font l'objet de notre admiration.

Ses effets conformes à ſa détermination.

Il y a dans la terre une infinité de *matrices*, qui ont chacune une propriété ſpécifique pour attirer l'*eſprit univerſel*. Le flux & reflux continuel de l'air, & de l'eau, lequel ſe fait du centre à la ſuperficie, & de la ſuperficie au centre, cauſe en partie la détermination de cet *eſprit* dans les *matrices*, qui ſe trouvent en ſon paſſage. Si ces *matrices* ſont métalliques, elles produiſent des métaux proportionés à la pureté, ou à l'impureté des lieux, & au mêlange des ſubſtances

ces qui entrent en leur compoſition. CHAP. IV.

Si cet *eſprit* ſe joint à des matieres pures, il en naît de l'or, de l'argent, des pierres précieuſes de pluſieurs eſpèces, ſuivant les *matrices*; & ſi la *matrice* eſt impure, groſſiere, & féculente, il ſe produit des pierres, & des mineraux de differentes ſortes.

L'*eſprit univerſel* tend toujours à la perfection, & il n'y a que les accidens qui l'empêchent d'y parvenir. Ce n'eſt pas cet *eſprit univerſel* qui diverſifie les choſes; mais ce ſont les *matrices* qui le déterminent, & le ſpécifient; ce qui ſe fait par le concours des élemens, & par une coction qui ne ceſſe point, juſqu'à ce que le Mixte ait acquis ſa maturité, pourvu cependant qu'il ne ſe rencontre ni defaut, ni obſtacle dans ſon origine, dans ſon progrès, ou dans les ſubſtances qui contribuent à former ſon être. Il parviendroit à la perfection ſans les accidens.

CHAPI.

## CHAPITRE V.

### *Description de l'homme.*

Plan de l'Auteur.

JE ne me propose point ici de faire une description analitique & exacte de toutes les parties du corps de l'homme, ni d'entrer dans le détail de la Nature, des figures & des propriétés de chaque partie de la matiere fluide, & solide ; ce ne seroit qu'une répétition de ce que tant de celèbres Anatomistes ont déja écrit sur ce sujet: & d'ailleurs je regarde ce travail comme inutile à mon dessein. Mon but est d'en rechercher les causes, en un mot d'examiner les principes des formes, qui font les diverses modifications de la matiere, afin de pouvoir tirer de là quelques lumieres sur ce que l'on a jusqu'à present ignoré. Je me fixerai donc à faire une description simple des parties exterieures, & interieures du corps humain, suivant la commune notion de tout le monde. Je m'étendrai seulement sur quelques parties qui demandent une explication plus recherchée, pour mettre en évidence

leur

leur nature, leurs propriétés, & leurs effets, & cela par des obſervations, des raiſons, & des conjectures fondées ſur des raports, des exemples, & des comparaiſons puiſées dans le ſein de la Nature même. CHAP. V.

Le corps de l'homme ſe diviſe en quatre principales parties, qui ſont la tête, la poitrine, ou le thorax, le ventre, & les extremités qui ſont les bras & les jambes. Diviſion du corps de l'homme.

La *tête* eſt la plus noble partie de l'homme, puiſqu'elle eſt le domicile de l'ame, des ſens, & du principe des actions du corps & de l'eſprit. Elle eſt dans ſa premiere origine le principe materiel de toutes les parties du corps, leſquelles en prennent naiſſance comme d'un tronc, qui a ſes racines dans la partie ſuperieure de la matrice, dont les extremités ſont tournées vers le ciel, à la difference de celles des animaux, & des plantes, qui s'étendent horiſontalement, ou qui ſe pouſſent vers le centre de la terre : ce qui diſtingue l'homme des autres créatures, & prouve ſon excellence, & la nobleſſe de ſon origine. De la tête en general.

Les parties exterieures de la *tête* ſont la face, & la partie chevelue. Les parties de la face ſont les oreilles, les yeux, le nez, les lèvres, les joues, Parties exterieures de la tête.

CHAP. V.

joues, la bouche, & le menton. Le ſommet de la *tête* eſt un point, dans la partie chevelue, autour duquel les cheveux ſont diſpoſés en rond, comme des lignes qui partent de ce même point qui eſt leur centre. Le cou ſe prend depuis la tête juſqu'aux épaules.

Ses parties interieures.

Le crâne.

Les parties interieures de la *tête* ſont le *crâne*, qui contient le cerveau comme dans une boête: il eſt compoſé de ſix os joints par des ſutures, & qui lui ſont propres, & de deux os qui lui ſont communs. Les os propres ſont l'os du front, ou le coronal, les deux pariétaux, les deux temporaux, & l'occipital qui eſt ſitué dans la partie poſterieure de la *tête*. Les temporaux forment les parties ſuperieures des orbites, ou des yeux. On obſerve dans ces os les parties pierreuſes & internes des oreilles, & dans chacune la cavité du timpan, avec les oſſelets, & les autres organes internes de l'ouie. Les pariétaux ſont unis par des ſutures à l'os coronal, à l'occipital, & aux temporaux. Le premier des os communs au *crâne*, ſe nomme le ſphenoïde: il eſt ſitué au milieu de la bâſe du *crâne*, auquel il eſt joint par une ſuture, excepté au milieu de ſes côtés, où il eſt tellement uni avec les os pariétaux qu'il ſemble faire une même choſe avec eux. Le ſecond & le dernier

des

des os communs au *crâne* eſt l'os ethmoïde, ſitué au milieu de la bâſe du front, avec lequel il eſt joint par une ſuture. Il part de ſa ſuperficie inferieure un os mince qui diviſe en deux la cavité des narines. Tous ces os ſont percés de pluſieurs trous, qui donnent paſſage aux organes des ſens, aux veines, aux arteres & aux nerfs. CHAP. V.

Il y a deux os à la *machoire* ſuperieure, qui lui ſont communs, ainſi qu'au crâne, & onze propres, ſavoir cinq à chaque côté, & un au milieu: ils ſont joints aux os du crâne par des ſutures communes, & unis enſemble par une ſuture fine. Le premier des os propres eſt l'os de la joue, dont la ſuperficie ſuperieure forme la partie inferieure & exterieure de l'orbite. Le ſecond ſe nomme le très grand, ou le maxillaire, parcequ'il contient toutes les dents. Le troiſieme eſt l'os *onguis*, ſitué dans le grand angle de l'orbite. L'os du nez fait le quatrieme. Le cinquieme eſt l'os du palais. L'onzieme eſt ſitué au milieu de la partie inferieure du nez. La *machoire* inferieure eſt formée d'un ſeul os. Les machoires.

La ſubſtance interne du côté droit du *cerveau*, & celle du côté gauche, s'aprochent pour ſe joindre l'une à l'autre, laiſ- Le cerveau.

CHAP. V.

laiſſant entre elles un eſpace qui forme les trois ventricules, ou le centre ovale. La partie ſuperieure, ou ce qui couvre cet eſpace, s'apelle le corps caleux. La bâſe, ou le fond de cet eſpace, eſt formé par la ſubſtance interne ou médullaire des deux côtés du *cerveau*, partagée en deux paquets, ou protuberances nommées les jambes de la moelle allongée. C'eſt au deſſus de ces protuberances qu'on trouve les corps canelés, & les couches des nerfs optiques. Les jambes de la moelle allongée s'uniſſent enſemble, & forment un corps ſur lequel on obſerve quatre éminences: les deux premieres ſe nomment nates, & les deux autres têtes. Derriere, au deſſous de ces éminences, la ſubſtance interne du *cerveau* ſe partage en deux paquets, & forme ſur chaque côté de la moelle allongée trois autres éminences: enſuite elle ſort du crâne pour entrer dans les vertèbres, où elle prend le nom de moelle de l'épine. Toutes les parties du *cerveau* ſont contenues dans la dure-mere & la pie-mere. La membrane interne de cette derniere ſépare toutes les circonvolutions du *cerveau*, & ſoutient les vaiſſeaux ſanguins, qui font pluſieurs plis & circonvolutions ſur ſa ſuper-

ſuperficie, pour ſe terminer dans la ſubſtance du *cerveau.*

La *langue* eſt une partie très noble de la tête, & la plus néceſſaire pour l'articulation des mots, & l'explication des penſées de l'ame. C'eſt une pièce de chair ſituée dans la bouche, au deſſous de la voûte du palais. Elle eſt l'organe du goût & de la parole, & ſert auſſi à envoyer les alimens dans l'eſtomac. Le cou contient le goſier, & les vertèbres qui portent la tête. La langue.

Tout ce qui eſt ſitué entre la bâſe du cou, & le diaphragme, ſe nomme thorax. La partie de devant s'apelle la *poitrine*, ou le ſein, ſur lequel s'élevent les mamelles, au milieu de chacune deſquelles on voit une protuberance, nommée le mamelon, & environnée d'un cercle rougeâtre. La partie de derriere ſe nomme le dos, où ſont ſituées les épaules. La poitrine.

Les parties internes contenues dans la capacité du *thorax*, ſont le médiaſtin, le cœur, renfermé dans le pericarde, la pleure, & les poumons. Le canal des alimens, qui vient de la bouche, paſſe au milieu de cette partie, pour ſe rendre dans le ventricule de l'eſtomac. On apelle ce canal, œſophage. Le thorax.

Le *dos* eſt compoſé & ſoutenu de dou- Le dos.

CHAP. V.

ze vertèbres, & des deux épaules: il y a vingt côtes attachées à ces douze vertèbres, qui forment la capacité du thorax. Le diaphragme ſe termine aux dernieres côtes.

Le ventre.

Le *ventre*, que les Anatomiſtes apellent *abdomen*, ſe prend depuis le diaphragme, ou les dernieres côtes, juſqu'à l'os pubis, où ſont ſituées les parties de la generation que je me diſpenſerai d'expliquer ici. La partie de devant ſe nomme le *ventre*, au milieu duquel ſe voit le nombril. La partie de derriere s'apelle le râble. Les parties interieures du *ventre* ſont le ventricule de l'eſtomac, le foye, la rate, la veſicule du fiel, le pancréas, le reſervoir du chile, les inteſtins, le meſentere, les reins, la veſſie: & dans les femmes la matrice, & les autres parties internes de la generation. Le canal excrétoire des excrémens, qui commence dans l'endroit où finit celui des alimens, ſe termine à l'anus; & celui des fluides à l'extremité de l'urèthre. Les cinq vertèbres des lombes, qui ſoutiennent tout le corps, ſe terminent à l'*os ſacrum* & au *coccyx*, ou croupion, qui en eſt l'extremité.

Les bras.

Quant aux extremités, le *bras* ſe prend depuis la jointure de l'épaule juſqu'au coude, & n'a qu'un ſeul os. L'avant-bras,

bras, qui a deux os, s'étend depuis le coude juſqu'à la jointure du poignet; & la main, qui a pluſieurs os, depuis cette jointure juſqu'aux extremités des doigts. CHAP. V.

La *cuiſſe* s'étend, avec un ſeul os, depuis la hanche juſqu'à la jointure du genou: la *jambe*, qui a deux os, depuis le genou juſqu'au talon; & le pied, qui a pluſieurs os, depuis la partie poſterieure du talon juſqu'à l'extremité des doigts. La partie inferieure du pied ſe nomme la plante, dont la peau eſt plus épaiſſe que dans aucune autre partie du corps. Les cuiſſes & les jambes.

## CHAPITRE VI.

### *Deſcription de la route des alimens, & du canal inteſtin.*

L'œſophage.

LA bouche où ſe broyent les alimens, & la langue qui fait leur déglutination, forment l'embouchure de cette route, ou de ce canal, que l'on nomme *œſophage*. Ils ont une infinité de glandes dont l'uſage eſt de fournir la ſalive, & les liqueurs néceſſaires à la diſſolution des alimens. L'*œſophage* eſt un long canal, large & rond, qui deſcend preſque en droite ligne entre les vertèbres du cou, celles du dos, & la trachée artere, juſqu'à la cinquieme vertèbre du dos, où il ſe tourne un peu à droite, pour faire place à l'aorte deſcendante, qui s'étend avec lui juſqu'à la neuvieme vertèbre. En cet endroit l'*œſophage* ſe tourne de nouveau à gauche, monte ſur l'aorte, deſcend par deſſus cette artere, perce le diaphragme, & continue juſqu'à l'orifice de l'eſtomac.

Ses membranes.

L'*œſophage* eſt compoſé de cinq *membranes*, qui en ſe contractant pouſſent les alimens dans l'eſtomac. La *membra-*

*ne* veloutée, qui eſt la plus interne, ſoutient les extremités des vaiſſeaux excrétoires, qui rendent une ſubſtance viſqueuſe dont elle eſt enduite, pour faire gliſſer les alimens : cette ſubſtance vient des glandes qui ſont entre elle & la *membrane* nerveuſe. CHAP. VI.

L'extremité ſuperieure de l'*œſophage* ſe nomme le *pharynx* : il a trois paires de *muſcles* pour faire ſes mouvemens, & comprimer les alimens, afin de les faire avancer & deſcendre, en exprimant en même tems, des amygdales, la liqueur qui contribue à les faire gliſſer plus facilement dans l'eſtomac. Ses muſcles.

L'*eſtomac*, ou le ventricule, eſt ſitué immédiatement au deſſous du diaphragme. Le foye couvre une partie de ſon côté droit ; la rate le touche au côté gauche ; & le *colon*, au fond auquel eſt attaché l'*omentum*. Sa figure reſſemble à celle d'une cornemuſe ; car il eſt long, large, creux, & aſſez rond vers le fond, mais plus court & moins convexe dans la partie ſuperieure, où il y a deux orifices, un à chaque extremité, qui ſont tant ſoit peu plus élevés que l'eſpace qui eſt entre deux. L'orifice gauche eſt celui par où les alimens entrent dans l'*eſtomac*, après qu'ils y ſont digerés. Ils ſont pouſſés obliquement vers le pylore, L'eſtomac.

CHAP. VI.

ou l'orifice droit, qui eſt attaché au premier des inteſtins. Les membranes de l'*eſtomac* ſont beaucoup plus épaiſſes dans les orifices que dans les autres parties. Cet orifice a une valvule forte & épaiſſe, formée de la duplicature d'une membrane qui ſert à le contracter, & à le fermer: il eſt ſitué plus bas que le gauche.

Ses membranes

L'*eſtomac* eſt compoſé de quatre *membranes*. La premiere & la plus externe eſt la *membrane* commune; la ſeconde, la muſculaire; la troiſieme, la nerveuſe; & la quatrieme, la *membrane* veloutée, qui eſt plus poreuſe que les autres: elle ſert à ſoutenir les conduits excrétoires, qui viennent des glandes de l'*eſtomac*, & des extremités de ſes arteres capillaires, qui fourniſſent la plus grande partie du ſuc ſtomachique.

Son uſage.

L'uſage de l'*eſtomac* eſt de digerer les alimens, de les reſoudre, & de les rendre propres à être tranſmués en chyle, & en ſang, pour entrer dans la compoſition & augmentation du corps, ou pour fournir à ſon entretien.

Le canal inteſtin.

Lorſque les alimens ſont ſuffiſament diſſous dans l'eſtomac, les fibres muſculaires les pouſſent dans le *canal inteſtin*, aidées de la contraction de l'abdomen. Ce canal eſt long, étroit dans ſon com-

commencement, & dans ſon milieu, & large vers ſa fin. Il eſt diſpoſé en pluſieurs circonvolutions & contours, & s'étend depuis le pylore juſqu'à l'anus. On le diſtingue dans ſon étendue par divers noms, formes, propriétés & uſages. Il eſt attaché à la circonference d'une membrane qu'on nomme le meſentere, & il eſt ſix fois auſſi long, afin que le chyle, qui échape aux veines lactées d'une partie de l'*inteſtin*, puiſſe être reçu par celles qui ſuivent. CHAP. VI.

Ses membranes.

Ce canal eſt compoſé de cinq *membranes*: de l'extrême qui eſt commune, de la celluleuſe, de la muſculaire, de la nerveuſe, & de la veloutée, qui ſert à ſoutenir les extremités des conduits excrétoires de la liqueur venant des petites glandes renfermées entre les autres *membranes*, & les extremités des veines lactées. Le principal uſage de la *membrane* veloutée eſt de ſéparer, comme un crible, le plus groſſier des alimens, ou des excrémens, du plus ſubtil, c'eſt à dire du chyle, qui entre en la compoſition & réparation du corps.

Les inteſtins grêles.

On diviſe le *canal inteſtin* en ſix parties, ou *inteſtins*; ſavoir trois petits, ou grêles, & trois gros. Les *in-*

CHAP. VI.

*teſtins grêles* ſont le *duodenum*, le *jejunum*, & l'*ileon*.

Le duodenum.

Le *duodenum* a environ douze pouces de longueur: il tire ſon origine du pylore, & deſcend premierement en ligne perpendiculaire; enſuite il s'étend horiſontalement par deſſous l'eſtomac, du côté droit du ventre, vers le rein gauche. A trois ou quatre travers de doigt du pylore, il reçoit les conduits cholidoque & pancréatique. Le premier vient du foye, & de la veſicule du fiel; le ſecond vient du pancréas. Le conduit cholidoque décharge dans le *duodenum* la bile du foye, & celle de la veſicule du fiel. Le conduit pancréatique y verſe la lymphe, qui ſe forme & ſe ſépare dans le pancréas. Cet *inteſtin* differe des deux autres en ce qu'il eſt plus étroit, & que ſes tuniques, ou membranes, ſont plus épaiſſes: d'où l'on peut conclure qu'il ſe contracte de lui-même, quand la digeſtion des alimens, qu'il reçoit, eſt venue à un certain point, pour les pouſſer dans le *jejunum*. Il contient un très grand nombre de glandes, qui produiſent une ſubſtance néceſſaire pour achever la diſſolution des alimens dans cette partie, avec la bile

le & les autres ſubſtances qui s'y mêlent, pour tranſmuer le plus pur en chyle: ce qui doit faire conſiderer le *duodenum* comme une *matrice*, ou un autre eſtomac, qui achève ce que le premier n'a fait qu'ébaucher. CHAP. VI.

La ſeconde partie eſt le *jejunum*, ainſi nommé parcequ'on le trouve ordinairement vuide, à cauſe de la fluidité du chyle, & du grand nombre de veines lactées dont il eſt rempli. Il commence au premier pli des *inteſtins* ſous le *colon*, à l'endroit où le *duodenum* finit. Après avoir fait pluſieurs tours & inflexions, en allant de droite à gauche, & revenant du côté gauche au côté droit, il va ſe terminer à l'*ileon*. Il remplit toute la partie ſuperieure de la région ombilicale, ou du nombril, occupant quelquefois treize pouces de largeur, & quelquefois ſeize. Il ne differe de l'*ileon* qu'en ce qu'il a plus de veines lactées, en aïant beſoin pour la grande quantité de chyle qui s'y forme. Ses rugoſités, ou rides, ſont auſſi plus proches l'une de l'autre, & en plus grand nombre. Le jejunum.

Le troiſieme & dernier des *inteſtins grêles*, eſt l'*ileon*, qui prend ſon nom de ſa ſituation auprès des os des îles. Sa longueur eſt de quinze palmes, & elle excède quelquefois celle de vingt. Il com- L'ileon.

CHAP. VI.

mence à l'endroit où les valvules diſparoiſſent, c'eſt à dire à l'extremité du *jejunum*; & faiſant pluſieurs tours & inflexions, il remplit toute la partie inferieure de la région ombilicale, & tout l'eſpace qui eſt entre les îles, & il va ſe terminer au commencement du *colon*, à angle droit. Son canal eſt un peu plus étroit que celui du *jejunum*, & ſes membranes paroiſſent un peu plus minces. Il n'a point de valvules. Il ne s'introduit en lui aucune ſubſtance de dehors, ſinon de ſes propres glandes, qui ſont plus nombreuſes à ſon extremité qu'ailleurs.

Les gros inteſtins.

Les *gros inteſtins* ſont le *cæcum*, le *colon*, & le *rectum*.

Le cœcum.

On prend le *cæcum* pour le premier des gros *inteſtins*: il commence à l'endroit où ſe termine l'*ileon*. Cet *inteſtin* eſt long de trois ou quatre travers de doigt. On le nomme *cæcum*, parcequ'il n'a qu'une ſeule extremité d'ouverture, par laquelle il s'attache au commencement du *colon*; de ſorte que les excrémens y entrent & en ſortent par le même orifice. Le *cæcum* a un appendice de la groſſeur d'une plume de cigne, long de trois ou quatre travers de doigt, dont on ne connoît pas bien l'uſage. Il y a aparence néanmoins que la liqueur, qui

ſe

ſe ſépare des glandes de ſa cavité, eſt propre à diſſoudre ce qu'il y a de plus fixe dans les excrémens, pour le mêler avec le chyle. CHAP. VI.

Le *colon* eſt le plus gros des *inteſtins*. Il n'a quelquefois que cinq palmes de longueur ; mais d'ordinaire il en a ſept. Il commence où l'*ileon* finit, aſſez près de la cavité de l'os *ileon*, au côté droit. De là montant auprès du rein droit, il paſſe au deſſous de la partie concave du foye, auquel il s'attache quelquefois, de même qu'au veſicule du fiel, qui le teint en jaune. Enſuite il paſſe ſous le fond de l'eſtomac, & va ſe rendre au côté gauche, près de la rate, à laquelle il s'attache auſſi. De là il deſcend en bas juſqu'au rein gauche. Enſuite, paſſant en forme d'une *S*, il ſe termine à la partie ſuperieure de l'*os ſacrum* dans le *rectum*. Il y a au commencement de cet *inteſtin* une valvule qui empêche le retour des excrémens. Il ſe diviſe en pluſieurs cavités, ou cellules, qui avec ſes valvules, qui ſont très grandes, retardent le paſſage des excrémens, afin qu'on ne ſoit pas obligé d'aller continuellement à la ſelle. Ses appendices de graiſſe ſervent à l'humecter. Le colon.

Le *rectum* eſt le dernier des *inteſtins*. Sa longueur eſt d'environ une palme & demie. Le rectum.

CHAP. V. I.

mie. Sa cavité a environ trois travers de doigt de diamètre. Ses tuniques ou membranes ſont les plus épaiſſes & les plus charnues de celles des *inteſtins*. Il commence à la vertèbre inferieure des lombes, où le *colon* ſe termine ; & deſcendant en droite ligne, il s'attache par derriere à l'extremité du *coccyx* : & par devant au col de la veſſie dans les hommes; & au col de la matrice dans les femmes. Exterieurement il a beaucoup de graiſſe : c'eſt pour cela qu'on le nomme le *boyau gras*. Son extremité forme l'anus qui a trois muſcles, dont l'un eſt le ſphincter, qui ſert à le fermer.

Ce canal que je viens de décrire, depuis la bouche où il commence, juſqu'à ſa fin, reçoit les ſubſtances nutritives de la terre & de l'eau, dont le plus pur eſt tranſmué en chyle, & en ſang, qui ſe diſtribue enſuite dans toutes les parties du corps, en diverſes manieres, pour conſtituer ſon eſſence, ſa vie & ſa fécondité ; tel que le *Nil* qui reçoit des régions du *Midi*, où eſt ſa ſource, la graiſſe de l'air & de la terre, par la fonte des neiges qui groſſiſſent ſes eaux, laquelle il diſtribue enſuite dans les campagnes de l'*Egipte*, pour les rendre fertiles.

CHAPI-

## CHAPITRE VII.

### *Des principes du mouvement dans le corps animal, & de la conſtruction des poumons.*

DIeu, comme premiere cauſe, eſt le moteur & le principe de tous les mouvemens de l'univers. Le premier qu'il a produit dans la matiere du cahos, pour la ſéparation de la terre & des cieux, a été vraiſemblablement direct, tendant du centre à la ſuperficie; & ce mouvement ſe continue par le commerce qu'il y a des choſes ſuperieures avec les inferieures: commerce néceſſaire à la production de tous les Mixtes de la Nature. Il ne s'agit pas ici de ce mouvement direct, mais du circulaire, que nous allons expliquer, & qui concourt néanmoins à la même fin avec ce premier mouvement.

Mouvement direct dans la Nature.

Dieu, en donnant l'être aux créatures, a fait mouvoir circulairement la matiere celeſte, avec les aſtres, d'*Orient* en *Occident:* ce qui a déterminé & fixé la terre au centre du monde.

Mouvement circulaire.

L'air, qui l'environne, étant preſſé de

Ses effets à l'égard

CHAP. VII. des animaux.

de tous côtés par la matiere celeſte, qui tourne continuellement en ce ſens-là, preſſe la terre & tous les corps. Ce même air eſt par conſéquent la cauſe & le principe de tous les mouvemens internes des animaux, ſur les *poumons* deſquels il a une action immédiate, pour les dilater. En les dilatant, il oblige leurs fibres à ſe contracter, afin de le repouſſer avec la même force dont ils avoient été dilatés. On appelle l'action de l'air ſur les *poumons*, *inſpiration;* & l'action des *poumons* pour repouſſer l'air, *expiration*. L'alternative, & la continuité de ces deux actions, produiſent tous les mouvemens involontaires dans l'homme, & dans les animaux qui ont des *poumons*, & qui vivent dans l'air. Car pour les poiſſons, c'eſt l'eau qui agit, au lieu de l'air, ou conjointement avec lui.

Inſpiration & expiration.

Néceſſité de l'impulſion de l'air.

L'impulſion de l'air eſt tellement néceſſaire que, s'il n'agiſſoit ſur les *poumons* des animaux, leurs fibres & tout ce qui contribue aux mouvemens involontaires, demeureroient en repos & ſans action: toutes les parties du corps de l'homme ſeroient privées de vie, & ne ſeroient d'aucun uſage: il ne ſe feroit point de circulation du ſang, & l'ame ne pouroit exercer par conſéquent aucune action ſur le corps, qu'elle ſeroit forcée d'aban-

d'abandonner. On conçoit aiſément que l'impulſion de l'air peut bien enfler & dilater les *poumons*, parcequ'ils ſont compoſés d'une infinité de veſicules ; & ce qu'il y a de remarquable, c'eſt que l'air, qui y entre par la trachée artere, les enflant chacune en particulier, & toutes en même tems, multiplie tellement la force des *poumons*, qu'ils ſont capables de lever cent livres peſant, ſans qu'on s'en aperçoive. Mais pour concevoir la force que les *poumons* employent à repouſſer l'air, il faut conſiderer auparavant la nature des fibres qui en ſont le principe.

CHAP. VII.

Force prodigieuſe des poumons.

La *fibre* eſt une partie fort ſimple, de la groſſeur d'un filet très delié, qui ſoufre ſans peine & ſans effort l'extenſion juſqu'à un certain point, mais qui ſe racourcit tout d'un coup, ſi on l'étend juſque-là, parcequ'étant d'une ſenſibilité exquiſe dans ſa plus grande extenſion, la moindre choſe qui la touche, ou qui l'irrite, l'oblige à ſe contracter. Voilà en quoi conſiſte l'élaſticité qu'elle a, laquelle eſt bien differente de celle qu'on lui attribue, en la comparant à un reſſort qui reſiſte, & qui repouſſe, à proportion qu'on le force, au lieu que la *fibre* ne reſiſte point en s'étendant, ſinon en ce point où ſa ſenſibilité l'oblige à ſe racourcir, ou à ſe contracter. La Nature nous fournit un

De la nature & de l'effet des fibres.

Difference de l'effet d'une fibre d'avec celui d'un reſſort.

CHAP. VII.

un exemple qui nous confirme dans l'idée que nous avons de la *fibre*. Rien ne lui reſſemble mieux qu'un ver de terre par ſa figure & par ſes actions. Il a, comme elle, la vie & la ſenſibilité ; & il peut de même s'étendre & ſe racourcir. Si vous tenez un ver de terre par ſes deux extremités, & que vous l'étendiez doucement, il ſe laiſſera aiſément étendre, ſans aucune reſiſtance, juſqu'à un certain point; mais ſi vous ſurpaſſez un peu ce point, il employera toute ſa force pour ſe contracter : ce qu'il fera effectivement, ſi vous le laiſſez aller, & il ſe racourcira de plus de la moitié. Telle eſt l'action de la *fibre*. Sur ce principe il eſt facile d'expliquer tous les mouvemens volontaires, & involontaires, qui ſe font par les cauſes qui agiſſent, & par celle des *fibres*, qui leur eſt propre & naturelle, telle que nous venons de l'expoſer.

Sa comparaiſon naturelle avec un ver de terre.

Deux mouvemens importans à expliquer.

Après avoir établi ce principe du mouvement des *poumons* par l'action de l'air ſur leurs fibres, & par celle des fibres ſur l'air, il eſt néceſſaire de décrire la forme & la conſtruction des *poumons*, avant que d'expliquer leur uſage. Je commencerai par la trachée artere qui eſt le canal par où l'air entre & ſort, lorſqu'ils ſe dilatent, ou qu'ils ſe contractent, afin d'expliquer les deux plus importans mouve-

mens

mens internes du corps, desquels dépendent tous les autres : je veux dire celui des *poumons*, & celui du *cœur*. CHAP. VII.

La *trachée artere* a une structure particuliere, qui requiert qu'on l'examine avant les poumons. C'est un canal situé dans la partie anterieure du cou, au devant de l'œsophage. Sa partie superieure s'apelle le larinx. De là elle descend jusqu'à la quatrieme vertèbre du dos, où elle se divise, & entre dans les poumons. Ce canal est formé de cartilages annullaires, qui sont à une petite distance égale l'un de l'autre. Ces cartilages deviennent toujours plus petits, à mesure qu'ils s'aprochent des poumons; & ceux des bronches sont si près l'un de l'autre dans l'expiration, que le second entre dans le premier, & le troisieme dans le second ; de sorte que ceux qui suivent, entrent dans ceux qui précèdent. Les cartilages, qui sont entre le larinx & les poumons, ne forment pas des anneaux complets; mais leur partie posterieure, qui est contiguë à l'œsophage, est membraneuse, afin que leur dilatation & leur contraction s'exécutent mieux, & avec plus de facilité; & que l'œsophage puisse se dilater dans la déglutination des alimens. Les cartilages des bronches sont tout à fait annulaires : néanmoins leurs branches capillai- La trachée artere.

CHAP. VII.

res ſont deſtituées de cartilages, au lieu deſquels elles ont de petits ligamens circulaires, qui ſont à une diſtance aſſez conſiderable l'un de l'autre. L'uſage des cartilages eſt de tenir le paſſage de l'air toujours ouvert; mais dans les rameaux capillaires des bronches ils empécheroient l'affaiſſement des veſicules, au tems de l'expiration. Les cartilages ſont attachés enſemble par deux membranes. L'une, qui eſt externe, eſt compoſée de fibres circulaires, & couvre toute la *trachée artere*. L'interne eſt d'un ſentiment exquis, & couvre interieurement les cartilages. Celle-ci eſt compoſée de trois membranes diſtinctes, & l'autre de deux eſpèces de fibres: les premieres longitudinales, pour racourcir la *trachée artere*, en aprochant les cartilages, & les faiſant entrer l'un dans l'autre; & les ſecondes circulaires, pour contracter les cartilages.

Ses cartilages.

Les poumons.

Les *poumons*, qui produiſent par le moyen de l'air le mouvement dans le corps de l'homme, forment le plus grand viſcere du thorax. Ils ſont ſitués au milieu de ſa cavité, & diviſés en deux lobes par le médiaſtin. Le gauche eſt ordinairement partagé en deux autres. La figure des lobes pris enſemble reſſemble à un pied de veau, étant un peu concave

ve entre les deux lobes qui embraſſent le cœur, & dans la partie poſterieure qui eſt ſituée ſur les vertèbres. Mais leur partie anterieure, qui touche le *ſternum* & les côtes, eſt convexe. Ils ſont attachés par devant au *ſternum*; par derriere aux vertèbres par le moyen du médiaſtin; au cœur par les vaiſſeaux pulmonaires; à la trachée artere, & quelquefois à la pleure, dans l'endroit où elle couvre les côtes, & principalement du côté gauche, ſurtout après une pleureſie. CHAP. VII.

Les lobes des *poumons* ſont couverts d'une double membrane: l'externe eſt une continuation de la pleure; & l'interne couvre immédiatement non ſeulement la ſubſtance des *poumons*, mais ſa petite lame interne remplit les interſtices qui ſont entre les paquets des petits lobes, & entre les veſicules. Les arteres & les veines capillaires ſe diſtribuent en ſi grand nombre ſur cette membrane, qu'il ſemble que ce ne ſoit autre choſe qu'un tiſſu de vaiſſeaux ſanguins. La ſubſtance des *poumons* eſt compoſée d'un nombre infini de petits lobes, dont la figure & la grandeur varie; mais leurs ſurfaces s'adaptent ſi bien l'une à l'autre, qu'ils ne laiſſent que très peu de petits interſtices. Ces lobes ſe diſpoſent à côté des Leurs lobes.

CHAP. VII.

bronches, comme autant de grapes de raiſin. Chaque lobe renferme dans ſa membrane propre une infinité de veſicules rondes, ſéparées par de petits interſtices qui ſont remplis de membranes deliées, & ſemblables à celles qui attachent enſemble les lobes. Les bronches, & les extremités des branches de la trachée artere s'ouvrent, dans ſes cavités, des veſicules qui ſe forment probablement de l'expanſion de ſes membranes: mais les vaiſſeaux capillaires ne ſe diſtribuent que ſur la ſurface externe des veſicules en maniere de tiſſu, & ils ſe communiquent, ou s'anaſtomoſent preſque partout.

Leurs vaiſſeaux.

Les vaiſſeaux, qui penètrent dans les *poumons*, ſont la trachée artere, par où l'air entre dans l'inſpiration; l'artere pulmonaire, qui vient du ventricule droit du cœur, & la veine pulmonaire, dont le tronc s'ouvre dans ſon oreillette gauche. Chacun de ces vaiſſeaux ſe partage en deux branches, pour les deux grands lobes du *poumon*, où elles ſe diviſent encore en autant de branches qu'il y a de petits lobes, & de veſicules dans le *poumon*. Par tout où il y a un rameau de la trachée artere, il y a auſſi un rameau d'artere, & un autre de veine. La trachée artere eſt toujours au milieu.

Le

CHAP. VII.

Effet de l'air sur eux.

Le savant *Pitcarne* a demontré par la structure des *poumons*, ainsi expliquée, le grand effet qu'ils produisent dans le sang par le moyen de l'air. Tandis que le fœtus est dans la matrice, ils ne sont en lui d'aucun usage, leurs vesicules étant aplaties & couchées l'une sur l'autre. Mais nous ne sommes pas plutôt nés que l'air se glisse dans les branches de la trachée artere, qui sont pour lors vuides; & alors, faisant gonfler les vesicules, il leur donne une figure spherique. Par ce moyen-là, les vaisseaux sanguins s'étendent également avec les *poumons*; se rempliſſent du sang qui trouve les passages libres, & qui étant ensuite forcé par la contraction des *poumons* pendant l'expiration, entre par la veine pulmonaire dans l'oreillette gauche du cœur, pour commencer sa circulation.

Usage de l'artere bronchiale dans le fœtus.

Pendant que les *poumons* sont ainsi affaissés dans le fœtus, & que ses arteres & ses veines n'y sont d'aucun usage, non plus que la trachée artere, l'artere que *Ruysch* nomme *bronchiale*, qui vient de l'aorte, & qui se distribue sur les branches de la trachée artere, lesquelles on nomme bronches, porte le sang & la vie dans ces *poumons* affaiſ-

CHAP. VII.

fés comme un morceau de chair ; & la veine, qui ſe diſtribue de même, le raporte dans les veines intercoſtales, ou dans la veine azigos, qui ſe va rendre à la veine cave.

Et dans les adultes.

Le ſang, qui eſt pouſſé dans les *poumons* par l'artere pulmonaire, étant de la nature du ſang des veines, & toutes les ſécrétions ſe faiſant dans les branches & ramifications des arteres pulmonaires, l'artere bronchiale a un uſage tout different. Son uſage particulier doit être deſtiné à porter la ſubſtance nutritive & vivifiante aux *poumons*. Le plexus thorachique de la paire vague, & l'intercoſtal, fourniſſent aux *poumons* des rameaux de nerfs, qui ſe diſtribuent par deſſus les bronches, en accompagnant leurs plus petites ramifications. Outre cela, les *poumons* ont des vaiſſeaux lymphatiques qui ſe déchargent dans le conduit thorachique, ou qui y ont leur origine ; mais ils ſont plus petits & s'anaſtomoſent plus ſouvent que dans aucune autre partie.

Effet de la contraction des poumons.

Lorſque l'air eſt contraint de ſortir par la contraction des *poumons*, & par celle de la cavité du thorax, les veſicules, couvertes des vaiſſeaux ſanguins qui ſe diſtribuent également partout

deſ-

deſſus leurs ſurfaces externes, ſont comprimées. C'eſt cette compreſſion qui briſe les globules du ſang, dont le mouvement s'étoit ralenti dans les veines, & qui étoit devenu ſi groſſier par les ſubſtances craſſes & impures qui s'y étoient collées dans leur ſource, & dans leur route, qu'ils n'auroient pu, ſans ce briſement, circuler dans les extremités des vaiſſeaux capillaires. Cette compreſſion les purifie, les attenue, les diviſe, les anime d'un nouvel eſprit de vie qui vient de l'air, & qui les mêle avec la lymphe, afin de rendre le ſang propre aux ſécrétions, & à la nouriture des parties où il eſt porté. On peut demontrer que la force, avec laquelle l'air preſſe les vaiſſeaux ſanguins, eſt égale à cent livres ; & quand on touſſe, ou qu'on crie, elle peut excéder quatre cents.

Force de l'air ſur les vaiſſeaux ſanguins.

Il eſt aiſé de concevoir par tout ce que nous venons de raporter, combien eſt grande, dans l'inſpiration, la force multipliée des *poumons* que l'air dilate, puiſqu'elle eſt capable de dilater le thorax, le diaphragme, & en même tems toutes les parties internes & externes de l'abdomen. Cette force eſt d'autant plus conſiderable qu'il eſt néceſſaire que celle des fibres de toutes ces parties ſe réuniſſent

Remarques ſur celle des poumons.

CHAP. VII.

pour repouſſer l'air avec une égale force, en ſe contractant. C'eſt de ces deux actions réciproques de l'air, & des fibres, que provient cet admirable mouvement de l'inſpiration, & de l'expiration, ſi néceſſaire, & qui eſt le principe du mouvement du ſang, que nous allons décrire, & de tous les autres mouvemens internes & involontaires du corps humain, & la cauſe occaſionnelle de toutes ſes productions.

CHAPI-

## CHAPITRE VIII.

### *De la conſtruction du cœur.*

AVant que d'expliquer le mouvement du ſang dans le corps de l'homme, il eſt à propos de décrire la route qu'il tient, en commençant par la conſtruction du *cœur* qui eſt le centre, & le foyer de la chaleur naturelle & de la vie, & l'inſtrument le plus important & le plus néceſſaire à ce mouvement.

Deſcription du cœur.

Le *cœur* eſt renfermé dans le pericarde, qui eſt une double membrane épaiſſe & de figure conique, ſemblable à une bourſe, & qui ſert à contenir le cœur dans ſa cavité. Le pericarde renferme une ſeroſité, deſtinée, ce ſemble, à humecter le *cœur*, & à faciliter ſon mouvement qui doit être très libre. Le *cœur* eſt ſitué au milieu de la poitrine, entre les deux lobes des poumons. Sa figure eſt conique ; ſa bâſe forme l'extremité ſuperieure, & ſon ſommet, ou ſa pointe, forme l'extremité inferieure, qui eſt tournée un peu du côté gauche : ce qui élève l'oreillette gauche plus haut que

CHAP. VIII.

la droite. Il eſt attaché au médiaſtin, qui eſt une double membrane par laquelle le thorax eſt diviſé en deux. Sa longueur eſt d'environ ſix pouces ; ſa largeur de quatre, & ſa circonference de douze à treize. Il eſt couvert d'une membrane qui eſt la membrane propre des muſcles. Il a deux veines qui s'ouvrent dans la veine cave, & deux arteres qui naiſſent de l'aorte : on les nomme vaiſſeaux coronaires. Les nerfs du *cœur*, qui ſont petits & en grand nombre, viennent de la huitieme paire, & de l'intercoſtal. Il s'en diſtribue un plus grand nombre auprès de l'aorte, & dans le ventricule gauche. Le *cœur* a des vaiſſeaux lymphatiques, qui ſe déchargent dans le canal thorachique.

Ses deux oreillettes.

Le *cœur* a dans ſa bâſe deux apendices qu'on nomme les deux *oreillettes*. L'une dans laquelle s'ouvre la veine cave, eſt ſituée à droite. La veine pulmonaire s'ouvre dans la gauche, qui eſt beaucoup plus petite que la droite. Celle-ci décharge le ſang qu'elle reçoit de la veine cave dans le ventricule droit ; & l'autre pouſſe dans le ventricule gauche le ſang qui vient de la veine pulmonaire. L'*oreillette* gauche eſt non ſeulement plus petite que la droite, mais elle eſt auſſi plus épaiſſe, parcequ'elle a beſoin de plus

de

de force. Leur ſubſtance eſt compoſée de deux rangs de fibres muſculaires, qui ſe terminent par un tendon à la bâſe du *cœur*. Par conſéquent leur action n'a rien de commun avec celle du *cœur*, & elles ſe font indépendament l'une de l'autre. Les *oreillettes* ont la ſurface interne inégale, & remplie de petites colomnes muſculaires, d'où naiſſent de petites fibres qui vont traverſalement de l'une à l'autre colomne; & les interſtices de ces colomnes, qui ſont creux, ſont comme autant de ſinuoſités, ou fentes. Leurs nerfs viennent des branches de la huitieme paire. Elles ont le mouvement de ſyſtole & de diaſtole, comme le *cœur*, mais non pas dans le même tems.

Ses deux ventricules.

Le *cœur* a deux cavités, ou *ventricules*, qui répondent aux deux oreillettes: un à chaque côté. Les côtés des deux *ventricules* ſont fort inégaux, pleins de fibres, & de petites productions charnues, de differente groſſeur, auxquelles on donne le nom de colomnes, & qui ſont comme autant de petits muſcles. Entre ces fibres, & ces colomnes, il ſe trouve pluſieurs ſinuoſités, ou fentes, ſituées aux parois des *ventricules*, ſurtout dans le *ventricule* gauche, où elles ſont plus profondes & plus larges. Elles contribuent beaucoup à la contraction des

*ven-*

CHAP. VIII.

*ventricules* ; & comme le côté du *ventricule* droit eſt beaucoup plus mince, il y a ſouvent, à cauſe de cela, un petit paquet de fibres charnues qui vont de la cloiſon du *cœur* au côté opoſé, pour empécher ſa trop grande dilatation. Le *ventricule* droit eſt beaucoup plus grand que le gauche, qui eſt plus long & plus étroit que le droit, & dont les côtés ſont plus forts & plus épais, parceque celui-ci a beſoin d'une plus grande force que le droit. Les deux *ventricules* ſont ſéparés par le *ſeptum medium*, qui n'eſt que le côté interne du *ventricule* gauche, puiſque ſes fibres ſont une continuation des fibres du côté opoſé du même *ventricule*.

Leur difference.

Les vaiſſeaux qui entrent dans le *cœur*, & qui en ſortent, ſont la veine cave, l'artere pulmonaire, la veine du même nom, & l'aorte, ou grande artere.

Le *ventricule* droit reçoit le ſang de la veine cave, à la ſortie de l'oreillette droite. Il y a à l'entrée de ce *ventricule* trois valvules formées par une membrane mince: elles ſont de figure triangulaire, de ſorte que lorſque le *ventricule* ſe contracte, & que les côtés opoſés s'aprochent l'un de l'autre, les pointes des valvules s'aprochent auſſi, & ſe touchent l'une

Uſage du ventricule droit.

l'une l'autre par l'impulſion du ſang: ce qui empêche ſon retour dans l'oreillette, & fait par conſéquent qu'il eſt pouſſé dans l'artere pulmonaire.

L'artere pulmonaire.

L'*artere pulmonaire* eſt un vaiſſeau qui part immédiatement du ventricule droit. Son embouchure eſt plus petite que celle de la veine cave. Elle a trois valvules qui permettent au ſang de ſortir du ventricule, pour entrer dans l'*artere*, mais elle l'empêche de revenir; & le ſang les pouſſe toutes trois au moindre effort qu'il fait pour rentrer. Cette *artere* porte le ſang dans les poumons.

La veine pulmonaire.

La *veine pulmonaire*, qui a ſon origine dans les poumons, eſt un vaiſſeau qui ſe décharge dans l'oreillette gauche, & dans le ventricule du même côté. Il y a deux valvules à l'orifice de ce ventricule, qu'on nomme mitrales, parcequelles reſſemblent à une mitre. Elles ſont plus larges que les autres valvules, & deſtinées au même uſage. L'aorte, ou la grande artere, ſort immédiatement du ventricule gauche. Elle a trois valvules qui empêchent le retour du ſang dans ce ventricule. L'aorte porte le ſang arteriel dans toutes les parties du corps.

Les fibres du cœur.

Le *cœur* eſt un muſcle compoſé de *fibres*. La ſubſtance de ces *fibres* eſt de la même nature que celle des *fibres* des

au-

CHAP. VIII.

autres muſcles. Il y en a pluſieurs rangs qui ont differentes directions ; & tous leurs tendons ſont à la bâſe du *cœur*. Il y a deux tendons qui naiſſent de l'aorte, juſtement auprès des arteres coronaires. Le premier paſſe entre l'oreillette droite, & l'artere pulmonaire : l'autre paſſe entre les deux oreillettes. Ces tendons environnent l'embouchure de l'aorte, & du ventricule gauche. L'embouchure du ventricule droit eſt auſſi tendineuſe, mais toutes les *fibres*, qui ſe terminent autour de l'artere pulmonaire, ſont charnues à leurs extremités.

Leur étendue.

De toutes les *fibres*, qui partent de l'embouchure du ventricule droit, & de celle de l'artere pulmonaire, il n'y a que les plus exterieures, leſquelles ſont beaucoup plus fines que les autres, qui deſcendent en droite ligne juſqu'à la pointe du *cœur*. Toutes les autres *fibres*, qui ſont près de la ſurface du *cœur*, s'avancent à gauche juſqu'à la pointe, en tournant ſous elles-mêmes, & en paſſant ſous le ventricule droit, juſqu'à leur inſertion, qui eſt à la bâſe du *cœur*. On obſerve que par deſſous les *fibres* droites il en paſſe encore quelques autres, qui vont preſque en ligne droite, depuis l'embouchure du ventricule droit, juſqu'à l'artere pulmonaire. Il y en a d'autres qui

qui vont du côté opoſé de cette artere ſe rendre au ſecond tendon de l'aorte. Ces deux eſpèces de *fibres* dilatent l'embouchure de l'artere pulmonaire, pendant la contraction du *cœur*. On en trouve, au deſſous de celles-ci, quelques-unes qui deſcendent obliquement du premier tendon de l'aorte vers la pointe, & qui, quand elles arrivent au milieu du ventricule droit, remontent de nouveau juſqu'à l'origine de l'artere pulmonaire, où elles ſe terminent aux colomnes charnues, & aux pilliers. Celles-ci contractent les ventricules, & dilatent les arteres, en même tems. Les orifices des ventricules ſont auſſi environnés de *fibres* ſemi-circulaires, qui aident les valvules dans la contraction, ou ſyſtole du *cœur*. On trouve dans le côté du *ſeptum medium* qui eſt auprès du ventricule droit, des *fibres* qui vont en ligne droite de la bâſe au ſommet du *cœur*. Toutes les autres *fibres* ſont uniquement arrangées autour du ventricule gauche; & il y en a qui vont à moitié chemin de la pointe, & d'autres plus qu'à moitié chemin; après quoi elles retournent à la bâſe par le côté opoſé. Quelques-unes ſe terminent aux colomnes charnues, & les autres tournent autour de la pointe. Il eſt

CHAP. VIII.

CHAP. VIII.

eſt croyable qu'elles environnent le *cœur* plus d'une fois, pendant qu'elles ſortent de la bâſe, & qu'elles y reviennent. Il eſt donc évident qu'il y a beaucoup plus de *fibres* qui environnent le ventricule gauche, qu'il n'y en a pour le ventricule droit, parceque celui-ci eſt uniquement deſtiné à pouſſer le ſang dans les poumons, où il ne trouve pas beaucoup de reſiſtance, pendant l'expiration; & que l'autre eſt obligé de le pouſſer dans toutes les parties du corps, même juſqu'aux extremités, & de le faire revenir. Or afin que la force de la contraction de ce ventricule fût également grande partout, & que la ſtructure du *cœur* fût plus forte, l'auteur de la Nature a voulu que ſes *fibres* ne fuſſent pas entierement paralelles, ni obliques dans le même ſens; au contraire on obſerve que les inferieures croiſent toujours les exterieures, & qu'elles s'entrelaſſent ſouvent l'une avec l'autre.

Uſage du ventricule gauche.

Le *cœur*, de même que ſes deux *oreillettes*, a deux ſortes de mouvemens, qu'on apelle *ſyſtole*, & *diaſtole*. Pendant que les *oreillettes* ſe rempliſſent de ſang, & qu'elles ſont en *diaſtole*, le mouvement de *ſyſtole* ſe fait dans le *cœur*; ſes fibres ſe contractent; ſes côtés s'enflent, & ſes cavi-

Double mouvement du cœur & de ſes oreillettes.

cavités se resserrant de tous côtés, il pousse le sang dans les arteres. Le mouvement de *diastole* se fait quand le *cœur* & ses fibres cessent d'agir : alors ses fibres s'allongent, comme pour prendre du repos ; les côtés s'affaissent ; ses cavités, devenant plus grandes, reçoivent le sang poussé par les *oreillettes*, qui sont pour lors en *systole*. Ainsi ces deux sortes d'actions des *oreillettes*, & du *cœur*, se contiennent alternativement, pour entretenir la circulation du sang dans toutes les parties du corps. CHAP. VIII.

## CHAPITRE IX.

### *Des arteres en general.*

Deſcription des arteres.

L'*Artere* eſt un vaiſſeau élaſtique, de figure preſque conique, & deſtiné à diſtribuer dans toutes les parties du corps le ſang qu'elle reçoit du cœur. Elle eſt accompagnée de pulſation ; c'eſt à dire qu'elle a, comme le cœur & ſes oreillettes, un mouvement de ſyſtole, & de diaſtole. Il n'y a que deux arteres dans tout le corps, qui ſont l'*artere* pulmonaire, & l'aorte, dont toutes les autres ne ſont que des rameaux.

Leurs membranes.

Chaque *artere* eſt compoſée de quatre *membranes*, dont on peut nommer la premiere la vaſculeuſe. Il ſemble qu'elle n'eſt autre choſe qu'un tiſſu de petits vaiſſeaux ſanguins, & de nerfs, qui ſervent à la nouriture des *membranes* de l'*artere*. La ſeconde eſt compoſée de fibres circulaires, ou plutôt ſpirales, dont on en trouve plus ou moins de couches, à proportion de la groſſeur de l'*artere*. Ces fibres, qui ſont élaſtiques, & très ſenſibles de leur nature, ont beaucoup de reſſort dans leur

leur plus grande extenſion : c'eſt pour cela qu'elles ſe contractent, pour repouſſer avec force la puiſſance qui les tenoit tendues, ce qui opere leur ſyſtole. La troiſieme, & la plus interieure, eſt une *membrane* mince, compacte, nerveuſe, & tranſparente, qui retient les globules du ſang dans ſon canal, leſquels ſans cela pouroient facilement ſéparer les fibres ſpirales l'une de l'autre, dans le tems que l'*artere* ſe dilate ; mais qui eſt néanmoins poreuſe & penétrable à la partie la plus ſpiritueuſe de la lymphe, & de cet eſprit de vie renfermé dans les globules du ſang. La quatrieme *membrane* eſt ſituée entre la vaſculeuſe, & la muſculaire. Elle eſt formée par une infinité de cellules membraneuſes qui facilitent la dilatation de l'*artere*, & qui reçoivent, des globules du ſang, ce qu'il y a de plus pur, pour le faire entrer, lorſque l'*artere* ſe contracte, dans les ramifications des vaiſſeaux répandus ſur la membrane vaſculeuſe, ainſi que dans les *arteres* capillaires, afin qu'il anime & vivifie toutes les parties du corps.

Les arteres, principes des veines.

L'*artere* n'eſt point parfaitement conique ; car les extremités de ſes rameaux, qui s'uniſſent & s'anaſtomoſent avec ceux des veines, doivent néceſſairement être cilindriques. Elles forment des tiſſus,

CHAP. IX.

& des pelotons d'*arteres* capillaires qui après cela ſe changent en veines, en vaiſſeaux lymphatiques, ou en conduits excrétoires: de ſorte que tous les vaiſſeaux de notre corps ſont une continuation des *arteres*: les nerfs même en tirent leur origine. Toutes les membranes des *arteres* diminuent en épaiſſeur, à meſure qu'elles ſe diviſent & qu'elles s'éloignent du cœur.

Explication de la pulſation des arteres.

La ſtructure des *arteres* étant telle que nous venons de le dire, il ſera aiſé d'expliquer la cauſe de leur pulſation. Quand le ventricule gauche ſe contracte, & pouſſe le ſang dans la grande *artere* qui eſt en diaſtole, le ſang eſt pouſſé non ſeulement vers les extremités, mais auſſi lateralement vers les côtés de l'*artere* qu'il dilate. Pour lors l'eſprit de vie, qui eſt dans le ſang, s'échape à travers les ports de la troiſieme membrane, malgré ſa compacité; entre dans les cellules de la quatrieme, ou ſeconde; & ſe faiſant ſentir aux fibres de la muſculaire, qui ſont d'un ſentiment exquis, il les oblige à ſe contracter: ce qui produit la ſyſtole de l'*artere*, tandis que ſe fait la diaſtole du cœur. Lorſque le ſang ceſſe de pouſſer les côtés de l'*artere*, les fibres ſpirales, qui ont naturellement beaucoup d'élaſticité, contractent l'*artere*, compriment

ment les cellules, pour faire entrer & penétrer l'eſprit de vie, & reprennent enſuite leur état précédent, juſqu'à ce que la ſyſtole du cœur faſſe de nouveau dilater l'*artere*. Le battement de l'*artere* ſe fait dans le tems de ſa dilatation, & que le cœur eſt en ſyſtole. Le tems que les fibres ſpirales employent à ſe remettre dans leur état naturel, fait l'intervale qui eſt entre les deux battemens. Les *arteres* du corps battent toutes en même tems; car d'abord que le cœur a pouſſé le ſang dans l'aorte, cette *artere* étant pleine de ſang doit dilater en même tems toutes les *arteres*; & comme les *arteres* ſont preſque coniques, & que le ſang ſe meut de la bâſe à la pointe du cône, il doit par conſéquent preſſer les parois des vaiſſeaux; & chaque point de l'*artere* doit ſe dilater, en même tems que le ſang eſt pouſſé par le ventricule gauche du cœur. Comme le reſſort, ou la vertu élaſtique des fibres ſpirales, eſt capable de vaincre l'impulſion du ſang, les *arteres* ſe contractent. CHAP. IX.

Il y a donc deux cauſes qui, operant alternativement, tiennent le ſang dans un mouvement continuel, qui ſont le cœur, & les fibres des *arteres*; mais comme l'une eſt plus forte que l'autre, il arrive que, quand on ouvre une *artere*, Deux cauſes du mouvement du ſang.

CHAP. IX.

le ſang coule en ſautant, quoi qu'il circule ſans intermiſſion.

L'artere pulmonaire.

Le canal de l'*artere pulmonaire*, qui part immédiatement du ventricule droit, ne s'étend pas loin, puiſqu'il va ſe terminer dans les poumons, qui touchent le cœur; mais le tronc, & les branches & rameaux de cette *artere*, qui ſe diſtribuent dans les deux lobes du poumon, ſont plus larges, à proportion, que ſon embouchure, qui eſt à la bâſe du cœur, & qui eſt plus petite que celle de la veine cave: ce qui fait que le battement de cette *artere* ne doit pas être conſiderable, parceque ſa cavité étant beaucoup plus grande que ſon embouchure, elle eſt comme un milieu qui abſorbe le battement, de même qu'un double ſoufflet abſorbe le vent qu'il pouſſe: de ſorte que le ſang coule preſque également dans les vaiſſeaux du poumon; outre que d'ailleurs il y entre avec facilité, lorſque les poumons ſe dilatent. Il peut même y être attiré comme par aſpiration, de la même maniere que l'eau eſt attirée par une pompe: ce qui facilite ſon entrée dans les ramifications des vaiſſeaux capillaires des poumons, & eſt cauſe que le ventricule droit n'a pas beſoin de tant de force. Si le battement de l'*artere pulmonaire* étoit auſſi conſiderable que celui de l'aorte, il

in-

interromperoit la contraction des poumons, & feroit crever les vaiſſeaux, lorſque l'*artere* ſe contracteroit dans le même tems que les poumons : d'où il s'enſuit qu'il ne doit point y avoir de battement ſenſible dans les branches & rameaux de l'*artere pulmonaire*, & que le ſang doit couler également dans ce viſcere.

L'aorte, ou grande artere.

L'*aorte*, ou *grande artere*, n'a qu'un ſeul tronc qui ſort immédiatement du ventricule gauche du cœur, un peu au deſſus de ſes valvules. Elle envoye au cœur deux rameaux, avant que de percer le pericarde ; mais après qu'elle l'a percé, elle monte un peu afin de ſe courber en maniere de croſſe, pour former le tronc de l'*aorte* deſcendante. Trois branches ſe ſéparent de la partie ſuperieure de ſa courbure : deux du côté gauche, qui ſont la ſouclaviere & la carotide, & une du côté droit, qui eſt la ſouclaviere d'où la carotide droite prend ſon origine, proche de l'*aorte*.

Rameaux des deux ſouclavieres.

Les deux *ſouclavieres* envoyent pluſieurs branches, d'où naiſſent pluſieurs *arteres*, qui ſe diviſent enſuite en rameaux, dont quelques-uns ſe diſtribuent dans la moelle de l'épine, au cerveau, dans les muſcles du cou, dans les parties exterieures des omoplates, dans les côtes

CHAP. IX.

tes ſuperieures, dans le médiaſtin, à la fagoue, au pericarde, dans le diaphragme, dans les mamelles, dans pluſieurs muſcles du thorax & de l'abdomen, & dans la partie du ventre au deſſus du nombril. D'autres ſe diſtribuent dans les parties au deſſous des omoplates, aux parties exterieures du thorax, & dans les bras & les mains.

Des arteres carotides.

Les *arteres carotides*, à meſure qu'elles montent, une de chaque côté, le long de la *trachée-artere*, donnent quelques rameaux au larynx, à la glande thyroïde, & à la *trachée-artere*. Après cela, elles donnent quatre rameaux conſiderables, qui ſe diſtribuent, les uns aux muſcles du pharynx, de la machoire inferieure, & aux lèvres; les autres dans la partie poſterieure du cou, dans la peau de la partie poſterieure de la tête, & dans le nez, les yeux, & les oreilles. Toutes les parties externes reçoivent auſſi leur ſang des *arteres carotides* externes. La *carotide* interne ſe diſtribue dans les os pierreux, la dure-mere, la glande pituitaire, le cerveau, & le cervelet; ainſi que dans les parties internes des yeux, des oreilles, & du nez.

Productions de l'aorte deſcendante.

Le tronc deſcendant de l'*aorte* garde le nom d'*aorte* juſqu'à l'*os ſacrum*. Il produit l'*artere* bronchiale qui accompagne

la

la *trachée-artere*. Enſuite, à meſure que l'*aorte* deſcend tout le long des vertèbres du thorax, elle produit les intercoſtales inferieures, qui ſe diſtribuent le long des côtes : elle donne des branches aux muſcles de l'abdomen, dans l'œſophage, & dans le diaphragme inferieur : elle produit la cæliaque, qui ſe partage en deux branches; l'une à droite, allant à l'eſtomac, & ſe partageant en ſix ou ſept rameaux qui vont à l'eſtomac, au pancréas, à la veſicule du fiel, à l'*omentum*, au *duodenum*, & au *jejunum* en partie, & à l'épatique, pour le foye, laquelle entre dans ſa capſule commune, pour accompagner les branches de la veine porte; l'autre à gauche, laquelle produit quelques rameaux s'étendant dans l'eſtomac, l'*omentum*, & la rate qui donne pluſieurs branches au pancréas. Enſuite l'*aorte deſcendante* produit la meſenterique ſuperieure, qui ſe diſtribue dans les inteſtins grêles, & dans le meſentere; elle envoye deux autres branches aux reins; d'autres aux glandes atrabilaires; les ſpermatiques aux teſticules dans les hommes, & à la matrice dans les femmes; la meſenterique inferieure au meſentere & aux gros inteſtins. Elle en produit encore d'autres qui ſe diſtribuent dans les muſcles des

CHAP. IX.

CHAP. IX.

lombes & de l'abdomen, & dans les parties voiſines ; & la ſacrée, qui deſcend par le milieu de l'*os ſacrum* dans le baſſin. Lorſque l'*aorte* arrive à l'*os ſacrum*, elle ſe partage en deux groſſes branches, nommées les *arteres* iliaques, qui ſe diviſent chacune en deux autres : l'une eſt l'iliaque externe, & l'autre l'interne.

Productions de l'iliaque interne.

L'*iliaque interne* produit l'hypogaſtrique, qui fournit des branches à la veſſie, au *rectum*, aux hemorrhoïdes, à la partie externe & interne de la matrice, au vagin, aux veſicules ſeminaires, aux proſtates, à la verge, à l'*os ſacrum*, & à toutes les parties contenues dans le baſſin ſitué entre l'*os ſacrum*, & les os des îles. Enſuite elle produit deux rameaux conſiderables qui ſortent du bas ventre : l'un ſe diſtribue aux muſcles feſſiers ; l'autre produit deux rameaux aſſez gros, dont le premier ſe diſtribue dans les muſcles des cuiſſes, & le ſecond perce l'abdomen, & donne pluſieurs branches au grand feſſier, où il ſe perd.

Et de l'iliaque externe.

L'*iliaque externe*, en ſortant de l'abdomen, produit l'épigaſtrique, qui va joindre l'*artere* mammaire ; la honteuſe qui va à la peau de la verge ; & enſuite trois branches conſiderables, qui ſe diviſent en pluſieurs rameaux répondant

dant à tous les muſcles des cuiſſes, des jambes, & des pieds, juſqu'aux extremités des doigts. CHAP. IX.

Voilà, à peu près, l'ordre & la diſtribution des principales *arteres* de notre corps, dont chacune ſe partage en pluſieurs branches, & chacune de ces branches en d'autres nouvelles branches, qui ſe diviſent encore, juſqu'à ce que tout le corps ſe trouve couvert & penétré d'*arteres capillaires* d'une petiteſſe extrême, avec leſquelles le plus pur ſang eſt porté, & animé d'une nouvelle vie par tout le corps, pour ſon accroiſſement, ſa réparation, ſon entretien, & ſa fécondité. Les arteres capillaires.

CHAPI-

## CHAPITRE X.

### *De la circulation du ſang.*

La circulation du ſang long-tems ignorée.

LA *circulation du ſang* ayant été ignorée juſqu'à *Harvée*, Médecin *Anglois*, qui en a fait la découverte en l'année 1628. on a lieu de s'étonner qu'il ſe ſoit paſſé tant de ſiècles, depuis le commencement du monde, ſans que les hommes ſe ſoient aviſés de pouſſer leurs recherches juſque là, & que tant de Philoſophes, & de Médecins celèbres, qui ont brillé dans l'Antiquité, auſſi-bien que ceux qui les ont ſuivis, ſoient demeurés ſur ce point dans une erreur, & dans une ignorance ſi extraordinaire. Mais on n'a pas moins lieu d'être ſurpris que, depuis cette importante découverte, on n'ait point donné de notion certaine de la cauſe qui opere cette *circulation du ſang*, & qui produit la règle, & le mouvement de ſyſtole & de diaſtole des oreillettes du cœur, du cœur en particulier, & celui des arteres. C'eſt donc ce que j'entreprens d'expliquer d'une maniere certaine & très ſenſible.

Et mal expliquée juſqu'à preſent.

Pour

CHAP. X.

Les poumons, premier principe du mouvement du ſang.

Pour commencer à expliquer cette admirable *circulation*, il conviendroit de remonter à l'origine des diverſes ſources du *ſang* des veines, qui réuniſſent leurs rameaux, & leurs branches, pour former le tronc de la veine cave, laquelle décharge ce même *ſang* dans le ventricule droit du cœur; & en ſuivant la route qu'il tient dans ſa *circulation*, il faudroit expliquer le dépouillement de ſes impuretés: mais comme j'ai reſolu d'en traiter dans un autre lieu, je me fixerai pour le preſent au *ſang*, tel qu'il eſt lorſqu'il remplit les rameaux d'arteres des *poumons*, pendant l'intervale qui précède leur contraction; car c'eſt de cette partie qu'il a reçu ſa premiere motion, au moment de notre naiſſance. Après avoir ſuffiſament établi l'impulſion de l'air ſur les *poumons*, & la puiſſance des fibres, il nous eſt facile, ſur ces deux principes, d'expliquer la *circulation du ſang*, ſon animation, tous les mouvemens involontaires du corps de l'homme, & ceux même qui dépendent immédiatement de la volonté de l'ame, pour les operations qu'elle conçoit.

Effets de leur contraction.

Si nous conſiderons les *poumons* lorſqu'ils ſe contractent, nous concevrons aiſément que la puiſſance de leurs fibres, qui repouſſent l'air en réuniſſant leur force,

CHAP. X.

ce, comprime, briſe & attenue en même tems les globules du *ſang*, qui remplit les ramifications d'arteres répandues ſur la ſurface des veſicules & des petits lobes des *poumons*, & qu'elle le force à ſe filtrer pour entrer dans les rameaux capillaires de la veine pulmonaire, parcequ'il ne peut retourner en arriere, à cauſe que les valvules lui en ferment le paſſage, & qu'il eſt obligé d'aller toujours en avant, par un progrès ſucceſſif de la contraction réiterée des *poumons*: ce qui fait que la veine pulmonaire doit être par conſéquent continuellement tendue, & gonflée par ce même *ſang* qui y entre, & qui eſt forcé d'entrer dans l'oreillette gauche du cœur, lorſqu'elle ſe trouve en diaſtole. Or en conſiderant l'action de l'air ſur les fibres des veſicules, & des lobes des *poumons* que leur ſenſibilité oblige à ſe contracter, on conçoit facilement qu'en ſe contractant ils compriment l'air, pour le repouſſer, & qu'en le comprimant ils expriment le principe de la vie qu'il contient, lequel eſprit ſe mêle avec le *ſang* pour l'animer, dans le tems que ce même *ſang* ſe purifie, ſe diviſe, & s'attenue, afin de le diſpoſer à ſervir d'un aliment propre à vivifier le corps, & à réparer continuellement ce que la diſſipation lui a fait perdre.

Pour

CHAP. X.

La veine pulmonaire, cauſe motrice.

Pour bien concevoir la cauſe de la règle de la ſyſtole, & de la diaſtole des oreillettes, du cœur & des arteres, il faut ſupoſer que toutes ces parties ſont en repos & ſans action, telles qu'elles ſont dans le fœtus, tandis qu'il eſt dans le ſein de ſa mere, & que leur action dépend de la cauſe motrice, qui tire ſon principe de l'impulſion de l'air ſur les poumons, & de la puiſſance de leurs fibres. Cette cauſe motrice ſera la *veine pulmonaire*, gonflée de *ſang*, telle que nous venons de la repreſenter. Sa premiere action eſt de pouſſer le *ſang* dans l'oreillette gauche du cœur, laquelle ſe dilate. Cette oreillette étant dilatée juſqu'à un certain point, ſes fibres, qui ſont d'un ſentiment exquis, l'obligent à ſe contracter, en pouſſant le ſang qu'elle contient dans le ventricule gauche du cœur, qui eſt contraint de ſe dilater à ſon tour, & de ſe contracter enſuite, pour forcer le *ſang* à entrer dans l'aorte. Cette artere ſe dilate pour le recevoir, & ſe contracte auſſi-tôt que la ſenſibilité de ſes fibres eſt irritée, pour pouſſer le *ſang* arteriel dans toutes les parties du corps, lequel, après les avoir nouries, & ranimées, ſe filtre & entre par une infinité de vaiſſeaux capillaires dans les rameaux des veines, qui ſe réuniſſent pour former le

tronc

CHAP. X.

tronc de la veine cave. Cette veine décharge le *ſang* dans le ventricule droit du cœur, d'où il eſt pouſſé dans l'*artere pulmonaire*, & dans les poumons, où il achève ſa révolution, après avoir circulé & penétré tout le corps.

La circulation du ſang entretenue par la ſyſtole & la diaſtole.

Si à cette premiere action de la cauſe motrice il en ſuccède une autre, & qu'à cette autre il en ſuccède continuellement de nouvelles, & autant de tems que durera la vie de l'homme, il ſera vrai de dire que le *ſang* ne diſcontinuera point de circuler, & que néceſſairement ſon mouvement, & le battement du cœur & des arteres, ſeront réglés par les fibres de l'oreillette gauche du cœur, & par la meſure du *ſang* qu'elle reçoit dans la *diaſtole*, & qu'elle envoye au cœur pendant la *ſyſtole*.

Son cours dans tout le corps.

Par cette admirable œconomie le *ſang* eſt porté du cœur aux poumons, par l'artere pulmonaire, & par l'aorte dans toutes les parties du corps. Il eſt raporté dans le cœur par la veine cave, & en même tems par la veine pulmonaire; enſorte néanmoins que le même *ſang* ne revient point au lieu d'où il eſt parti, qu'il n'ait circulé dans tout le corps de l'homme. Car le *ſang*, qui vient des poumons, & qui va au cœur dans le ventricule gauche par la veine pulmonaire, eſt porté du même lieu dans l'aorte, &

par

par l'aorte dans toutes les parties du corps. De toutes ces parties il eſt raporté au cœur par la veine cave dans le ventricule droit : de là il eſt pouſſé par l'artere pulmonaire dans les poumons, d'où il revient de nouveau au cœur par la veine du même nom, pour continuer de la même maniere ſa *circulation*. CHAP. X.

C'eſt ainſi que l'auteur de la Nature a voulu qu'il y eût une dépendance dans toutes les créatures, en ſorte qu'il n'y en eût aucune en particulier qui ne dépendît d'une autre, afin de donner à l'homme, dans ſes recherches, un moyen ſûr pour acquerir par dégré la connoiſſance du premier principe, & de la premiere cauſe qui eſt Dieu, & afin que le connoiſſant par ſes créatures, il ſe ſentît porté à le glorifier, à l'aimer, & à lui obéir comme à ſon Souverain, ſon principe & ſa derniere fin, de qui il tient ſon être & de qui il doit eſpérer ſon bonheur & ſa felicité éternelle. Reflexion ſur la dépendance établie entre les créatures.

Cette dépendance de motion, que nous établiſſons & que nous avons commencé d'expliquer, laquelle opere la *circulation du ſang*, exige que nous obſervions plus particulierément l'œconomie & la mécanique du *cœur*, & de ſes *oreillettes*. Il eſt très conſtant que le mouvement du *cœur* dépend de celui de ſon *oreillette* Mécanique du cœur & de ſes oreillettes.

CHAP. X.

gauche, & que c'eſt elle qui en fait la règle. Le *ſang*, qui remplit la veine pulmonaire, fait le même effet ſur l'*oreillette* gauche, que l'air ſur les poumons; & les fibres de cette *oreillette* font le même effet que celles des poumons. En conſiderant l'action des fibres de l'*oreillette* gauche comme la premiere puiſſance motrice qui dilate le ventricule gauche du *cœur*, nous concevons auſſi qu'elle eſt la premiere cauſe de la dilatation du ventricule droit, qui ſe fait en même tems, parceque les fibres de ce ventricule ont leur principe dans le ventricule gauche, & qu'il y en a beaucoup de celui-ci qui embraſſent le ventricule droit : ce qui fait que quand le *cœur* ſe dilate, après s'être contracté dans ſa ſyſtole, ſes fibres ſe relâchent toutes en même tems, pour recevoir dans les deux ventricules le *ſang* qui y eſt pouſſé par les deux *oreillettes*, pendant leur ſyſtole. Il s'enſuit de là que le ventricule droit dépend du gauche, comme l'effet dépend de ſa cauſe. Par la même raiſon, le mouvement de l'*oreillette* droite dépend de celui de ſon ventricule; car le *ſang*, qui la remplit, & qui l'oblige à ſe contracter, n'entreroit point dans ce ventricule, s'il ne ſe trouvoit pas en diaſtole: mais comme il s'y trouve en même tems que le gauche, l'*oreillette*

*reillette* droite doit être par conſéquent en ſyſtole, en même tems que la gauche: ce qui fait voir l'œconomie admirable du *cœur*; la dépendance du ventricule gauche, de ſon *oreillette*; celle du droit, du gauche; & celle de l'*oreillette* droite, de ſon ventricule. On voit auſſi la dépendance du mouvement des arteres, de celui du *cœur*, & celle du mouvement du *ſang* des veines, de celui des arteres. CHAP. X.

Il eſt évident par tout ce que je viens de dire, que les *oreillettes* ſe contractent en même tems l'une que l'autre, de même que les *ventricules*; & que lorſque les *ventricules* ſe dilatent, les *oreillettes* ſe contractent, comme les *oreillettes* ſe dilatent, quand les *ventricules* ſe contractent. Afin d'expliquer ſenſiblement ce mouvement alternatif des *oreillettes*, & des *ventricules* du *cœur*, auſſi-bien que des arteres, je les ai repreſentés dans deux figures * ſemblables, mais dont les mouvemens ſont marqués differemment; car ce qui eſt en ſyſtole dans l'une, eſt en diaſtole dans l'autre. On y verra auſſi dans l'une la contraction des poumons, du thorax, & de l'abdomen, & dans l'autre leur dilata- Dépendance du mouvement alternatif des oreillettes & des ventricules.



* Placées à la tête de cet Ouvrage.

CHAP. X. Trois obſervations ſur les ventricules.

tion, avec leur ſituation & celle du *cœur*, des arteres, & des veines. Il y a trois obſervations importantes à faire ſur l'action, & l'uſage des *ventricules* du *cœur*. Voici ces obſervations.

I. obſervation.

Quoique le *ſang*, qui vient dans le *cœur* par la veine cave, ne ſoit pas pouſſé dans le *ventricule* droit avec tant de force que celui qui entre dans le *ventricule* gauche, par la veine pulmonaire, & qu'il entre avec facilité dans les poumons, lorſqu'ils ſe dilatent, ce *ventricule* ne laiſſe pas d'avoir beſoin de force pour ſe contracter. Il ne la peut recevoir de ſes propres fibres, mais bien de celles du *ventricule* gauche qui l'aide à ſe contracter ; car le *ſang*, qui y entre aiſément, ne peut faire ſur ſes propres fibres une impreſſion ſuffiſante, & capable de l'obliger à ſe contracter par lui-même, ſoit par la pulſation du *ſang*, qui eſt lente & foible, ſoit par la vertu de ce même *ſang*, laquelle eſt très diminuée, parcequ'il en a perdu en ſon chemin la meilleure partie, & que ce qui lui en reſte eſt offuſqué par des impuretés, dont il s'eſt chargé dans les lieux où il a paſſé, & qu'il doit dépoſer dans les poumons pour être expulſées. Par conſéquent il ne peut employer, pour ſe contracter, que la force des fibres du *ventricule*

*cule* gauche, l'action & la vertu du *ſang* ſur ſes propres fibres étant trop foibles pour faire cet effet. CHAP. X.

Si le *ventricule* gauche eſt plus grand que le droit, c'eſt afin qu'il y reſte plus de *ſang*, après la ſyſtole. Ce ſang ſert de levain, ou de ferment, à celui qui y entre de nouveau, pour digerer la nouriture qu'il a reçue du chyle, ou pour changer entierement le chyle en *ſang*, avant que d'être porté par l'artere pulmonaire dans les poumons, afin qu'il ſoit diſpoſé à recevoir, par l'impreſſion de l'air, le principe de la vie qui y eſt contenu. II. obſervation.

La troiſieme obſervation eſt que le *ſang*, qui entre dans le *ventricule* gauche, eſt forcé par la contraction des poumons, & celle de l'*oreillette*, cette force étant néceſſaire pour pouſſer avec une eſpèce de violence le *ſang* alimenté de nouveau, & animé des ſubſtances de l'air pendant la diaſtole, dans toutes les cavités de ce *ventricule*, dont les fibres étendues, & qui ſont d'un ſentiment exquis, recevant l'impreſſion de cette diaſtole, font effort en ſe contractant pour reſſerrer le *cœur*, & pouſſer par une force ſuperieure le *ſang* dans l'aorte, & même dans l'artere pulmonaire, par ſes fibres qui agiſſent ſur le III. obſervation.

CHAP. X.

*ventricule* droit en même tems, pendant la durée de la ſyſtole du *cœur*: d'où il reſulte que l'air, & ce qu'il contient, eſt la cauſe de tous les mouvemens involontaires dans le corps humain, & que c'eſt par le moyen de ce même air que le *ſang* eſt animé & réparé, à chaque *circulation*.

Erreur ſur la quantité du ſang qui entre dans le cœur & qui en ſort.

Il me paroît que juſqu'à preſent on a été dans l'erreur ſur la quantité du *ſang* qui entre dans le *cœur*, chaque fois qu'il ſe dilate, & ſur celle qu'il pouſſe dans les arteres en ſe contractant. Les meilleurs Anatomiſtes ſemblent ſe tromper ſur ce point. En effet pour que le *cœur* pût pouſſer dans l'aorte, & dans l'artere pulmonaire, deux onces de *ſang*, que ſes deux ventricules peuvent contenir, il faudroit demontrer que les deux oreillettes en peuvent contenir une même quantité; car le *cœur* ne peut donner que la même quantité qu'il reçoit. Or comme il eſt évidemment faux que les oreillettes puiſſent contenir deux onces de *ſang*, le *cœur* par conſéquent ne pouſſe point dans les arteres, en ſe contractant, tout le *ſang* qu'il peut contenir dans ſes deux ventricules. Il en doit reſter la plus grande partie, qui ſert comme de ferment, ou de levain, à celui qui y entre de nouveau, afin de lui don-

donner un dégré de perfection qu'il n'a pas, & qui lui eſt néceſſaire pour l'uſage auquel il eſt deſtiné, & que j'expliquerai dans la ſuite. CHAP. X.

Au lieu d'une once de *ſang*, qu'on ſupoſe qui entre dans chaque ventricule du *cœur*, pendant ſa diaſtole, je prétends qu'il n'y en entre guere que le tiers, qui eſt ce qui peut être contenu en chaque oreillette, & que le *cœur* n'en pouſſe pas davantage dans les arteres : ce qui n'empêche pas que le *ſang* ne coule avec viteſſe dans les arteres & dans les veines, à cauſe de la répétition promte & fréquente de la ſyſtole & de la diaſtole du *cœur*, qui peut être répétée environ quatre-vingt fois par minute. Quelle eſt cette quantité de ſang.

La *circulation du ſang* dans le *fœtus* eſt differente de celle qui ſe fait dans les adultes. Le *ſang* qui va & vient des ramifications d'arteres & de veines, qui ont leur principe & leur fin dans le placenta, & qui forment la veine & les arteres ombilicales, ne peut produire de battement ni de pulſation, parcequ'il y a interruption dans ſon chemin : par conſéquent il doit couler d'un flux égal dans tous ces vaiſſeaux, comme il fait dans les veines des adultes. Ce battement ne doit commencer dans le *fœtus* que lorſque les *poumons* ſe dilatent, dans le tems qu'il ſort Circulation du ſang, & inaction des poumons dans le fœtus.

CHAP. X.

du ſein de ſa mere, à cauſe que le *ſang* ſe fait une nouvelle route, differente de la premiere, par l'action de l'air ſur les *poumons*, qui n'étoient auparavant d'aucun uſage.

Changement des vaiſſeaux lymphatiques en vaiſſeaux ſanguins.

Les arteres & les veines, qui s'accompagnent partout, ſont unies par des fibres, & des *vaiſſeaux lymphatiques* qui leur ſont communs. Ces *vaiſſeaux lymphatiques*, où les globules du *ſang* ne peuvent paſſer, deviennent quelquefois des *vaiſſeaux ſanguins*, & des veines, quand il y a obſtruction en quelque partie, & ſurtout quand un membre du corps a été retranché. Pour lors ces *vaiſſeaux ſanguins*, qui étoient auparavant des *lymphatiques*, déchargent le *ſang* qui vient des arteres, dans les veines dont ils ſont accompagnés, parceque le *ſang*, qui eſt forcé dans l'artere, ne pouvant plus circuler à ſon ordinaire dans la partie obſtruſe, ou retranchée, ſe fait une nouvelle route pour entrer dans les veines; ce qui cauſe dans cette partie, quand ce ne ſeroit qu'au bout du doigt où il y auroit un panaris, un battement que l'on ſent, & qui ne ceſſe point juſqu'à ce que cette route ſoit ſuffiſante pour la *circulation*. Pendant ce tems il y a de la fièvre, & quelquefois des accidens, parceque le *ſang* de l'artere eſt obligé de re-

Accidens qui le précèdent.

fluer

fluer ailleurs, ou de forcer les lieux où il ne peut paſſer aſſez librement ; & c'eſt de ces accidens que provient ordinairement la gangrene. Mais il faut la prévenir par des ſaignées faites à propos ; car ſi on attendoit qu'elle fût formée tout à fait, la ſaignée pouroit être dangereuſe, en ce qu'elle attireroit dans la maſſe du *ſang* la corruption & le venin de la gangrene. CHAP. X.

## CHAPITRE XI.

### *De la perfection du ſang des arteres, & de ſon uſage en general.*

Nature du ſang des veines.

LE *ſang* des veines, conſideré dans ſon origine, ou dans ſes diverſes ſources, a été formé & produit par autant de principes particuliers qu'il y a de *matrices* dans le corps humain, leſquelles déterminent & tranſmuent en ſon eſſence les diverſes ſubſtances qui entrent dans ſa compoſition, & qui lui ſervent de nouriture & de véhicule, joint à un reſte d'eſprit de vie qui l'anime.

Comment il acquiert ſa perfection.

Premierement ce *ſang*, avant que d'entrer dans les arteres, & d'avoir acquis ſa perfection, doit être premierement dépouillé de ſes excrémens qui s'en ſéparent par les crachats, & par l'évacuation ſuperflue de la lymphe expulſée par la tranſpiration, ou par les urines.

En ſecond lieu, il doit être animé de nouveau par le principe univerſel, ou cet *eſprit* de vie contenu dans l'air, qui lui eſt communiqué par le moyen des poumons.

En

CHAP. XI.

En troiſieme & dernier lieu, il doit achever ſa perfection par deux dégrés de digeſtion : l'un dans le ventricule droit du cœur, avant que d'entrer dans l'artere pulmonaire, & dans les poumons ; l'autre dans le ventricule gauche, avant que d'entrer dans l'aorte.

Effet de ſes deux dégrés de digeſtion.

Le premier dégré de digeſtion que le *ſang* acquiert dans le ventricule droit, forme l'union intime des diverſes ſubſtances qui entrent en ſa compoſition, & change entierement le chyle en ſa nature. Le ſecond dégré de digeſtion, qui ſe fait dans le ventricule gauche, unit au *ſang* le principe de vie qu'il a reçu de l'air dans les poumons, lequel s'inſinue dans le centre de chaque globule dont il eſt compoſé, & où il ſe joint à ſon ſemblable qui y reſidoit déja, afin d'augmenter ſa force & ſa vertu. La chaleur du cœur excitée par le mouvement, dans cette digeſtion, anime le *ſang*, l'échauffe, lui donne ſa derniere perfection, avant que d'entrer dans l'aorte, & le rend propre à vivifier, & à nourir les parties, où il doit paſſer.

Difference du ſang des veines d'avec celui des arteres.

Le *ſang*, qui entre dans l'artere pulmonaire, eſt par conſéquent moins pur, moins animé, & moins parfait, que celui qui entre dans l'aorte, parce qu'outre qu'il a un dégré de moins de digeſtion

que

CHAP. XI.

que l'autre, & qu'il n'a pas encore comme lui un ſurcroît de vertu, ou cette nouvelle vie qui vient de l'air, il a auſſi quelque impureté nuiſible qu'il a reçue en ſon chemin, laquelle il doit dépoſer en paſſant dans les poumons, & que l'autre n'a pas. Il a beſoin d'ailleurs d'être attenué, & rendu plus ſubtil pour circuler, & pour penétrer les parties où il doit paſſer, lorſqu'il aura acquis la qualité de *ſang* arteriel.

Trois uſages du ſang des arteres.

L'uſage en general du *ſang* des arteres, après qu'il a reçu ſa perfection dans le ventricule gauche du cœur, eſt premierement d'animer & de vivifier le corps humain dans toutes ſes parties, ſoit pour le ſervice des ſens, pour les fonctions organiques, & pour les mouvemens qui dépendent de l'ame, ou pour les autres mouvemens que l'on apelle involontaires.

En ſecond lieu, il eſt porté dans les glandes, comme dans autant de *matrices* particulieres, pour les animer, & pour entretenir leur vertu, afin de les rendre propres à digerer, ſpécifier, & déterminer leur ferment, pour la production des diverſes ſubſtances qui ſont employées à la digeſtion & tranſmutation des alimens, à la production du chyle, de la lymphe, du *ſang*, & de toutes les

ſub-

ſubſtances néceſſaires à la vie, & à l'entretien du corps. CHAP. XI.

Le troiſieme uſage du *ſang* des arteres eſt de porter le principe de la vie & de la fécondité dans les parties deſtinées à la generation, pour la multiplication & production de l'eſpèce.

Le premier uſage du *ſang* des arteres maintient la vie dans ce qui exiſte, & dans ce qui peut recevoir accroiſement; dans les ſens du corps, dans les muſcles qui ſont ſoumis à la puiſſance de l'ame, & qu'elle fait agir comme il lui plaît, à l'égard de tout ce quelle conçoit; & enfin dans les autres parties qui ſont ſoumiſes aux mouvemens involontaires. Effets qu'ils produiſent.

Le ſecond uſage du *ſang* des arteres nourit, entretient, répare la vie du corps, & le fait croître juſqu'à la hauteur qu'il doit avoir, & qui forme ſa taille: après quoi le corps ne peut plus croître qu'en groſſeur.

Le troiſieme uſage multiplie la vie, & perpétue l'eſpèce.

Ces trois principaux uſages du *ſang* des arteres comprennent tous les autres que j'expliquerai dans la ſuite plus en détail.

Quand je parle ici de la perfection du *ſang*, je ſupoſe un corps ſain, & qui De quelle perfection

CHAP. XI.

du ſang on veut parler.

qui jouit d'une pleine ſanté ; car dans un corps malade, ou mal ſain, le *ſang* qui y a contracté le vice de la maladie, ou l'impureté de quelque partie affectée de mauvais principes, n'eſt ni pur, ni parfait, non plus que celui qui eſt produit d'un mauvais chyle, gâté par les fermens d'un eſtomac derangé, ſoit par l'intemperie de l'air, jointe à la mauvaiſe qualité des alimens, ſoit par quelque autre cauſe que ſe puiſſe être, qui occaſionne les dégoûts, & les fièvres réglées.

Remède contre le defaut de cette perfection.

Dans ces cas, le purgatif par bas, & même le vomitif, eſt preferable à la ſaignée, pour oter ou diminuer la cauſe de la maladie, après quoi la ſaignée peut être utile, au lieu que ſi la ſaignée précède, le chyle formé de mauvais principes, & qui doit remplacer le *ſang* qu'on a retranché par la ſaignée, continue de porter avec lui dans le *ſang* la cauſe qui a produit la maladie, & il la perpétue malgré les ſaignées réiterées, tant que cette cauſe ſubſiſte dans l'eſtomac.

CHAPI-

## CHAPITRE XII.

### *De l'uſage du ſang des arteres pour la ſenſation, & les fonctions des muſcles.*

LE *ſang* des arteres porte le principe de la vie dans toutes les parties du corps, qu'il anime, & qu'il entretient, mais d'une maniere plus particuliere dans celles où ſe fait la ſenſation, & dans les muſcles, ces parties étant les organes de l'ame par le moyen deſquelles elle connoît, diſcerne, juge, produit, agit, & exerce, quand elle le veut, ou qu'elle le peut, un pouvoir abſolu pour les actions & operations exterieures du corps, qu'elle conçoit, & qu'elle deſire. Toutes les autres actions, & operations materielles, qui ſe font interieurement ſans ſa participation, ſont apellées involontaires, parcequ'elles ne ſont pas de ſon reſſort, & qu'elles ſe produiſent par des principes particuliers qui ne lui ſont pas ſoumis, qui déterminent le principe de la vie à d'autres uſages, & ſur leſquels par conſéquent

Uſage general du ſang arteriel.

Son autre uſage general, moins important.

CHAP. XII.

séquent elle n'a aucun pouvoir immédiat.

Son usage pour la vue.

Le *sang* des arteres, qui vient des carotides internes, porte continuellement le principe de la vie dans toutes les parties des yeux, pour entretenir l'organe de la *vue* ; savoir dans les tuniques, ou membranes, & principalement sur la rétine, où l'impression des objets fait la vision ; dans les humeurs, & particulierement dans celle que l'on apelle acqueuse, qui est une production très subtile & spiritueuse de la lymphe, & qui se renouvelle continuellement ; dans l'humeur cristaline par les petits vaisseaux répandus sur la membrane qui la couvre, & qui environne l'humeur vitrée, dont l'œil reçoit sa figure spherique ; dans les muscles, pour entretenir la puissance qui fait mouvoir les yeux ; dans les nerfs optiques, & dans leurs tuniques, pour être, avec la lymphe, le véhicule de la vision, lequel porte le sentiment dans le cerveau. Les extremités capillaires des arteres, qui s'insinuent dans toutes les parties des yeux, où elles portent le principe de la vie, ne donnent passage qu'à la partie blanche du *sang*, par de petits vaisseaux lymphatiques. Ce qui reste en nature de *sang* est reporté par les vaisseaux capillaires

pillaires dans les veines, qui ſe déchargent dans les carotides, & dans les jugulaires.

Pourquoi les enfans nouveaunés n'ont point l'uſage de la vue.

Les enfans nouveau-nés n'ont l'uſage de la *vue* qu'après pluſieurs jours, parcequ'étant dans le ſein de leurs meres, leurs poumons n'y exercent point leurs fonctions. Par conſéquent le principe de la vie, qui vient de l'air, & qui fait la viſion, n'eſt point attiré, ni porté dans leurs yeux, ou du moins très foiblement, par le *ſang* de leur mere : ce qui fait qu'ils naiſſent preſque aveugles, & ſont longtems ſans voir, & ſans diſcerner les objets qu'on leur preſente, juſqu'à ce que leurs poumons, par des actions réiterées de pluſieurs jours, ayent produit & communiqué une quantité ſuffiſante de ce principe de vie dans leurs yeux ; après quoi ils voyent & diſcernent les objets.

Cauſe de l'affoibliſſement ou de la perte de la vue.

L'affoibliſſement, & la perte de la *vue*, viennent des obſtructions qui ſe forment dans les vaiſſeaux capillaires, & dans les lymphatiques, deſtinés à porter aux parties des yeux le principe de vie, qui doit faire & entretenir la viſion. Ces parties étant privées par de telles obſtructions de la nouriture de ce principe qui fait leur vie, deviennent foibles, languiſſantes &

CHAP. XII.

quelquefois ſans aucune fonction pour produire l'uſage de la *vue*.

Uſage du ſang arteriel pour l'ouie.

Ce principe de la vie eſt porté par le *ſang* arteriel des carotides internes dans l'organe de l'*ouie:* premierement dans les deux parties du nerf auditif; mais particulierement dans la portion molle qui ſe diſtribue dans les cavités du veſtibule, dans les caneaux demi-circulaires, & dans le limaçon, où elle forme des expanſions membraneuſes, qui ſont des inſtrumens de l'oreille interne, & qui communiquent au nerf auditif les ſons qu'il porte au cerveau. En ſecond lieu, ce principe de vie eſt porté dans les muſcles des quatre oſſelets de la caiſſe du tambour, laquelle articule le ſon, qui vient du fremiſſement de l'air ramaſſé par l'oreille externe ſur la membrane du tambour. Les muſcles de ces oſſelets communiquent du mouvement à l'air interieur qui eſt dans la caiſſe du tambour, & dans le veſtibule: cet air interieur fait des impreſſions, & agit immédiatement ſur les expanſions du nerf auditif, dont le ſentiment eſt porté au cerveau par l'irradiation de l'ame ſur cet eſprit de vie, qui eſt ſon inſtrument & ſon véhicule.

Le *ſang* des arteres, après avoir nouri & animé les organes de l'*ouie*, retourne

CHAP. XII.

ne dans les veines jugulaires par les vaiſſeaux capillaires qui leur ſont communs. L'excrément de la lymphe tranſpire exterieurement par la conque: il ſe décharge auſſi par les trompes d'*Euſtache*, derriere la cloiſon du palais.

Cauſe de la ſurdité.

Ce qui fait la privation de la vue dans les enfans nouveau-nés, fait auſſi la privation de l'*ouie*, par le defaut du principe de vie. L'obſtruction interne, ou externe de l'oreille dans les adultes fait la ſurdité.

Uſage du ſang arteriel pour le goût.

Le principe de la vie eſt porté par les rameaux des arteres carotides externes dans les mamelons, qui ſont l'organe du *goût*, & qui ſont formés des extremités des nerfs de la langue, leſquels ont leur origine dans la membrane nerveuſe. Le *ſang* des arteres, après avoir animé & vivifié ces parties, eſt porté dans les jugulaires externes.

Pour l'odorat.

Le *ſang* de l'*odorat* eſt animé & vivifié de même par le principe de vie, qui vient des carotides, & qui retourne au cœur par les jugulaires.

Et pour le toucher.

Le principe de la vie renouvelle & ranime à tout moment l'organe du *toucher*, que l'auteur de la Nature a placé ſur la peau de notre corps, pour defendre toutes les parties qu'elle couvre: de ſorte que la moindre choſe capable de nous

CHAP. XII.

nuire ne ſauroit nous offenſer à notre inſçu.

Diviſion des muſcles.

La plupart des *muſcles* ſont deſtinés aux mouvemens volontaires. Il y en a d'autres qui ont des mouvemens naturels & involontaires, & quelques-uns qui ont des mouvemens mixtes, ou compoſés du volontaire & du naturel.

Leur uſage.

Les premiers ſont les organes & les inſtrumens de l'ame, à laquelle ils ſont ſoumis, comme des Sujets le doivent être à leur Roi : ils reçoivent leurs nerfs du cerveau où l'ame a ſon ſiége, ſon principal domicile, & ſon centre. Les autres qui ont des mouvemens involontaires, ſont aſſujettis à des agens qui les font mouvoir indépendament de la volonté de l'ame, & qui ont pour principe l'action de l'air ſur les fibres. Chaque *muſcle*, & même chaque fibre, a des nerfs, des arteres, des veines, & des vaiſſeaux lymphatiques. Le principe de la vie, après avoir ranimé & vivifié de nouveau leurs fibres, eſt porté avec le *ſang* dans les veines, par les vaiſſeaux capillaires.

Uſage de la lymphe.

La *lymphe* ſert à humecter, temperer & rafraichir les *muſcles*, pour faciliter leurs fonctions organiques. Elle eſt auſſi le véhicule de la lumiere de l'ame, particulierement dans les *muſcles* ſoumis à ſa volonté ; & c'eſt par ſon moyen que, ſans

ſe

ſe mouvoir, l'ame exerce ſur eux un ſouverain pouvoir, dans les actions qu'elle veut produire.

Sa tranſpiration.

Le ſurplus de la *lymphe* s'échape par des conduits excrétoires, & tranſpire, comme une vapeur ſubtile, à travers les pores de la peau. Dans les actions violentes & réiterées des *muſcles*, il s'échape, & ſe perd toujours quelque particule de cet eſprit de vie: ce qui cauſe la laſſitude que l'on reſſent après le travail, la courſe, ou quelque autre mouvement. C'eſt pourquoi il eſt néceſſaire que le repos, & une nouvelle nouriture, réparent cette perte. Le retranchement de la nouriture, & le travail, affoibliſſent le corps, & diminuent la trop grande vivacité des paſſions de la chair. Le trop de nouriture & de repos les irrite, les entretient, les fortifie, & engraiſſe le corps avec excès.

## CHAPITRE XIII.

### *Des mouvemens volontaires.*

Les muſcles, cauſe des mouvemens volontaires.

JUſqu'ici nous croyons avoir ſuffiſament expliqué les cauſes des mouvemens naturels, & involontaires du corps humain. Il eſt à propos maintenant de dire quelque choſe des mouvemens volontaires, qui ſont du reſſort de l'ame; & comme ces mouvemens ſe font par le moyen des *muſcles*, qui en ſont les inſtrumens, il convient, avant que de parler de leurs actions, & de leurs uſages, de décrire leur nature, leur forme, & leur conſtruction.

De la nature des muſcles.

Les *muſcles* ſont ſimples, ou compoſés. Les ſimples ont leurs fibres paralelles, & rangées dans le même ordre. Les fibres des compoſés forment pluſieurs plans de fibres qui ſe croiſent, & qui ont des directions differentes. Ceux-ci peuvent ſe diviſer en autant de *muſcles* ſimples que leurs fibres font de plans differens. Chaque plan de fibres repreſente une figure lozange, ou rhomboïde.

Leur forme.

On

CHAP. XIII.

Leur conſtruction.

On conſidere dans les *muſcles* les extremités qu'on nomme tendons, & le milieu que l'on nomme ventre. On apelle auſſi les extremités la tête, & la queue du *muſcle:* la tête eſt l'extremité qui eſt attachée aux parties vers leſquelles le mouvement ſe fait; & la queue, celle qui eſt attachée aux parties qui doivent ſe mouvoir vers les autres. Les ventres & les tendons ſont compoſés des mêmes fibres, qui ne different qu'en ce que les fibres des tendons ſont plus ſerrées les unes contre les autres; au lieu que celles des ventres ſont plus lâches, & plus écartées: ce qui fait qu'il s'y arrête ordinairement aſſez de ſang pour les faire paroître rouges. On les apelle fibres charnues, pour les diſtinguer de celles des tendons qu'on nomme fibres tendineuſes. Chaque fibre eſt compoſée de petits filets entrelaſſés les uns avec les autres. Les *muſcles* ſont couverts d'une membrane à travers laquelle ils reçoivent le ſentiment; & par conſéquent elle doit être poreuſe.

Leurs differens noms.

On donne des noms differens aux *muſcles.* On apelle congeneres, ou alliés, ceux qui concourent à la même action; antagoniſtes, ceux qui ſervent à remuer les mêmes membres en des ſens contrai-

CHAP. XIII.

res; digaſtriques, ceux qui ont deux ventres; trigaſtriques, ceux qui en ont trois; ſphincters, ceux qui ſont deſtinés à fermer divers trous du corps; tels ſont le *muſcle* qui eſt au col de la veſſie, & celui de l'anus, qui font le même effet que les tirans d'une bourſe pour la fermer. Il y a des *muſcles* qui ont deux ou trois têtes, qu'on apelle *biceps*, & *triceps*. On apelle éleveurs, ceux qui élèvent les parties; abaiſſeurs, ceux qui les font mouvoir en bas; fléchiſſeurs, ceux qui les font fléchir, & plier; extenſeurs, ceux qui les font étendre; mâcheurs ceux qui ſervent à mâcher; adducteurs ceux qui font mouvoir les parties en dehors; rotateurs, ou tournoyeurs, ceux qui les font mouvoir en rond.

Comme nous avons expliqué les cauſes des mouvemens naturels, & involontaires, nous nous diſpenſerons d'en parler ici. Ce ſont donc les mouvemens volontaires que nous avons principalement en vue, & que nous allons expliquer en peu de mots dans ce Chapitre.

Operations de l'ame.

L'*ame*, qui eſt répandue comme une lumiere dans tout le corps de l'homme, & particulierement dans les *muſcles*, &

dans

dans les nerfs qui ſont de ſon reſſort, & ſur leſquels elle exerce un pouvoir abſolu, & immédiat, fait produire au *muſcle* ſon action, quand elle le veut: ce qui ſe fait par le moyen de cet eſprit de vie, qui eſt contenu dans le centre de chaque globule dont le ſang eſt compoſé. Ce principe, ou cet eſprit de vie, qui eſt très proche de l'*ame*, par la nobleſſe de ſon origine, étant mu & excité par la volonté de l'*ame*, enfle & dilate chaque globule du ſang: ce qui oblige les fibres à ſe contracter, & à contracter le *muſcle*, qui en ſe racourciſſant tout d'un coup, tire le tendon, & fait produire le mouvement que l'*ame* exige pour l'action qu'elle veut faire, parceque les globules s'enflant tous en même tems, & rempliſſant les interſtices des fibres, les étendent: ces fibres en s'étendant deviennent plus ſenſibles, & c'eſt ce qui les oblige à ſe contracter, & par conſéquent à contracter le *muſcle*. CHAP. XIII.

Cauſe de la contraction des muſcles.

Les fibres forment dans leurs interſtices une infinité de plans rhomboïdes, dont les angles obtus aprochent fort de la ligne droite, quand le *muſcle* eſt en repos; mais lorſque l'*ame* le veut faire agir, pour lors le ſang, qui eſt dans les interſti-

CHAP. XIII.

ces des fibres, venant à ſe gonfler, chaque interſtice change de figure, & forme un plan dont les angles aprochent plus, ou moins, des angles droits, ſuivant que la volonté de l'*ame* le requiert: ce qui fait la contraction du *muſcle*, parceque ces fibres ſentant, à travers les pores de leurs tuniques, l'impreſſion que fait ſur eux l'eſprit de vie que l'*ame* met en action, elles ſe trouvent obligées par leur ſenſibilité de ſe racourcir, & de contracter le *muſcle* pour lui faire produire ſon action.

Et de l'inſenſibilité de cette contraction.

Quoique la contraction des fibres ſemble être très conſiderable, & en quelque ſorte violente, par ce gonflement des globules du ſang, & par l'irritation des fibres qui les obligent à ſe contracter, cette contraction eſt à peine ſenſible, à cauſe de la petiteſſe des cellules, ou cavités qui contiennent le ſang, & de la grande quantité qu'il y en a dans un *muſcle*; & parcequ'étant enflée chacune en particulier, & toutes à la fois, la force du *muſcle* ſe trouve tellement multipliée, qu'il eſt capable de produire ſon action d'une maniere preſque inſenſible, dans celle même qui exige une grande force.

Erreur des mo-

On s'eſt imaginé juſqu'à preſent que l'*ame*,

l'*ame*, pour faire produire une action, faiſoit partir du cerveau des eſprits, comme des couriers, dont la fluidité ſubtile & rapide, qui les portoit le long des nerfs dans les parties qu'ils devoient faire agir, étoit ſi promte, que l'action ſe faiſoit en même tems que l'*ame* le vouloit, ou le concevoit: ce qui paroît impoſſible & inſoutenable. Car comment accorder ces divers meſſagers de l'*ame*, dans les mouvemens divers des doigts ſur le manche d'un violon, ſur lequel on joue des airs de viteſſe, ou ſur un claveſſin, où l'on fait tant de divers accords; & pourquoi tirer le principe du mouvement de ſi loin, au lieu de dire que l'*ame*, qui a ſon centre dans le cerveau, eſt répandue par tout le corps & juſqu'à ſes extremités, étant une ſubſtance ſpirituelle qui connoît, qui ſent à chaque inſtant, & qui peut ce qu'elle veut, dans tout ce qui lui eſt ſoumis? N'eſt-il pas plus raiſonnable de concevoir que le mouvement, qui ſe fait par ſa volonté, eſt un mouvement local, qui a ſon principe dans le lieu même, ou dans le *muſcle* qui le produit, parceque l'*ame* y reſide par ſa preſence actuelle, & qu'elle y eſt également puiſſante, & auſſi abſolue que ſi elle y étoit toute réunie pour s'y faire obéir, quoique d'ailleurs elle ait ſon principal ſiége dans le cerveau. Soutenir le con-

CHAP. XIII. dernes ſur ce ſujet.

Pouvoir de l'ame reſidant en chaque muſcle.

CHAP. XIII.

Ridiculité du mouvement qu'on attribue à l'ame.

contraire, c'eſt tomber dans le ridicule d'un homme qui avanceroit que l'*ame* agit pour produire les actions du corps, & des membres, par le moyen des nerfs, comme par autant de cordes qui feroient mouvoir du cerveau les parties qui en ſeroient éloignées, comme un habile joueur de marionnettes fait produire à ſes petites figures les actions & les mouvemens qu'il veut, avec ſes doigts, pour divertir les enfans; ou bien dans celui d'un homme qui ſupoſeroit que le cerveau eſt un eſpèce de clavier d'orgue ſur lequel l'*ame* joue, comme il lui plaît, les mouvemens qu'elle veut operer: ce qui ſeroit néanmoins plus ſuportable, & plus vraiſemblable que le mouvement rapide de ces prétendus eſprits que l'on établit avec ſi peu de fondement.

C'eſt la dégrader que de le lui attribuer.

La puiſſance immédiate de l'*ame* ſur les parties du corps ſoumiſes à ſa volonté, comme nous venons de l'établir, ne peut s'expliquer autrement ſans dégrader l'*ame*, à laquelle c'eſt oter quelque portion d'un privilége qui eſt de l'eſſence de ſon être, & qui la rend en quelque ſorte ſemblable à Dieu même dans ſes operations volontaires pour le bien, puiſqu'elle eſt preſente partout dans ſon étendue bornée, comme Dieu l'eſt dans l'Univers. Tel étoit l'état de l'homme avant

ſa

ſa chute. Néanmoins, quoiqu'il ſe ſente porté au mal dans l'état preſent, les mouvemens volontaires ſont toujours du reſſort de ſon *ame*, au lieu que ſes mouvemens involontaires dépendent de la Nature. On peut conſiderer ces derniers comme l'effet des cauſes ſecondes dans l'homme, tels que ſont ceux que nous remarquons dans la Nature; & c'eſt principalement ſous ces deux égards que l'homme eſt apellé *Microcoſme*, ou petit Monde. CHAP. XIII.

CHAPI-

## CHAPITRE XIV.

*De l'uſage du ſang des arteres pour les glandes deſtinées à la production des fluides néceſſaires à la diſſolution des alimens, pour le premier dégré de digeſtion dans l'eſtomac.*

Deſcription des glandes ſimples.

SAns m'arréter ici aux divers ſentimens des Auteurs anciens, & modernes, ſur ce qui doit être reconnu pour *glande*, eu égard à la figure, à la couleur, ou à la ſubſtance, je me fixerai, ſans avoir égard à toutes ces differences, à les conſiderer chacune en particulier comme de petits corps ronds, formés d'une ſubſtance qui leur eſt propre, & renfermés chacun dans leur membrane, qui peut être penétrée, & animée du principe de vie que contient le ſang arteriel. Chacun de ces petits corps a un conduit excrétoire, dont quelques-uns vont ſe rendre dans un reſervoir commun. Chaque petit corps contient en lui un principe, ou une vertu, qui lui eſt propre pour déterminer, par un premier dégré de digeſtion, la matiere, ou le ſang arteriel en

une

une ſubſtance ſpécifique, deſtinée à certains uſages. Par conſéquent les *glandes* doivent être regardées comme autant de premieres *matrices*, ou *matrices* du premier ordre. CHAP. XIV.

L'aſſemblage de pluſieurs de ces petites *glandes* ſimples, contenues dans une ſeule membrane, forme un corps conſiderable que l'on apelle *glande conglobée*, ou *conglomerée*, qui renferme un reſervoir, ou *matrice* du ſecond ordre. C'eſt dans cette *matrice* que la ſubſtance qui vient des *glandes* ſimples ſe digere, ſe perfectionne par un ſecond dégré de digeſtion, & forme une ſubſtance particuliere, & ſpécifique pour l'uſage auquel elle eſt deſtinée. Glandes conglomerées.

On doit concevoir qu'il reſte toujours dans ces *matrices*, après que la ſubſtance liquide, & parfaite, en a été exprimée par la contraction des parties, un levain qui ſert de ferment à la matiere qui y entre de nouveau, pour former une nouvelle ſubſtance comme la premiere: ce qui ſe fait continuellement; de ſorte que toutes les *glandes*, en general, ſont autant de *matrices* qui déterminent, & tranſmuent la matiere animée du principe de vie, en une nouvelle ſubſtance differente de la premiere, par des digeſtions Les glandes ſont des matrices.

pro-

CHAP. XIV.

proportionées, & réglées par les loix de la Nature.

Dans la deſcription que je ferai de l'uſage des *glandes*, je me bornerai ici à celles qui ſont deſtinées à contribuer à la digeſtion, & tranſmutation des alimens.

Glandes pour la ſalive.

Le ſang des arteres carotides eſt porté dans les *glandes* conglomerées qui produiſent la ſalive: ce ſang, animé de l'eſprit de vie, étant tranſmué par le ferment de leurs petites *glandes* en ſalive, qui ſe décharge dans la bouche, ce qui reſte en nature de ſang retourne dans les jugulaires. Il y a dans la bouche un grand nombre de ces *glandes* conglomerées, leſquelles fourniſſent la ſalive qui ſert à la diſſolution & tranſmutation des alimens. Les plus conſiderables ſont les parotides: une à chaque côté, ſituée au deſſous de l'oreille, deſſus le maſſéter.

Conduit ſalivaire.

Les petites *glandes* ſimples, qui ont chacune leur conduit excrétoire, ſe déchargent dans les reſervoirs des *glandes* conglomerées, qui ont auſſi chacune leurs conduits, leſquels s'uniſſent enſemble, & forment le *conduit ſalivaire*. Ce conduit a trois travers de doigt de longueur, & il eſt de la groſſeur d'un tuyau de paille. Après qu'il a paſſé par deſſus le maſſéter, &

& le milieu de la joue, il perce le muſcle buccinateur, & s'ouvre dans la bouche, auprès de la ſeconde dent molaire. Quand le maſſéter agit dans la maſtication, il exprime la ſalive qui tombe dans la bouche.

Defaut de ceux qui avalent ſans mâcher.

Ceux qui avalent ſans mâcher ſont fort ſujets à des indigeſtions, ou ne digerent que la partie la moins ſolide des alimens, faute du ferment de la ſalive, ſi néceſſaire à la digeſtion. Ils forment par ce defaut un ſang qui n'étant pas d'une bonne conſiſtance, eſt ſujet à ſe diſſoudre, & à tomber en fonte; ce qui eſt la cauſe de pluſieurs incommodités & maladies, & produit un temperament avec lequel la vie n'eſt pas de longue durée: au lieu que ceux qui mâchent beaucoup, digerent plus parfaitement ce qu'il y a de plus fixe dans les alimens, à cauſe de la grande quantité de ſalive qui s'y mêle. En mâchant les alimens plus longtems, ils font un ſang d'une bonne conſiſtance, un bon temperament, & vivent plus longtems. Telles ſont les perſonnes qui ont perdu leurs dents, & qui ſont très longues à manger. Combien y en a-t'il qui aiment la vie, & qui ont tant d'interêt à la conſerver, leſquels étant bien perſuadés de ce que j'avance ici, mâcheroient leur nouriture plus qu'ils ne font; ou à qui il

Avantages qui proviennent du contraire.

CHAP. XIV.

ſeroit plus avantageux de ſe faire arracher les dents, afin de vivre plus longtems, que de les garder, pour ne s'en pas ſervir utilement; ou enfin qui ſe priveroient du frivole plaiſir de manger des conſommés, des ragoûts, & des viandes hachées, où la maſtication, qui produit la ſalive, n'a preſque point de part!

Glandes maxillaires.

Le principe de la vie eſt auſſi porté par le ſang arteriel des carotides, dans les *glandes maxillaires*, qui ſont des *glandes* conglomerées, aſſez conſiderables, dans les côtés interieurs des angles de la machoire inferieure. Les conduits excrétoires de leurs petites *glandes* s'uniſſent, & forment à chaque côté un ou deux conduits qui s'ouvrent ſous le bout de la langue, aux côtés interieurs des dents inciſives, où ils ont chacun un petit mamelon à leur orifice. Quand les muſcles de la langue, ou de la machoire inferieure, agiſſent, ils compriment ces *glandes*: la liqueur, qu'elles ont formées, vient dans la bouche, & ſe mêle dans la maſtication avec les alimens, pour contribuer à leur diſſolution.

Glandes ſublinguales.

Le même principe de la vie eſt porté dans les *glandes ſublinguales*, pour produire une liqueur particuliere, deſtinée au même uſage que les précédentes.

Les

CHAP. XIV.

Les deux *amigdales* reçoivent auſſi le ſang des arteres, & le principe de vie, qu'elles tranſmuent par le ferment de leurs petites *glandes* en une humeur gluante qui ſe décharge par le grand ſinus, dans le pharynx, le larynx, & l'œſophage, pour humecter ces parties, & fournir aux alimens, qui paſſent dans l'œſophage, une viſcoſité néceſſaire pour les allier enſemble dans la digeſtion, & pour contribuer auſſi de leur part à leur diſſolution.

Glandes amigdales.

Outre ces *glandes*, il s'en trouve encore un grand nombre de petites répandues ſur la ſurface interne des joues, & des lèvres, ſur la membrane interne de la bouche, & ſur la langue. Leurs conduits excrétoires s'ouvrent dans la bouche. Les liqueurs, qui en viennent, ſont toutes deſtinées à imprégner leurs vertus dans la ſalive, qui ſert à diſſoudre les alimens: vertus qu'elles tirent des principes particuliers de ces *glandes*, qui ont déterminé & ſpécifié le principe univerſel, que leur aporte le ſang des arteres carotides, lequel retourne dans les jugulaires, après s'en être déchargé.

Glandes des joues & de la langue.

Les petites *glandes*, qui ſont ſur la ſurface concave de la membrane ner-

Glandes de l'œſophage.

CHAP. XIV.

veuſe de l'œſophage, produiſent une liqueur viſqueuſe qui enduit la membrane veloutée, pour faire couler & gliſſer les alimens. Cette liqueur tire ſon origine des principes particuliers de ces *glandes*, & du principe de vie qui vient des arteres.

Glandes de l'eſtomac.

La membrane nerveuſe de l'eſtomac eſt pourvue d'un grand nombre de ces petites *glandes* preſque imperceptibles, par leſquelles eſt ſéparée cette liqueur qui enduit toute la cavité de ce viſcere, par les conduits excrétoires qui penètrent la membrane veloutée. C'eſt dans ces petites *glandes* que les arteres capillaires de la gaſtrique droite, de la gaſtrique gauche, & de la gaſtrépiploïque, viennent dépoſer leur ſang, animé du principe de vie, que leur ferment ſpécifie, pour former le ſuc ſtomachique, qui contribue de ſa part à la diſſolution des alimens, avec les autres fermens qui s'y joignent. Ce qui reſte de ſang ſe va rendre dans la veine porte.

Diverſes erreurs des modernes ſur la digeſtion.

La premiere digeſtion qui ſe fait, & qui diſſout les alimens dans l'eſtomac, n'eſt pas telle que bien des gens ſe l'imaginent. Il y en a qui attribuent la converſion des alimens en chyle à la ſeule

seule coction qui se fait par la chaleur de l'estomac ; d'autres à la rarefaction de l'air contenu dans les pores des alimens, & au mouvement produit par celui du diaphragme, & des muscles de l'abdomen. D'autres plus raisonnables admettent, avec les fluides alimentaires, les liqueurs qui viennent des *glandes* salivaires, & des autres *glandes* de l'œsophage & de l'estomac, & prétendent que toutes ces diverses liqueurs unies ensemble, & mêlées avec les alimens par le moyen de la chaleur de l'estomac, & du mouvement, dissolvent les alimens, & divisent leurs meilleures substances en des particules si petites, qu'elles sont capables d'entrer dans les veines lactées, de circuler avec le sang, & d'augmenter son volume, pour être employées à l'accroissement, à l'entretien & à la réparation de notre corps, comme des materiaux de differentes espèces, & de diverse nature, pouroient l'être à la construction, à l'entretien, & à la réparation d'une maison, ou de quelque autre édifice. Or cela est absurde, & insoutenable ; car il faut toujours supposer un changement de nature, & même établir que l'aliment, par ce changement, devient de la même essence que le sujet qu'il nourit. Ce sont les principes des formes,

CHAP. XIV.

Refutation de ces erreurs.

CHAP. XIV.

mes, ou les *matrices*, qui conſtituent cette identité de nature. Sans cela chaque choſe demeureroit dans ſa nature propre, & par conſéquent ne formeroit jamais avec celle de l'homme, cette union intime qui fait ſon eſſence, & ſa nature propre, laquelle n'admet plus aucune difference; au lieu qu'il y en auroit toujours, ſi chaque choſe conſervoit la même nature qu'elle auroit reçue du fond de ſon être: ce qui formeroit plutôt un être confus, & compoſé de differentes natures, qu'une même nature dans un ſeul & même corps. Car quelle difference n'y a-t'il point entre un corps animé, tel qu'eſt celui de l'homme, & les parties ſéparées du corps de diverſes animaux privés de vie, & mêlées enſemble avec d'autres ſubſtances végétables, qui ſont quelquefois en même tems la nouriture de l'homme? Ou quel raport y a-t'il d'une partie d'un animal mort, tant qu'elle ſubſiſte en la nature de ſon eſpèce, avec un corps vivant d'une eſpèce differente? Si cette difference eſt grande, elle l'eſt encore plus entre la partie d'un végétal, & l'homme: d'où il s'enſuit, que toutes les eſpèces differentes des alimens, ſéparées, ou mêlées enſemble dans l'eſtomac, doivent néceſſairement paſſer par une digeſtion naturelle qui les tranſmue

Difference entre le corps animé de l'homme & les parties inanimées des animaux & des végétaux.

Néceſſité de la tranſmu-

mue par la diſſolution de leurs parties, & qui les ramene à l'univerſalité & à la ſimplicité de leurs principes ; afin que leur nature propre, & diverſe, ſoit changée en une ſubſtance unique de la nature de l'homme, qui ait au moins une diſpoſition prochaine, pour conſtituer ſon eſſence.

CHAP. XIV. tation des alimens.

Pour rendre ma propoſition plus ſenſible, il eſt à propos de remonter juſqu'à la ſource, c'eſt à dire juſqu'à la ſimplicité des *élemens*, qui ſont les premiers principes materiels de tous les Mixtes de la Nature inferieure. Les animaux, & les végétaux, qui ſervent à la nouriture de l'homme, ſont formés des quatre *élemens*, par le principe univerſel, & par des principes particuliers qui les ont ſpécifiés. Ils ont tous par conſéquent une même origine, & une même matiere, qui n'eſt differente en eux que par les diverſes modifications que cette matiere a reçues des principes des formes, qui l'ont déterminée & ſpécifiée dans chaque ſujet, étant néanmoins toujours la même dans le fond, quoiqu'elle ſemble être differente. Cette difference aparente vient par conſéquent des principes particuliers, ou des *matrices*, qui ont déterminé la matiere, & les autres ſubſtances qui ſe ſont unies à la forme de chaque eſpèce. La

Les élemens, premiers principes materiels.

Les matrices, principes des differences.

CHAP. XIV.

matiere du premier principe univerſel qui s'eſt jointe aux élemens, & aux autres ſubſtances néceſſaires à la compoſition des corps animés, ſoit végétaux, ou animaux, étant ainſi fixée, & ſpécifiée dans chaque ſujet, a perdu ſon univerſalité par la vertu de chaque principe particulier qui la détermine en ſon eſpèce : en ſorte que pour s'unir à la ſubſtance de l'homme, & lui ſervir de nouriture, afin de conſtituer ſon eſſence, & ſa nature propre, il eſt néceſſaire auparavant que l'univerſalité lui ſoit rendue dans une digeſtion convenable, par un principe particulier de la nature de l'homme même, lequel aïant toute ſon univerſalité, la communique à ſon ſemblable ſpécifié dans chaque choſe; ranime dans ces choſes les eſprits vitaux de ſa nature qui y ſont fixés, engourdis, & ſans action; les dégage, & ſe les unit, pour faire changer la matiere d'une nature vile en une plus parfaite, & rendre aux élemens leur ſimplicité premiere.

Union de la matiere avec la ſubſtance de l'homme.

Les fermens des glandes en ſont les moyens.

Mais comme le principe d'une production ne va point à ſa fin, ſans paſſer par un milieu, il eſt néceſſaire que ce milieu, ou moyen, ait en lui des qualités qui ſimpatiſent en quelque ſorte avec les extremités, c'eſt à dire avec le principe & la fin. Or les fermens formés par les

*glan-*

CHAP. XIV.

*glandes* ſont les moyens, qui rendent aux diverſes ſubſtances des alimens l'univerſalité requiſe, & cela par le premier dégré de digeſtion dans l'eſtomac, afin de former une ſubſtance qui ſoit propre à l'homme, & qui ait une diſpoſition prochaine à s'unir avec la bile, & les autres fermens néceſſaires pour la compoſition du chyle dans les inteſtins, par un ſecond dégré de digeſtion.

## CHAPITRE XV.

*De l'uſage du ſang des arteres dans les glandes, pour la production de la bile, & des autres fermens qui contribuent à former le chyle, par un deuxieme dégré de digeſtion dans les inteſtins.*

Deſcription de la rate.

JE commence ce Chapitre par la *rate*, qui eſt un viſcere d'un rouge obſcur, de figure oblongue, couvert d'une membrane vaſculeuſe, & fibreuſe. Elle eſt compoſée d'une infinité de membranes qui forment de petites cellules de differentes figures, & groſſeurs, leſquelles ſe communiquent l'une à l'autre, & qui ſont toujours remplies d'un ſang noirâtre. La *rate* reçoit de la cœliaque une artere qu'on nomme ſplenique. Les extremités capillaires de cette artere s'anaſtomoſent en beaucoup d'endroits par deſſus les cellules, dans leſquelles elles portent le plus ſubtil de leur ſang animé du principe de vie, & où il ſe digere & forme un ferment qui eſt porté dans le foye par le rameau ſplenique,

nique, afin de rendre le mouvement du ſang dans ce viſcere pour le moins auſſi lent qu'il puiſſe être, & pour faire qu'il s'en ſépare une ſuffiſante quantité de bile. Les vaiſſeaux lymphatiques de la *rate*, qui ſont en petit nombre, vont ſe décharger dans les glandes lombaires, ou dans le reſervoir du chyle. Ils y portent un ferment néceſſaire à l'uſage de ces glandes, & au chyle pour ſa derniere perfection. CHAP. XV.

Le *foye* eſt deſtiné à la production de la bile qui contribue à former le chyle. Ce viſcere eſt compoſé de lobes glanduleux, qui ſont arrangés tout du long à côté de chaque branche des vaiſſeaux du *foye*. Ils ſont couverts chacun d'une membrane propre, attachée l'une à l'autre par d'autres membranes qui laiſſent de petits eſpaces dans leurs interſtices. Chaque lobe reçoit de petits rameaux d'arteres, qui viennent des branches de la cœliaque, de la meſenterique ſuperieure, & des diaphragmatiques. Le ſang animé des arteres ſe digere dans ces petits lobes, par la vertu du ferment de leurs petites glandes, & ſe tranſmue en une ſubſtance qui ſe va rendre par des conduits excrétoires dans la veſicule du fiel, ou dans le pore biliaire. Les arteres, & le rameau ſple- Le foye.

CHAP. XV.

ſplenique qui vient de la rate, fourniſſent la matiere pour la ſécrétion de la bile ; & la veine cave reçoit de la veine porte le ſang ſuperflu des arteres.

Néceſſité de la contraction des vaiſſeaux biliaires.

Or il eſt néceſſaire que ces lobes, qui ſont le principe de tous les *vaiſſeaux biliaires*, & qui ſont diſpoſés par pelotons, & couverts chacun d'une membrane compoſée de fibres muſculaires & élaſtiques, ſe dilatent, & ſe contractent, afin d'augmenter le mouvement du ſang dans les vaiſſeaux du *foye*, où il ſe ralentiroit ſans cela, à cauſe de leur reſiſtance, & du peu de force qui le pouſſe. Cette contraction des lobes, & des *vaiſſeaux biliaires*, qui donnent le mouvement au ſang, fait en même tems avancer la bile. La cauſe, qui excite ce mouvement ne peut venir que du dégré de digeſtion, que la matiere acquiert dans chaque lobe, ou veſicule, laquelle irritant leurs membranes, lorſqu'elles ſe trouvent dilatées, fait qu'elles ſe contractent ; & cette contraction eſt la cauſe de celle des *vaiſſeaux biliaires*.

Vaiſſeaux lymphatiques du foye.

Le *foye* a des *vaiſſeaux lymphatiques*, dont la plupart s'ouvrent dans des glandes, ſituées auprès de la veine porte dans la ſuperficie concave du *foye*, où la lymphe ſe digere. De là elle eſt portée par

par d'autres *vaiſſeaux lymphatiques* dans le reſervoir du chyle, pour y ſervir de ferment. Nous allons parler maintenant des vaiſſeaux excrétoires du *foye* qui ſont la veſicule du fiel, & le pore biliaire. CHAP. XV.

La *veſicule du fiel*, qui eſt ſituée dans la partie concave du foye, eſt compoſée de quatre *membranes*. La plus externe lui eſt commune avec le foye. La ſeconde eſt compoſée d'un merveilleux tiſſu de vaiſſeaux. La troiſieme eſt épaiſſe, & ſolide, compoſée de fibres tranſverſes, d'obliques & de droites. La quatrieme eſt nerveuſe & pleine de rides. Il eſt manifeſte par ces rides, & ces *membranes*, que la *veſicule du fiel* ſe dilate, & ſe contracte, pour contenir plus ou moins de bile. Membranes de la veſicule du fiel.

Ce peut bien être la contraction extraordinaire de ce viſcere qui eſt la cauſe accidentelle qui règle l'accès, & les periodes des fièvres tierces-quartes, & autres qu'on apelle fièvres réglées, dont on n'a pu encore juſqu'à preſent rendre de raiſon vraiſemblable, ni donner aucune notion certaine: ce que je ferai néanmoins d'une maniere ſimple & ſolide à n'en pouvoir douter, ſur le fondement des principes que j'ai établis, & que je déve- Effets de ſa contraction.

CHAP. XV.

développerai dans le Chapitre qui ſuivra celui-ci. Il eſt à propos maintenant d'expliquer la contraction réglée de la *veſicule*, qui fournit la bile, pendant que le corps de l'homme jouit d'une parfaite ſanté.

Explication de cette contraction, & uſage de la bile du foye.

La *veſicule du fiel*, conſiderée comme une *matrice* qui a ſes productions, ſe dilate par la pulſation de la *bile* qui lui vient du foye & de ſes propres glandes, & dont elle ſe remplit. Cette *bile* ſe digere pendant quelque tems; & auſſi-tôt qu'elle a acquis par la digeſtion le dégré de perfection requis, la *veſicule* ſe contracte, & pouſſe vers le *duodenum* une partie de la *bile* qui la remplit. Celle qui y reſte ſert de levain, ou de ferment à celle qui y entre de nouveau, laquelle ſe digere à ſon tour, & dilate encore la *veſicule*, pour l'obliger à ſe contracter comme auparavant. Ce flux continuel de la *bile* du foye dans la *veſicule du fiel*, les digeſtions qui le ſuivent, & cette alternative de dilatations & de contractions réglées, font fluer ſans ceſſe la bile dans l'inteſtin, d'un mouvement ſemblable au ſang qui coule dans les arteres. Cette égalité de mouvement, ſoutenu d'un bon régime, entretient le corps dans une pleine ſanté, & toutes ſes parties en bon état.

Il

CHAP. XV.

Il y a dans la *veſicule du fiel* un grand nombre de petites *glandes*, où ſe terminent les arteres ciſtiques. La *bile* de la *veſicule du fiel* vient des conduits hépatiques & cholidoques, & entre par le conduit ciſtique. Il y en a auſſi une partie qui vient de la *veſicule* même, ou de ſes petites *glandes* : celle-ci ſert de ferment, ou de levain, à celle qui vient de dehors.

Glandes & bile de la veſicule du fiel.

La *veſicule du fiel* n'eſt pas ſeulement un reſervoir deſtiné à recevoir la *bile* qui lui vient de quelque partie du foye, mais elle eſt encore, comme nous l'avons déja dit, une *matrice* qui a ſes productions particulieres, & ſes effets, parceque la *bile*, qui y entre, acquiert une nouvelle vertu, qu'elle n'auroit pas reçue dans le foye: car après qu'elle a été digerée, & animée d'un nouveau ferment qui vient des glandes propres de la *veſicule*, dans leſquelles les arteres ciſtiques ont dépoſé le plus pur de leur ſang, animé du principe de vie, cette *bile* devient épaiſſe, fort jaune, très amere, & bien differente de celle qui vient du pore biliaire, ou conduit hépatique, laquelle eſt inſipide, & ſans couleur, quoiqu'elle ait une même origine. Cette difference vient de ce que celle de la *veſicule du fiel* a un dégré de

Ses effets à l'égard de la bile.

CHAP. XV.

de plus de digeſtion, & une augmentation de vertu, & de force, qu'elle a reçue du ferment des glandes de la *veſicule*, & que l'autre n'a pas.

Ses vaiſſeaux lymphatiques.

La *veſicule du fiel* reçoit le principe de vie des arteres de la cœliaque droite. Le ſang ſuperflu eſt reporté dans la veine porte par deux branches qu'on apelle ciſtiques jumelles. Elle a auſſi des *vaiſſeaux lymphatiques*, dont l'uſage eſt de temperer, humecter, & rafraichir ſes membranes, afin de faciliter leurs fonctions, lorſque la *veſicule* ſe dilate, ou ſe contracte, pour pouſſer la bile dans le *duodenum*.

Branches du pore biliaire.

Le *pore biliaire*, dont j'ai déja fait mention, eſt une autre eſpèce de vaiſſeau excrétoire du foye. Il a autant de *branches* que la veine porte. Elles l'accompagnent dans tous les lobes, & les glandes du foye; & partout où il y a une *branche* de l'une, il y en a une de l'autre. Ces *branches*, ou conduits biliaires, s'uniſſent & forment un tronc de la groſſeur d'une plume, qui ſe joint à l'extremité du conduit ciſtique. Ces deux conduits unis enſemble forment le conduit cholidoque commun, qui deſcend obliquement vers le *duodenum*, où il s'ouvre à quatre ou cinq travers de doigt du pilore.

pilore. Après qu'il a percé la premiere membrane, il ſe gliſſe de la longueur de deux pouces entre les membranes de l'inteſtin, avant que d'entrer dans ſa cavité. Cette inſertion oblique lui ſert de valvule, pour empécher le retour de la bile dans le conduit cholidoque, lorſqu'elle eſt une fois entrée dans l'inteſtin. CHAP. XV.

La *bile* du *pore biliaire*, qui tire ſon origine des glandes du foye, où elle s'eſt formée par la vertu du principe de vie qui vient des arteres, & du principe des formes, eſt inſipide, ſubtile, & ſans couleur. J'ai lieu de croire qu'elle eſt la partie mercuriale du ſang, laquelle étant mêlée avec la ſulphureuſe qui vient de la veſicule du fiel, s'unit avec le ſel fixe, & les autres principes ſimples des alimens, dans l'état de l'univerſalité où ils ſe trouvent, & qu'ils ont acquis dans l'eſtomac. Ils forment enſemble un tout phyſique, qui eſt le chyle, compoſé des quatre élemens & des trois principes, lequel étant dégagé de ſes excrémens par un ſecond dégré de digeſtion, qui forme l'union intime de ſes trois principes dans le *duodenum*, eſt porté enſuite dans les glandes du meſentere, & dans ſon re- Sa bile.

CHAP. XV.

ſervoir, par les veines lactées, pour s'y perfectionner par un troiſieme & quatrieme dégré de digeſtion, que nous expliquerons en ſon lieu.

Le pancréas.

Le *pancréas* eſt une grande glande conglomerée, de couleur de chair, ſituée entre le fond de l'eſtomac & les vertèbres des lombes. Il eſt fortement attaché au peritoine, au *duodenum*, au meſentere & à la rate. Il a environ ſix doigts de longueur, deux de largeur, & un d'épaiſſeur. Sa ſubſtance eſt un peu molle, & ſouple, ſi on le conſidere dans l'état où on le peut voir; mais peut-être eſt-elle ferme & plus ſolide, lorſqu'il eſt vivant. Chaque petite glande, dont il eſt compoſé, a ſon vaiſſeau excrétoire. Ces vaiſſeaux s'uniſſent tous enſemble, & forment un conduit commun, de la groſſeur d'une plume, qui eſt clair, tranſparent & ſemblable à un vaiſſeau lymphatique.

Le ſuc pancréatique.

Ce conduit paſſe au milieu du *pancréas*, & s'ouvre dans la cavité du *duodenum*, à trois ou quatre pouces du pilore, où il dépoſe le *ſuc pancréatique* qui s'eſt formé dans ſes petites glandes, du principe de vie, & du ſang des rameaux d'arteres de la cœliaque. Ce ſuc, joint à la liqueur qui vient des glan-

glandes des inteſtins, contribue beaucoup à la digeſtion du chyle dans le *duodenum*, le delaye, & lui ſert de véhicule, afin qu'il entre plus aiſément dans les veines lactées, après qu'il eſt ſéparé des excrémens par le deuxieme dégré de digeſtion, qu'il acquiert dans le *duodenum*, & dans les inteſtins qui ſuivent. CHAP. XV.

## CHAPITRE XVI.

*De la cauſe, & de l'effet de la contraction extraordinaire & contre nature de la veſicule du fiel, dans les fièvres réglées qui ont leur principe dans l'eſtomac.*

Principe des fièvres réglées.

PResque toutes les *fièvres réglées* ont leur principe dans l'eſtomac, lequel peut provenir de pluſieurs cauſes, comme de la mauvaiſe qualité des alimens, de l'intemperie de l'air, d'un mauvais régime, ou des excès de travail, & de l'intemperance. Ces cauſes, de quelle nature qu'elles puiſſent être, derangent l'œconomie de l'eſtomac, corrompent les fermens des glandes, & forment un mauvais levain qui gâte, & maleficie la plus pure ſubſtance des alimens dans la digeſtion: ce qui produit un mauvais chyle.

Origine des accidens qui en précèdent le premier accès.

Le ſang, qui reçoit ce mauvais chyle, porte dans les glandes, & dans toutes les parties, le vice de la maladie. Le ferment des glandes du foye, formé de ce mauvais principe, ne produit dans la veſicule

ſicule du fiel qu'une bile impure, & imparfaite, qui exige de plus longues digeſtions qu'à l'ordinaire, pour obliger la veſicule à ſe contracter. Et comme ces longueurs de tems augmentent à meſure, & qu'elles ſont cauſe qu'il entre, à proportion, dans la compoſition du chyle, une plus grande quantité de la bile froide & flegmatique du pore biliaire, que de celle de la veſicule du fiel qui eſt chaude, & qui après avoir été retardée par la longueur de ſa digeſtion, & enſuite pouſſée trop abondament dans le *duodenum*, reflue même juſque dans l'eſtomac; ce flux exceſſif, irrégulier & alternatif de ces deux ſortes de bile, cauſe les légeres indiſpoſitions que l'on reſſent, & qui précèdent ordinairement le premier accès des *fievres réglées*, comme maux de tête, de reins, laſſitude, & friſſonnement.

La contraction extraordinaire de la veſicule du fiel, cauſe du premier accès.

Le premier accès vient de ce que la *veſicule du fiel* ſe contracte enfin aſſez fort, pour pouſſer dans le *duodenum* la plus grande partie de la bile qu'elle contient. L'excès, & la trop grande abondance de cette bile, fait qu'elle eſt obligée de deſcendre du *duodenum* dans le *jejunum*, & de refluer en même tems dans l'eſtomac. Celle qui reſte dans

CHAP. XVI.

le *duodenum* eſt bientôt conſommée ; & comme il n'y en vient point de la *veſicule*, parceque s'étant preſque vuidée, celle qui lui vient du foye eſt bien du tems à la remplir, il n'entre pendant ce tems-là dans la compoſition du chyle que la bile froide du pore biliaire, laquelle porte dans le ſang ſa qualité froide, qui cauſe un friſſon univerſel, & qui eſt le commencement du premier accès. Le ſang refroidi, qui eſt porté partout pendant la durée du friſſon, & ſurtout dans les glandes du foye où eſt le principe de la bile, y influe le vice qu'il a contracté ; & la bile, qui entre dans la *veſicule*, pour y être digerée, aïant encore une qualité plus vicieuſe que celle qui y venoit auparavant, s'aigrit, & irrite dans la digeſtion toute celle qui eſt déja dans la *veſicule*. Cette bile, dont elle ſe trouve remplie, fait impreſſion ſur ſes fibres qui l'obligent à ſe contracter encore plus fort qu'auparavant, & à pouſſer dans le *duodenum*, dans le *jejunum*, & dans l'eſtomac, la bile viciée, qui fermente auſſitôt extraordinairement dans ſes parties, & cauſe la grande chaleur qui ſuit le friſſon, laquelle ne ceſſe point que la plus grande partie n'ait été

été dissipée par la transpiration & les dernieres voyes : après quoi le malade jouit de quelque repos, jusqu'à ce qu'il revienne un nouvel accès, qui doit être, suivant toutes les aparences, plus fort que le premier ; comme il est facile de le concevoir par les raisons que je vais raporter, & qui feront sentir l'évidence de ma proposition. CHAP. XVI.

Je dis donc que la bile qui a resté, après la contraction de la *vesicule*, dans le *duodenum*, est employée pendant l'intervale d'un accès à l'autre, que je supose pour les fièvres tierces de 48. heures, à former le chyle à l'ordinaire, conjointement avec celle du pore biliaire. Pendant ce tems-là la *vesicule* se remplit ; mais comme celle qui étoit restée dans le *duodenum* se trouve consommée, avant qu'elle soit pleine, il ne doit plus entrer dans la composition du chyle que la bile froide, qui vient du pore biliaire, & qui va ensuite se mêler avec le sang, pour commencer le frisson. Et comme la bile du foye est plus longtems à remplir la *vesicule*, & à s'y digerer que la premiere fois, le frisson doit durer par conséquent plus longtems, & être plus violent, parceque la bile froide du pore Pourquoi second accès est plus fort que le premier.

CHAP. XVI.

biliaire eſt plus longtems à fluer dans le ſang. La *veſicule du fiel* venant enſuite à ſe contracter avec plus de force qu'auparavant, pouſſe encore plus de bile que la premiere fois dans le *duodenum :* ce qui produit une chaleur plus grande & plus longue, & un plus grand épuiſement que dans l'accès qui a précédé. Toutes les autres eſpèces de *fièvres réglées*, qui ont leur principe dans l'eſtomac, & dans les humeurs, peuvent s'expliquer de la même maniere.

Accidens des autres accès.

Si le mauvais principe, qui eſt dans l'eſtomac du malade, s'entretient en même état, les accès qui ſuivront ſeront à peu près les mêmes ; mais s'il devient encore plus mauvais, les accès augmenteront à proportion. Il eſt facile ſur ce que je viens de dire, de trouver les cauſes des maux de tête, & de reins, des foibleſſes, & des dégoûts, qu'on reſſent pendant la durée de ces ſortes de *fièvres*, dont on peut cependant ſe delivrer en peu de tems, & avec peu de dépenſe, en prenant un vomitif, tel que je vais l'enſeigner pour le ſoulagement & la gueriſon des malades, & ſurtout des pauvres que j'ai principalement en vue, & que la maladie conſume & empêche de travailler.

Je

CHAP. XVI.

Je veux néanmoins auparavant faire obſerver une faute que font la plupart des Médecins, & ſurtout les Chirurgiens de la campagne, que leur ignorance, jointe à leur interêt particulier, porte à faire ſaigner les perſonnes qui ſont attaquées de ces ſortes de *fièvres*, pour avoir occaſion de leur faire plus de remèdes, en conſumant d'un côté leur corps, pendant que de l'autre ils épuiſent leur bourſe. Cette faute conſiſte en ce qu'ils font mal à propos précéder la purgation par la ſaignée. J'ai déja fait remarquer à la fin du Chapitre XI. que la ſaignée, après un nouvel accès, étoit très préjudiciable, parce-qu'elle attiroit, & perpétuoit dans le ſang la cauſe de la maladie qui avoit ſon principe dans l'eſtomac; au lieu qu'en otant cette cauſe par un vomitif convenable, l'effet ceſſoit auſſi tôt. Je le répète encore ici, & j'ajoûte que la ſaignée n'eſt pas même abſolument néceſſaire; car l'eſtomac étant delivré par le vomitif des mauvais levains qui corrompoient les alimens, & qui occaſionoient les dégoûts, & la *fièvre*, les digeſtions, qui ſe font enſuite, forment un bon chyle, & ce chyle rétablit la maſſe du ſang, qui de lui-même ſe débaraſſe, &

Faute des Médecins & des Chirurgiens à l'égard des fièvres réglées.

Le vomitif plus néceſſaire en ce cas que la ſaignée.

CHAP. XVI.

se purifie de ce qui lui est nuisible, par la voye des veines, des crachats, & de la sueur.

Remède efficace & à peu de frais.

Le remède, que je propose ici, est très facile à faire, & de peu de dépense, puisqu'avec cinq ou six sols de matiere, on en peut faire plus de trois cents médecines: ce qui seroit très utile pour les gens de la campagne, & donneroit aux personnes de condition une belle occasion d'exercer leur charité dans leurs terres, où il y a quelquefois tant de pauvres malheureux attaqués de ces sortes de *fièvres*, & qui ne peuvent travailler dans le tems de l'ouvrage. Nous avons vu plus de deux cents experiences de ce remède, qui n'ont jamais manqué d'avoir un heureux succès. Il vient du même principe que l'émétique, & est pourtant moins violent, quoiqu'il fasse plus d'effet. On ne ressent jamais de maux d'estomac, après l'avoir pris, parceque c'est une liqueur qui fait une impression égale sur tout ce qu'elle touche, bien differente en cela de l'émetique qui est une poudre assez grosse, laquelle s'attachant aux membranes de l'estomac, les incise, & fait faire de très grands efforts qui ne font pas toujours effet, & qui fatiguent tellement l'estomac, que bien des

per-

personnes en ſont longtems incommodées: ce qui n'arrive point en uſant du remède que je propoſe ici.

Recette pour ce remède.

℞. *Mettez dans une bouteille, qui tienne une pinte de* Paris, *une once du plus beau verre d'antimoine que vous pourez trouver, & qui ſoit bien tranſparent. Rempliſſez la de très bon & fort vin blanc, ou de vin de* Champagne. *Placez cette bouteille un peu bouchée ſur le four d'un boulanger qui cuiſe ſouvent, & l'y laiſſez digerer pendant douze jours, & autant de nuits, à chaleur lente, & égale: après lequel tems vous filtrerez votre vin émétique par un entonnoir garni d'un double papier gris, dans une autre bouteille, & vous garderez votre verre d'antimoine qui vous ſervira de même encore pluſieurs fois.*

Doſe, & maniere de s'en ſervir.

La doſe de ce vin émétique eſt une cuillerée & demie dans un moyen verre, qu'on achève de remplir d'eau commune. Après l'avoir avalée à jeun, il ne faut rien prendre juſqu'à ce que le remède ait fait vomir: après quoi il faut prendre un demi gobelet de bouillon gras, & léger, & continuer de même à chaque fois que l'on vomira. Lorſqu'il ſe ſera paſſé une heure ſans envie de vomir, il faudra prendre un grand bouillon, afin de faciliter l'évacuation par en bas.

Ce

CHAP. XVI.

Bons effets de ce remède dans d'autres maladies.

Ce vomitif si facile à prendre, qui emporte la *fièvre* d'une seule prise, & qui rend l'apétit & la santé au malade, est excellent pour toutes les maladies qui ont leur principe dans l'estomac, d'où procède la corruption du sang & des humeurs. Il est trés efficace dans les attaques d'apoplexie, en prenant la dose un peu plus forte, & fait de bons effets pour l'hydropisie, la jauniſſe, la petite verole, & autres maladies de cette nature, parcequ'il ôte la cause de ces maladies.

## CHAPITRE XVII.

*Des veines lactées, & de l'uſage du ſang des arteres & des glandes, pour la perfection du chyle, par le troiſieme & quatrieme dégré de digeſtion.*

LE mouvement du diaphragme & des muſcles de l'abdomen, qui compriment les parties groſſieres des alimens dans les inteſtins, pour les faire deſcendre vers l'anus, pouſſe le chyle par la même force dans les *veines lactées*. Les embouchures de ces *veines lactées*, qui s'ouvrent dans la cavité des inteſtins, d'où elles reçoivent le chyle, ſont ſi petites qu'on ne ſauroit les apercevoir avec le meilleur microſcope. Il étoit néceſſaire qu'elles fuſſent plus petites que les plus fines arteres de notre corps, afin qu'il n'y entrat rien qui fût capable d'arréter la circulation du ſang. Les mêmes extremités des *veines lactées* ont auſſi communication avec les petites glandes, qui ſont aux extremités des arteres capillaires des inteſtins, dont elles reçoivent une liqueur lym-

Deſcription des veines lactées.

CHAP. XVII.

lymphatique animée du principe de vie, qui anime le chyle, le delaye, & lave les *veines lactées*, afin que le chyle n'y cauſe aucun embaras, ni aucune obſtruction.

Leur uſage.

L'autre extremité des *veines lactées* décharge le chyle, par des conduits formés de l'union d'une infinité de conduits capillaires, qui naiſſent des inteſtins grêles, dans des cellules glanduleules, ou glandes conglobées, qui ſont diſperſées au deſſus & au deſſous du meſentere, & qui ſont autant de *matrices* deſtinées à perfectioner le chyle, & où il ſe digere par un troiſieme dégré de digeſtion, avec le ferment de leurs petites glandes, animé du principe de vie qui vient des extremités capillaires de l'artere meſenterique, dont le ſuperflu eſt raporté dans le foye par les rameaux des veines mezaraïques, qui ſe déchargent dans la porte.

Lactées ſecondes.

De ces cellules & glandes conglobées, où ſe digere le chyle, il naît d'autres *veines lactées*, qui le portent immédiatement dans ſon reſervoir commun: on les nomme *lactées ſecondes*. Elles ſont plus groſſes que les premieres.

Source de l'humeur ac-

Les *veines lactées* ont des valvules de diſtance en diſtance, qui empêchent le retour du chyle dans les inteſtins. Par con-

conſéquent l'*humeur acqueuſe* que l'on évacue par les purgatifs, laquelle eſt plus ou moins abondante, à proportion de leur activité irritante, ou de l'excès de l'humeur, & de la ſeroſité, ne peut venir des veines lactées dont les pores ſont fort petits, mais ſeulement des lymphatiques qui communiquent aux veines; & cela par l'irritation que cauſe le purgatif à leurs extremités, qui aboutiſſent dans les inteſtins. La lymphe ſuperflue peut bien néanmoins paſſer en partie à travers les tuniques des veines lactées, à cauſe de ſa ſubtilité, & non les globules du chyle, quoiqu'ils ſoient très petits. Mais cette lymphe eſt peu conſiderable, en comparaiſon de celle qui vient dans les inteſtins par les vaiſſeaux lymphatiques, leſquels s'y déchargent pendant l'effet du purgatif.

queuſe que l'on rend.

Le *reſervoir du chyle* reçoit toutes les veines lactées du ſecond ordre, & tous les vaiſſeaux lymphatiques des lombes, de l'abdomen, & de preſque toutes les parties de notre corps: de ſorte qu'il ne paroît être autre choſe qu'un réceptacle formé par l'union de tous ces vaiſſeaux. Il eſt capable de contenir une once d'eau. Son fond eſt tellement étroit, qu'il n'eſt pas plus grand qu'un vaiſſeau lymphatique.

Le reſervoir du chyle.

CHAP. XVII.

tique. Son milieu eſt quelquefois partagé en deux ou trois cavités, & ſa partie ſuperieure s'allonge, & forme un conduit de la groſſeur d'une plume d'oye, qu'on apelle *canal thorachique*. C'eſt dans ce reſervoir que le chyle reçoit ſa perfection par un quatrieme dégré de digeſtion, d'où il entre dans le *canal thorachique*. Ce conduit monte dans la poitrine par derriere l'aorte. Quand il eſt auprès du cœur, il ſe partage en deux ou trois branches, qui immédiatement après ſe réuniſſent en une, laquelle monte le long de l'œſophage, & va ſe rendre ſous la jugulaire, dans la veine ſouclaniere gauche, par un ou deux orifices couverts d'une valvule demi-lunaire, afin que le ſang ne trouble point le cours du chyle qui va ſe mêler avec lui dans les veines.

Canal thorachique.

Ses valvules.

Le *canal thorachique* a des *valvules* de diſtance en diſtance, qui non ſeulement empêchent le retour du chyle, mais qui le tiennent ſerré entre leurs intervales, afin que la pulſation de l'aorte, qui agit ſur le canal, preſſe le chyle en le comprimant. Il eſt néceſſaire que cela ſoit ainſi; car ſi les *valvules* étoient trop éloignées, ce canal ſe dilateroit trop, s'affoibliroit, & ne pouroit ſoutenir la puiſ-

puiſſance qui agit ſur lui. Le *conduit thorachique* reçoit, en allant à la veine ſouclaviere, des vaiſſeaux lymphatiques, qui communiquent & s'inſerent dans pluſieurs parties de la poitrine, où le ſuperflu de la lymphe, qui étoit mêlé avec le chyle, ſe décharge. CHAP. XVII.

Ce canal, en paſſant par le côté gauche, ſe trouve expoſé au battement de l'artere aorte: ce qui augmente, comme nous l'avons déja dit, le mouvement du chyle, au lieu qui s'il avoit été au côté droit, il n'auroit été comprimé que par le diaphragme, & par les muſcles de l'abdomen, leſquels n'auroient agi que ſur le reſervoir, qui ſe trouve également preſſé par leur action dans la ſituation où il eſt. Remarque ſur ſa ſituation.

Le *chyle*, qui eſt une production des alimens, & des divers fermens des glandes qui ont contribué à le former, & à le perfectioner par les quatre dégrés de digeſtion où il a paſſé, eſt deſtiné à remplacer, & à réparer la maſſe du ſang qui a ſouffert quelque déchet, ou quelque alteration dans ſa circulation, ſoit par le travail du corps, & la diſſipation qui ſe fait à tout moment de la chaleur naturelle, & de l'humide radi- Uſage du chyle.

CHAP. XVII.

cal, ſoit parcequ'il a été employé aux divers fermens des glandes qui ont contribué à former le *chyle*, & à le perfectionner, pour ſervir d'aliment au ſang, afin que le corps en ſoit vivifié, nouri, & ſubſtanté à chaque inſtant de la vie.

Dégrés par leſquels il parvient à ſa perfection.

La premiere digeſtion des alimens dans l'eſtomac prépare la matiere & le ſujet cahotique. La ſeconde digeſtion dans les inteſtins dégage la ſubſtance des excrémens, ſépare le pur de l'impur, & produit le *chyle* déja ébauché, orné d'une couleur blanche, comme une lumiere qui eſt ſortie des tenèbres. La troiſieme digeſtion dans les glandes du meſentere le forme en petits globules blancs, qui ont chacun dans leur centre une particule du principe de vie. La quatrieme digeſtion, que le *chyle* reçoit dans ſon reſervoir commun, achève ſa perfection, & le diſpoſe, en entrant dans la veine ſouclaviere gauche, à ſe revétir de la couleur rouge que les globules du ſang lui communiquent, & dont il ſe trouve parfaitement orné dans le ventricule droit du cœur. C'eſt dans ce ventricule que le *chyle* prend la nature de ſang, & qu'il n'eſt plus qu'une même

me

me choſe avec lui. Suivons-le maintenant dans la route qu'il tient. Après avoir fait la deſcription des arteres, il me reſte à faire celle des veines, en les prenant dans leur ſource, ou dans leur origine. CHAP. XVII.

## CHAPITRE XVIII.

### *Des veines en general.*

De la nature des veines.

LEs *veines* ne ſont autre choſe qu'une continuation des arteres capillaires, qui ſe recourbent, & qui uniſſent leurs conduits, à meſure qu'elles aprochent du cœur, juſqu'à ce qu'elles ne faſſent plus que trois groſſes *veines*, qui ſont la *veine cave deſcendante*, pour raporter le ſang de toutes les parties qui ſont au deſſus du cœur; la *veine cave aſcendante*, pour raporter le ſang de toutes les parties qui ſont au deſſous du cœur, & la *veine porte* qui porte le ſang au foye.

Trois veines principales.

Les *tuniques* des *veines* ſont la même choſe que celles des arteres. Il n'y a que la *tunique* muſculaire qui eſt dans toutes les *veines* auſſi mince que dans les arteres capillaires. La force avec laquelle le ſang pouſſe les parois des *veines* eſt auſſi moins grande que celle avec laquelle il pouſſe celles des arteres.

Tuniques des veines.

Les *veines* n'ont pas de pulſation, parceque le ſang y eſt pouſſé avec une force

ce continue, & ſans intermiſſion, & qu'il va d'un canal étroit dans un plus large. CHAP. XVIII.

Toutes les *veines*, qui ſont perpendiculaires à l'horiſon, à l'exception de celles de la matrice, & de la *veine* porte, ont des *valvules*. On n'en trouve quelquefois qu'une ſeule; quelquefois deux, ou trois enſemble, qui reſſemblent chacune à la moitié d'un dez à coudre. Elles s'attachent aux parois des vaiſſeaux; leurs cavités ſont tournées vers le cœur. Dans le tems que le ſang ſe meut vers le cœur, elles ſe couchent contre les parois des *veines*; mais s'il arrive que le ſang revienne ſur ſes pas, il doit remplir les *valvules* qui étant tendues bouchent le canal. Leurs valvules.

Le *tronc de la veine cave*, qui décharge le ſang dans le ventricule droit du cœur, eſt formé de l'aſſemblage de deux gros vaiſſeaux : le premier eſt la *veine cave* deſcendante; le ſecond eſt la *veine cave* aſcendante, leſquelles s'ouvrent enſemble dans l'oreillette droite du cœur. Il y a une éminence où les troncs ſe joignent, & qui empêche que le ſang, qui deſcend d'enhaut, ne tombe ſur celui qui vient d'enbas. Ces deux vaiſſeaux ſont formés de l'aſſemblage de pluſieurs groſſes *veines*, dont les plus conſiderables ſe dé- Le tronc de la veine cave.

CHAP. XVIII.

chargent dans la *veine cave* deſcendante, ou ſuperieure, & que je vais décrire.

Veines qui forment la veine cave deſcendante.

Les premiers ſont la *veine* coronaire du cœur, la *veine* azygos, & les *veines* ſouclavieres, & jugulaires. Toutes ces *veines* ſont produites de pluſieurs branches formées de l'aſſemblage de quantité de rameaux, & ces rameaux d'une infinité de vaiſſeaux capillaires qui ont leurs extremités vers celles des arteres, avec leſquelles ils s'anaſtomoſent, pour raporter dans le cœur le ſang par la *veine cave deſcendante*.

La veine coronaire du cœur.

La *veine coronaire* du cœur reçoit le ſang des extremités de l'artere coronaire.

La veine azygos.

La *veine azygos* reçoit le ſang des *veines* intercoſtales de chaque côté, & les œſophagiennes, de l'œſophage.

Les veines ſouclavieres & jugulaires.

Les deux *ſouclavieres* reçoivent pluſieurs *veines*. La premiere eſt la *jugulaire externe*, qui tire ſon origine des parties internes & externes des oreilles, des muſcles de la bouche, de la face, du front, des temples, & du derriere de la tête. La ſeconde ſe nomme la *jugulaire interne*, venant des deux branches qui reçoivent le ſang des ſinus de la dure-mere, de la pie-mere, des parties de l'os hyoïde, & de la langue.

La

CHAP. XVIII.

Autres veines que les ſouclavieres reçoivent.

La troiſieme eſt la vertébrale, dont le ſang vient de la moelle de l'épine, du crâne, & du ſinus de la dure-mere. La *ſouclaviere* reçoit en quatrieme lieu les intercoſtales ſuperieures, dont le ſang vient des muſcles des premieres côtes. La cinquieme eſt la mammaire, dont le ſang vient des mamelles, & quelquefois de l'épigaſtrique. La ſixieme & la ſeptieme ſont les muſculaires ſuperieure & inferieure, qui vont quelquefois toutes deux ſe décharger dans les jugulaires : elles tirent leur origine des muſcles inferieurs du cou, & des muſcles ſuperieurs de la poitrine. Les *ſouclavieres* reçoivent auſſi le ſang des deux capſulaires, qui viennent des muſcles des omoplates, & des glandes des aiſſelles. Elles reçoivent encore le ſang des thorachiques externes, des céphaliques, & des baſiliques, qui viennent des muſcles des bras & des mains, & dont les extremités s'étendent juſqu'à celles des doigts, leſquelles naiſſent, comme partout ailleurs, des extremités capillaires des arteres.

Veines qui forment la veine cave aſcendante.

La partie *aſcendante*, ou inferieure du tronc de la *veine cave*, reçoit proche de ſon embouchure les *veines* du diaphragme. Après qu'elle l'a percé, elle reçoit pluſieurs groſſes *veines* du foye.

CHAP. XVIII.

Enſuite elle accompagne la grande artere, ou aorte, depuis le foye juſqu'à la quatrieme vertèbre des lombes, où elle ſe partage en deux groſſes *veines* nommé iliaques ; mais avant cette diviſion elle reçoit pluſieurs branches de chaque côté, qui ſont les ſuivantes:

Les émulgentes.

Les *émulgentes*, une de chaque côté, qui viennent des reins, où elles ſe partagent en pluſieurs autres rameaux.

Les ſpermatiques.

L'émulgente gauche reçoit la *ſpermatique*, les atrabilaires qui viennent des capſules atrabilaires, & quelquefois des émulgentes, & la dipeuſe venant des tuniques, & de la graiſſe, qui couvrent les reins. La *ſpermatique* droite va auſſi au tronc de la cave, de même que les lombaires, qui tirent leur origine des muſcles des lombes & du peritoine. La derniere, qui va au tronc de la cave, ſe nomme la ſacrée, qui vient de la moelle de l'*os ſacrum*.

Erreur des Anatomiſtes ſur l'origine de la ſemence.

Quelques Anatomiſtes ont remarqué qu'il y a un rameau des lombaires qui entre dans le canal des vertèbres, & qui a ſon origine au cerveau : ce qui leur a donné occaſion de croire, mais contre toute aparence de raiſon, que la *ſemence* deſcend du cerveau par cette voye.

Voi-

Voilà où l'ignorance conduit ceux qui n'examinent pas d'aſſez près la Nature, dans ſes principes, & dans ſes operations, & qui ne s'arrêtent qu'à ce qui tombe ſous les ſens. CHAP. XVIII.

La grande artere un peu au deſſous des émulgentes paſſe par deſſus la *veine* cave, & enſuite la *veine* cave ſe partage en deux branches nommées iliaques, à cauſe qu'elles paſſent par deſſus les os des îles, pour aller aux cuiſſes.

Les *veines iliaques* ſe diviſent chacune en deux branches, dont l'une ſe nomme l'interne, & l'autre l'externe. Les veines iliaques.

L'interne reçoit deux *veines* : la muſculeuſe moyenne qui tire ſon origine des muſcles de la cuiſſe ; & l'hypogaſtrique, formée des rameaux qui ſont diſtribués autour du ſphincter, de l'anus, & des hemorrhoïdes externes. Elle tire auſſi ſon origine des rameaux répandus ſur la veſſie, ſur la matrice, & le vagin. Veines que reçoit l'iliaque interne.

La branche externe de l'*iliaque* reçoit trois autres branches : deux avant que de ſortir du peritoine, & la troiſieme après qu'elle en eſt ſortie. La premiere eſt la *veine* épigaſtrique, dont les extremités montent aux muſcles droits juſqu'aux mammaires, avec leſquels elles s'uniſſent par anoſtomoſe. La ſeconde s'apelle la Et l'iliaque externe.

CHAP. XVIII.

*veine* honteuſe, qui tire ſon origine des parties de la generation. La muſculeuſe inferieure eſt la troiſieme qui va vers l'articulation du *femur*, & qui a ſa ſource aux muſcles de la cuiſſe. L'*iliaque externe*, après avoir reçu toutes ces *veines*, prend le nom de crurale, & reçoit enſuite ſix autres branches, dont les extremités des rameaux ſe diſtribuent dans tous les muſcles de la cuiſſe, & de la jambe, juſqu'aux extremités du pied, pour recevoir le ſang des arteres, par les vaiſſeaux capillaires qui leur ſont communs.

La veine porte.

Le tronc de la *veine porte*, qui a ſon inſertion dans le foye, y décharge le ſang qui vient des branches & des rameaux de l'eſtomac, de la rate, du pancréas, de l'*omentum*, & des inteſtins, d'où il rentre dans la *veine* cave aſcendante par pluſieurs vaiſſeaux, après que la bile en a été ſéparée.

Veines qu'elle reçoit.

La *veine porte* reçoit proche de ſon inſertion dans le foye, deux petites *veines* de la veſicule du fiel, apellées cyſtiques, & une de l'eſtomac nommée gaſtrique. Enſuite ſon tronc s'avance un peu du côté gauche, & ſe partage en deux branches, dont la plus petite ſe nomme le rameau ſplenique, qui vient de l'hypocondre droit.

Le ra-

Le *rameau ſplenique* ainſi nommé parcequ'il

CHAP. XVIII.

cequ'il raporte le ſang de la rate, reçoit deux branches nommées grande, & petite gaſtrique, leſquelles ſe diſtribuent par tout l'eſtomac. Le rameau de la grande eſt formé des *veines* coronaires qu'on trouve à l'orifice ſuperieur de l'eſtomac. Il reçoit trois autres branches: deux qui tirent leur origine de l'*omentum*, & du *colon*, & la troiſieme du pancréas. Enſuite le *rameau ſplenique* ſe diviſe en deux branches: l'une eſt la ſuperieure, & l'autre l'inferieure. La ſuperieure reçoit le *vas breve*, ou vaiſſeau court, & quelques autres branches qui viennent de la rate. L'inferieure reçoit deux branches, ſavoir l'épiploïque gauche qui tire ſon origine des parties poſterieures de l'*omentum*, & de la portion du *colon*, laquelle eſt ſous l'eſtomac. L'autre branche eſt la gaſtrépiploïque gauche, qui ſe forme des vaiſſeaux diſtribués ſur l'*omentum*, & ſur l'eſtomac, où ils ont leur ſource. C'eſt elle qui fait ſouvent la *veine* hemorrhoïdale interne. Le reſte de cette branche inferieure vient de la ſubſtance de la rate.

meau ſplenique & ſes branches.

Le rameau droit de la porte ſe nomme *meſenterique*. Avant que de ſe diviſer il reçoit la gaſtrépiploïque droite, qui ſe diſtribue à l'*omentum*, & à la partie inferieure de l'eſtomac; l'inteſtinale qui vient

Veines que reçoit la veine meſenterique.

CHAP. XVIII.

vient du *duodenum*, & du *jejunum*, & quelques branches qui viennent de l'*omentum* & du pancréas.

Ses branches.

Enſuite la *veine meſenterique* ſe diviſe en trois branches qui paſſent ſous la duplicature du meſentere. Il y en a deux venant du côté droit, & ſe partageant en quatorze branches, qui ſe diviſent de nouveau en une infinité d'autres plus petites qu'on nomme mezaraïques. Elles ſe diſtribuent dans le *jejunum*, l'*ileon*, le *cœcum*, & dans une partie du *colon*, où elles ont leurs ſources. La troiſieme ſe diſtribue au milieu du meſentere, à la partie du *colon* ſituée au côté gauche, & au *rectum* juſqu'à l'anus, où elles forment les *veines* hemorrhoïdales internes.

La veine porte, origine de la plupart des maladies.

Comme c'eſt la mauvaiſe conſtitution du ſang des rameaux de la *veine porte* qui cauſe la plupart des maladies du corps humain, par le vice que le ſang a contracté à ſon origine, & dans toutes les parties où la *veine porte* étend ſes rameaux, qui ſe trouvent affectés d'un mauvais principe, & que ce même ſang corrompt les fermens des glandes néceſſaires à la production du chyle, je pourois expliquer ici la cauſe de ces maladies, leurs ſuites, & la maniere de s'en delivrer en purifiant le ſang par des remèdes efficaces, & qui ne ſont pas communs,

ſi

CHAP. XVIII. Deſſein de l'Auteur de donner au Public un Traité des maladies.

ſi je n'avois pas formé le deſſein d'en parler ailleurs, dans un autre Traité particulier que je compoſerai ſur ce ſujet pour l'utilité publique, & où je m'étendrai ſur toutes les maladies du corps humain. C'eſt pourquoi je me diſpenſerai d'entrer ici dans ce détail, qui me meneroit trop loin, afin de ſuivre le plan que je me ſuis propoſé, en continuant l'explication des productions du corps humain, que j'ai commencée.

CHAPI.

## CHAPITRE XIX.

*De l'uſage du ſang des arteres dans les glandes, pour la production du lait, & pour la mucoſité des articulations.*

Remarques ſur quelques glandes employées au chyle.

DAns la deſcription que nous avons faite de l'uſage des *glandes* pour la production du chyle, nous en avons omis pluſieurs qui contribuent à la même fin. Il y en a d'autres qui ſont deſtinées à des uſages particuliers que nous croyons néceſſaires, quoiqu'ils ne nous ſoient pas connus, car la Nature n'a rien produit en vain, ni au hazard. Tout ce qu'elle a fait a été deſtiné à quelque uſage particulier, & pour une fin utile au corps de l'homme. Mais il n'eſt pas poſſible de demontrer, ni même d'expliquer toutes les manieres d'agir de la Nature dans ſes productions. L'eſprit humain eſt trop borné, pour connoître tout ce qui ſe paſſe dans l'œconomie du corps qui le contient, tant s'en faut qu'il pût connoître ce qui ſe paſſe au dehors dans toutes les productions de la

la Nature, leſquelles il eſſayeroit en vain d'expliquer.

Glandes inconnues.

Il y a par exemple des *glandes* qui ſemblent n'être deſtinées à aucun uſage, leurs conduits excrétoires n'étant pas ſenſibles. Cependant elles ont peut-être des conduits excrétoires où paſſe leur lymphe, qui ſont ſi fins qu'il n'eſt pas poſſible de les apercevoir. Cette impoſſibilité n'eſt pas une raiſon pour exclure leur utilité, & nier l'exiſtence de leur ferment, ou de leur lymphe.

Glandes contre Nature.

Il y a des *glandes* contre Nature, qui ſe forment par accident. Le principe de ces *glandes* étant vicieux, elles ne peuvent produire que du mal. Nous en parlerons dans un Chapitre particulier.

De la nature des glandes en general.

Nous mettons au rang des *glandes* tout ce qui a en ſoi une vertu tranſmutative, pour changer le ſang des arteres de ſa nature en une autre ſubſtance, ou ferment deſtiné à quelque uſage particulier, utile au corps humain, & qui ſont comme autant de *matrices* où la matiere, animée du principe de vie, prend une nouvelle forme qu'elle n'avoit pas; & ſur ce principe nous allons expliquer la production du lait, par les *glandes* des mamelles.

La

CHAP. XIX.

Glandes des mamelles.

La ſubſtance des *mamelles* eſt compoſée d'un grand nombre de *glandes*, de figure ovale, qui ſont ſituées dans une grande quantité de graiſſe. Les conduits du lait ſont ſitués dans les interſtices des *glandes*; & à meſure qu'ils aprochent du mamelon, ils ſe joignent, & s'uniſſent enſemble par pluſieurs anaſtomoſes, juſqu'à ce qu'ils ne forment plus que ſept, huit ou dix conduits lactés. Ils communiquent avec les arteres, & les veines. Une partie de leur ſang animé & mêlé avec le chyle, & qui reflue des ſouclavieres, ſe change en lait dans les *glandes* des *mamelles* par la vertu de leur ferment. Le ſurplus du ſang qui n'a pas été tranſmué en lait, revient au cœur par la veine cave. Les conduits du lait s'anaſtomoſent entr'eux, afin que, quand il y ſurvient quelque obſtruction, le lait puiſſe ſortir à travers ceux qui ſont libres.

Le mamelon & les mamelles.

Le *mamelon* eſt un corps ſpongieux, ou caverneux, au travers duquel paſſent les conduits du lait, dont la groſſeur diminue de plus en plus juſqu'à leur extremité, afin que le lait ne puiſſe ſortir que lors que les *mamelles* en ſont remplies, ou par le ſucement. Les arteres & les veines des *mamelles* vien-

nent

nent des ſouclavieres. Les arteres ſe nomment mammaires internes ; & les veines, mammaires externes. C'eſt par celles-ci que le chyle déja mêlé avec le ſang, au confluent des ſouclavieres dans la cave, eſt porté dans les *mamelles*, par le reflux que cauſe le chyle dans cette partie de la cave. CHAP. XIX.

Lorſque la matrice groſſit, & qu'elle comprime le tronc deſcendant de l'artere aorte, le ſang paſſe en plus grande quantité, & avec une plus grande force, à travers les arteres capillaires des *mamelles* ; & le chyle y reflue auſſi en plus grande abondance, par la ſupreſſion des menſtrues pendant la groſſeſſe : ce qui fait groſſir les *mamelles*. Le ſang qui ſervoit à fournir les menſtrues, n'aïant plus ſon écoulement par en-bas, s'ouvre un paſſage dans les glandes & les conduits du lait, par le moyen de la lymphe qui le précède ; enſuite ſes conduits ſe dilatent peu à peu, à meſure que la matrice groſſit ; & comme ils reçoivent de jour en jour une ſeroſité, ou lymphe, plus abondante, & plus épaiſſe, ils ſe trouvent après l'accouchement remplis d'un *lait* propre à la nouriture de l'enfant, parceque le ſang qui étoit employé auparavant pour le fœtus, Accroiſſement des mamelles dans la groſſeſſe. Lait propre à la nouriture de l'enfant.

CHAP. XIX.

tus, & qui eſt ſuprimé par le détachement du placenta, commençant à s'arrêter après l'accouchement, dilate encore davantage les conduits du *lait*, qui eſt ſi abondant pour lors, que la plus grande partie eſt obligée de couler par enbas, ne pouvant être contenu entierement dans les *mamelles*. C'eſt dans ce tems-là que les femmes ont grand interêt de ſe menager, & de ſe tenir chaudement; car le moindre froid eſt capable de ſuprimer l'écoulement du *lait*, de le coaguler, & de produire dans pluſieurs parties du corps, où ce *lait* corrompu ſe répand, des accidens très fâcheux, qui cauſent ſouvent la mort, ou au moins de très grandes incommodités.

Epanchement de lait très dangereux.

Il y a daus les jointures, & les articulations des os, des *glandes* qu'on nomme *mucilagineuſes*. L'uſage de ces *glandes* eſt de produire, par le moyen de leurs ferments, & du principe de vie qui vient du ſang des arteres, une liqueur mucilagineuſe qu'on trouve dans les jointures des os, qu'elle humecte pour faire gliſſer plus aiſément les articulations, afin que leur mouvement ſoit libre & prompt, & qu'elles ne s'attachent pas enſemble. Ces *glandes* ſont les plus molles de toutes. Elles apro-

Glandes mucilagineuſes & leur uſage.

aprochent beaucoup de la nature d'une eſpèce de graiſſe ſubtile, qu'on trouve dans les interſtices de quelques muſcles, & dans le canal des vertèbres, autour de la moelle de l'épine, pour produire aparament une humeur ſemblable, afin de faciliter leurs fonctions organiques.

Origine des poils.

Tous les *poils* & les *cheveux* ſont une production des petites glandes qui ſont à leur racine, ſous la peau de notre corps, où le principe de vie du ſang des arteres eſt changé & tranſmué en cette eſpèce de production. Si on arrache ces *poils*, il en revient peu après d'autres à leur place. Ils ſe nouriſſent, & croiſſent de même que les ongles, qui ont aparament une même origine, & un ſemblable principe. Chaque *poil* eſt compoſé de ſix autres renfermés dans un même tégument, ou gaîne commune.

Leurs differences & leurs changemens.

La difference de leur couleur dépend beaucoup de la difference du temperament, de la qualité des humeurs qui les nouriſſent, & de celle des glandes & du climat. Ceux de la tête, de la barbe, des aiſſelles, & des parties de la generation, deviennent fort longs. Leur conſiſtance varie dans les differentes parties du corps. Quand la chaleur naturelle

CHAP. XIX.

turelle s'affoiblit, ils blanchiſſent. Il y en a qui naiſſent avec nous, comme ceux de la tête, des cils, & des ſourcils. D'autres croiſſent à un certain âge, & annoncent celui de la puberté; comme ceux de la face, des aiſſelles, & des parties de la generation.

Leur uſage.

L'uſage de quelques-uns eſt de ſervir d'ornement. Il y en a qui marquent les parties qu'on doit tenir cachées, que la pudeur & l'honnêteté ne permettent pas de montrer, & qui ne ſont devenues, ſuivant toutes les aparences, ainſi couvertes de la livrée des brutes, que lorſqu'elles ont été ſuſceptibles de honte dans nos premiers parens, après le péché, qui leur a fait perdre leur premiere innocence.

CHAPI-

## CHAPITRE XX.

### *Des parties de la generation en general.*

DE toutes les parties du corps de l'homme, & de la femme, il n'y en a point qui faſſe éclater davantage la ſageſſe du Créateur que celles qui ſont deſtinées à la generation, ſoit qu'on les regarde par raport à leur conſtruction interne, à leurs propriétés, & à leurs uſages, ſoit qu'on les conſidere par raport à leurs effets, & à leurs productions.

Sageſſe du Créateur dans les parties de la generation.

Leur conſtruction interne que nous allons décrire eſt ſans doute admirable, & ſemble renfermer le principe, & le modele univerſel de toutes les machines que l'eſprit de l'homme eſt capable d'inventer, ſoit pour les forces mouvantes, ou pour les hydrauliques. En effet on y remarque une infinité de reſſorts, & d'inſtrumens qui ont chacun des mouvemens, & des propriétés particulieres pour les operations auxquelles elles ſont deſtinées. Divers fluides y ont leurs ſources, leurs progrès, & leurs reſervoirs. Le mouve-

Leur conſtruction admirable.

CHAP. XX.

ment y a des principes qui le dirigent, & le diverſifient. Tout y eſt diſpoſé avec tant d'art, & dans un ſi bel ordre, que la Nature ne manque jamais de produire ſon effet, pourvu qu'aucun obſtacle ne trouble une harmonie ſi parfaite, & ſi digne de la ſageſſe de ſon auteur.

Leurs propriétés.

Les propriétés de ces parties ne ſont pas moins admirables que leur conſtruction. Elles ont en elles une vertu attractive, pour s'aſſimiler l'eſprit de vie qui eſt cette ſemence aſtrale, & univerſelle, qu'elles déterminent à produire l'eſpèce. Elles s'uniſſent à tout ce qui peut leur être utile, & rejettent tout ce qui peut leur être nuiſible. Elles ont la vertu tranſmutative en partage, pour changer la nature vile des ſubſtances qu'elles contiennent, en une plus parfaite. Il y en a même qui ont la vertu de changer ce qui étoit déja formé, en une autre forme differente, en donnant l'exiſtence à ce qui ne l'avoit pas, & celle de l'anéantir après, ſuivant l'imagination, & les impreſſions de l'ame ſur la matiere qui lui eſt ſoumiſe.

Leurs diſpoſitions à la production de l'eſpèce.

Il y a des lieux dans ces parties où l'eſprit univerſel ſe partage également dans la matiere des mâles, pour la production des deux ſexes, dans laquelle il forme une

une infinité de petits œufs. Il y en a d'autres où il éclôt, de ces œufs, une infinité de petits animaux ſemblables à des vers. Dans les parties des femelles, le même eſprit univerſel produit des œufs deſtinés chacun en particulier à recevoir l'un de ces petits animaux, dans le moment de la conception. Toutes ces parties ſont deſtinées principalement à la production de l'eſpèce. L'auteur de la Nature a attaché dans l'action qui unit les deux ſexes, pour la production de l'eſpèce, un plaiſir très ſenſible & très néceſſaire, mais qu'il n'eſt jamais permis de gouter que dans un légitime mariage. Il y a auſſi dans les parties de la femme un uſage particulier qui ſert à procurer ſa ſanté, & à marquer ſa fécondité. Mais il y en a un qui par ſon merite l'emporte infiniment ſur tous les autres : c'eſt celui qui diſpoſe la ſemence déja animée, & revétue d'un corps vivant, ſemblable à un ver, à recevoir l'ame, & la forme humaine, en ſe dépouillant de la premiere qui lui étoit commune avec les plus vils inſectes. CHAP. XX.

Les effets, en general, des parties deſtinées à la generation, ſont premierement, dans l'homme, de produire la ſemence dans les arteres ſpermatiques, & de l'introduire enſuite dans les teſticules, où cette ſemence produit les petits Production de la ſemence.

CHAP. XX.

vers qui se nourissent & croissent, dans ces parties, de la substance qui vient de leurs glandes.

Conception.

Le mouvement & le concours des parties des deux sexes, qui produit leur sensibilité exquise, introduit, en second lieu, dans les ovaires de la femme ces petits animaux, pour féconder l'un des œufs qui y sont contenus. Cet œuf ainsi fécondé d'un de ces petits animaux, se détache, & descend dans la matrice, où sa membrane externe s'attache au fond, & devient le placenta, dans lequel les extremités capillaires des arteres, & des veines de la matrice, prennent racine. Le fœtus renfermé dans deux autres membranes, après s'être dépouillé de sa premiere forme, est nouri de la substance de sa mere, & croît jusqu'au terme de sa maturité. Ensuite il se manifeste au jour, en déchirant ses liens, & en forçant le passage qui le tenoit enfermé.

Delivrance.

Multiplication de l'homme.

Ce qui fait encore l'excellence des parties de la generation au dessus des autres, c'est qu'elles ont le privilége de multiplier l'espèce à l'infini. Les deux sexes se reproduisent par leur moyen, & perpétuent l'especè. Comme les anges prévaricateurs avoient laissé par leur chute des places vacantes dans le ciel, il étoit néceſſaire que l'homme, qui avoit été créé

pour

pour les remplir, fût pourvu d'un moyen capable de multiplier & perpétuer ſon eſpèce : ce que l'auteur de la Nature a fait d'une maniere ſi admirable. CHAP. XX.

Quoique le privilége, qui eſt dans l'homme, ſoit commun avec celui qu'on remarque dans les animaux, & végétaux, la production qui vient de l'homme l'emporte infiniment au deſſus de celle qui vient de leur part, parcequ'elle eſt deſtinée pour le ciel, & que la leur n'eſt que pour la terre. Tout ce qu'il y a eu de Saints, & de grands hommes ſur la terre, depuis le commencement du monde, eſt venu de cette ſource féconde, dont le principe actif & paſſif étoit dans *Adam & Eve*. Son excellence au deſſus de celle des autres créatures.

Si les parties de la generation ſont ſi admirables par leur ſtructure, & ornées de tant de priviléges, combien ne doit-on pas craindre de les profaner par des actions indignes & criminelles, qui meritent ſi juſtement une éternité de peines ! Dieu, qui eſt la pureté même, a ſi fort en horreur l'impureté, qu'il ſe vengera infailliblement d'une maniere terrible, & punira très ſéverement ceux qui auront profané ſes plus excellens ouvrages. Que dis-je ! Il punit même, dès cette vie, par des maladies honteuſes & mortelles, ceux qui pour ſatisfaire leur Horreur de l'impureté.

CHAP. XX.

passion brutale, s'abandonnent au vice de l'impureté.

Different dégré de merite & de perfection dans les créatures.

L'auteur de la Nature, en donnant l'être & la perfection à toutes les créatures, leur a assigné differens dégrés de merite, & de perfection. Cette difference, qui a eu lieu dans les diverses parties de l'homme, & de la femme, dans l'état d'innocence, a subsisté dans l'état de chute. Mais quoiqu'après le péché toutes les créatures, qui en ont contracté les taches inefaçables, ayent beaucoup déchu de leur premiere perfection, le Créateur conservant néanmoins toujours pour ses plus excellens ouvrages une estime particuliere, & un amour de prédilection au dessus des autres, exige que nous les respections aussi, parcequ'ils ont été les plus belles productions de sa sageſſe. Si cela est ainsi, combien nos semblables, qui ont été comme nous les chefs-d'œuvre de ce divin ouvrier, exigent-ils de respects & de consideration de nous, par raport à l'ouvrage qui est si digne de nos admirations, & qui doit nous fournir de puissans motifs d'amour & de reconnoissance envers Dieu, qui en est l'auteur! C'est ce qui fait un des principaux fondemens de la charité Chretienne envers Dieu, & le prochain, confirmé par le premier & le plus grand précepte

Respect que le Créateur exige pour les plus parfaites.

cepte du Décalogue, qui renferme tous les autres. CHAP. XX.

Dieu, qui a voulu établir & conſerver en nous ce reſpect pour ſes plus excellens ouvrages, nous a laiſſé, après le péché de notre premier pere, ce beau ſentiment de la pudeur, comme un des plus beaux apanages de la vertu, qui fait l'ornement de l'ame. Cette pudeur eſt une eſpèce de bouclier qui couvre & deffend l'innocence, & la beauté de l'ame, contre tout ce qui peut lui faire perdre quelque choſe de ſon prix; & lorſqu'elle ſe manifeſte, cette pudeur, elle eſt eſtimable, & reſpectable même à ceux qui ont perdu tout ſentiment d'honneur, & de probité. Il étoit néceſſaire que la Nature corrompue, & entrainée par la concupiſcence vers le mal, eût un tel frein pour la retenir. C'eſt le frein que Dieu a donné à l'homme, & à la femme, après leur péché, qui les obligea de ſe cacher, par la honte qu'ils eurent de ſe voir nuds, & qui a paſſé à leur poſterité. La pudeur, apanage de la vertu.

Cette honte, qui ne nous permet pas de laiſſer voir l'exterieur des parties de la generation, leſquelles doivent être couvertes, n'exclue pas la conſideration des parties interieures, où conſiſte l'excellence d'un ouvrage ſi admirable, & en même tems ſi reſpectable, par raport à ſon auteur Elle n'exclue point la conſideration des parties interieures.

CHAP. XX.

auteur, & à ſes productions. C'eſt pourquoi je paſſerai ſous ſilence les parties exterieures de la generation, & ne parlerai que des interieures. Je tâcherai de menager d'un côté, autant qu'il me ſera poſſible, la delicateſſe des perſonnes vertueuſes, & de réprimer de l'autre les paſſions de celles qui pouroient être ſuſceptibles de quelque impreſſion contraire à l'honnêteté, & à la pureté, en leur inſpirant du reſpect pour des choſes dont Dieu ne peut ſouffrir impunément la profanation, & le mauvais uſage.

# CHAPITRE XXI.

## *Dissertation sur les parties de l'homme destinées à la generation.*

### SECTION I.

AVant que d'expliquer l'usage des glandes & des parties de la generation, je commencerai par décrire la route des fluides, depuis le principe, ou la source des arteres spermatiques, laquelle est dans l'aorte, un peu au dessous des émulgentes, jusqu'à l'extremité du gland de la verge, où se termine le canal commun, qui est celui où passe l'urine & la semence de l'homme : l'urine, qui vient seule de la vessie, & la semence, qui vient aussi seule par les vaisseaux deferens, ou éjaculatoires, lesquels s'ouvrent dans l'urèthre, un peu au dessus du col de la vessie. Plan de ce Chapitre.

Les *arteres spermatiques* sont minces, & longues. Leur principe, qui est dans l'aorte, est extrêmement petit; mais immédiatement après, elles grossissent. Elles Les arteres spermatiques.

CHAP. XXI.

les ſont les vaiſſeaux préparens, dans leſquels le ſang recevant un dégré de digeſtion, ſe trouve diſpoſé à produire une infinité de points ſeminaux formant autant d'œufs, qui renferment chacun en leur particulier le principe de la ſemence, la plus pure production du principe de vie, renfermé dans les globules du ſang.

Leurs canaux.

Les *canaux* de chacune de ces arteres deſcendent dans une production du peritoine, paſſent par les anneaux en ſortant de l'abdomen, & par deſſus les os pubis, & vont ſe rendre dans les teſticules. Mais avant que d'y arriver, ils ſe partagent chacun en deux branches, dont les plus groſſes ſe diſtribuent aux teſticules, & les deux petites aux épididimes. Quand le ſang a produit ces petits œufs, & qu'il a animé & vivifié les teſticules, & les épididimes, il revient par les veines, qui naiſſent de pluſieurs branches & rameaux répandus ſur les teſticules, vers l'abdomen, par les productions du peritoine, en ſuivant la même route que les arteres ont tenue en deſcendant. A meſure qu'elles s'avancent, leurs branches forment de fréquentes anaſtomoſes, & ſe diviſent de nouveau juſqu'auprès de l'abdomen, où elles ſe réuniſſent, pour former la veine *ſpermatique* droite, qui s'ou-

s'ouvre dans la veine cave, un peu au deſſous de l'émulgente ; & la veine *ſpermatique* gauche, qui s'inſere dans l'émulgente du même côté, afin qu'elle ne ſoit pas obligée de paſſer ſur l'aorte, dont la pulſation pouroit arréter le ſang qui revient des teſticules très lentement, parceque les orifices des *arteres ſpermatiques* étant fort étroits, & le *canal* de ces arteres, à proportion, très large, la pulſation n'y doit pas être conſiderable, & pour mieux dire il n'y en a point du tout de réglée, comme dans les autres arteres, afin que le ſang animé des *arteres ſpermatiques* ait le tems de s'y digerer, & que la digeſtion ne ſoit point troublée, ni interrompue: ce qui eſt cauſe que le ſurplus du ſang, qui a été employé à former la ſemence, entre ſi lentement dans les veines qui ſont ſans valvules, parcequ'elles n'en ont pas beſoin.

Pourquoi il n'y a point de pulſation dans les arteres ſpermatiques.

## SECTION II.

Les *teſticules* ſont des corps glanduleux, & vaſculeux, qui renferment chacun leurs glandes, & leurs reſervoirs, leſquels ſont des *matrices*. Les reſervoirs ſont des cavités, ou vaiſſeaux aſſez gros, formés de l'union d'une infinité

Les teſticules.

CHAP. XXI.

nité de vaiſſeaux capillaires. Ils ſont ſéparés par des productions membraneuſes, répandues dans toute la capacité des *teſticules*. C'eſt dans ces cavités, ou vaiſſeaux ſpermatiques, que les petits œufs, contenant le principe de la ſemence, viennent à éclore, après une digeſtion convenable, qui donne naiſſance à une infinité de petits animaux ſemblables à des vers. Ils s'en forme de même, ſuivant toutes les aparences, dans les épididimes, puiſque le même ſang, qui a formé ceux des *teſticules*, vient s'y rendre.

Pourquoi ils ſont vaſculeux & glanduleux.

Les *teſticules* ſont vaſculeux, afin que par des vaiſſeaux très deliés, le principe de la ſemence ſoit exprimé du ſang, & introduit dans leur reſervoir par un véhicule lymphatique très ſubtil. Il eſt néceſſaire auſſi qu'ils ſoient glanduleux, pour produire un ferment animé du principe de vie, qui ſoit propre à diſpoſer ces petits œufs, dans la chaleur temperée des *teſticules*, à s'ouvrir pour faire éclore ces petits vers, & qui leur ſerve de véhicule, & d'aliment.

Difference entre ſperme & ſemence.

C'eſt ce véhicule qu'on apelle *ſperme*, qui eſt bien different de la *ſemence*. Il eſt ſeulement un moyen néceſſaire à la production de l'eſpèce. Il pouroit bien

y avoir du *ſperme* ſans *ſemence*, comme cela peut être dans les garçons qui n'ont pas encore l'âge de puberté; mais la *ſemence* ne ſe peut jamais produire ſans *ſperme*. CHAP. XXI.

Les productions, ou cavités dans leſquelles la ſemence ſe digere, & ſe perfectionne, ſe réuniſſant au milieu du teſticule, compoſent cinq ou ſix petits conduits, qui à l'extremité du teſticule percent la tunique albuginée, & forment par leur union un canal qui, après avoir fait pluſieurs tours & replis ſur la partie ſuperieure du teſticule, compoſe un corps oblong preſque cilindrique, & ſemblable à une chenille. On l'apelle *épididime:* il eſt attaché au teſticule par le moyen de l'albuginée, & avec le vaiſſeau deferent. Les épididimes.

La ſubſtance des *épididimes* eſt glanduleuſe & vaſculeuſe, comme celle des teſticules, & a ſes productions pour la même fin. Les vaiſſeaux, dans leſquels la ſemence ſe porte, ſont les plus aparens. Les ſanguins viennent des arteres ſpermatiques, comme ceux des teſticules. Leurs nerfs, & ceux des teſticules, ont leurs principes communs. Ils ont de même des lymphatiques. Il y a bien de l'aparence qu'il ſe forme auſſi de petits vers ſpermatiques dans les *épididimes*, mais en plus petite quantité, parce- Leur ſubſtance & leurs productions.

CHAP. XXI.

qu'ils ſont formés d'une ſubſtance ſemblable à celle des teſticules, & qu'ils ont des arteres particulieres qui leur fourniſſent le même principe de la ſemence.

Vaiſſeaux deferens.

Les *vaiſſeaux deferens*, ou éjaculatoires, qui leur ſont communs, ſont des conduits blancs fort ſemblables à deux nerfs, & chacun de la groſſeur d'une plume médiocre, d'une ſubſtance aſſez ſolide pour tenir leur canal toujours dans le même état, afin que la ſemence y paſſe librement, lorſqu'elle eſt attirée, ou pompée par les veſicules ſeminaires. Il en part un de chaque épididime. A meſure qu'ils montent, ſans quiter la tunique vaginale, ils font pluſieurs petits plis. De là ils entrent dans l'abdomen par les anneaux du muſcle tranſverſal, & des obliques; & paſſant par deſſus les ureteres, entre la partie poſterieure de la veſſie & le *rectum*, ils groſſiſſent en aprochant des veſicules ſeminaires, qui en ſont une production. Enſuite ils s'aprochent fort près l'un de l'autre, & diminuent de plus en plus en groſſeur. Ils paſſent à travers les proſtates, & s'ouvrent dans l'urèthre un peu au deſſous du col de la veſſie. Leurs orifices ſont ſi petits, & ſi étroits, que rien n'y ſauroit entrer que par force: ce qui eſt néceſſai-

Pourquoi leurs orifices ſont ſi étroits.

re

re non seulement pour empêcher l'écoulement involontaire de la semence, mais encore pour tenir ses passages fermés, lorsque les vesicules seminaires se dilatent, pour attirer, ou pomper la semence des testicules. Mais quand elles viennent après à se contracter, elles l'obligent de passer avec plus de rapidité par ces passages étroits: ce qui fait gouter la sensibilité exquise de l'acte du coït. CHAP. XXI.

## SECTION III.

Les *vesicules seminaires* sont deux parties instrumentales, membraneuses & musculaires, attachées à la partie inferieure du col de la vessie, une à chaque côté, entre la vessie & l'intestin droit, ou *rectum*. Elles sont jointes l'une à l'autre par une membrane composée de fibres charnues, qui, dans le tems du coït, se dilatent pour pomper la semence des testicules, & qui se contractent ensuite en pressant les *vesicules* qu'elles environnent, pour forcer la semence d'aller en avant. Les *vesicules* sont couvertes d'une membrane fine, sous laquelle on voit ramper beaucoup d'arteres, de veines, de nerfs, & de vaisseaux lymphatiques. Elles ont environ deux doigts de longueur, & un dans leur plus grande lar- Les vesicules seminaires.

CHAP. XXI.

geur, à les conſiderer dans l'inaction ; mais lorſqu'elles ſe dilatent, elles ſont beaucoup plus larges, & leur largeur va toujours en diminuant peu à peu juſqu'auprès des proſtates.

Leurs diverſes parties.

Elles ont deux cavités conſiderables, diviſées en cellules membraneuſes, formées par une forte membrane qui paroît une production des vaiſſeaux deferens, par où elles reçoivent la ſemence qui vient des teſticules. Leurs arteres viennent de celles de la veſſie, & leurs veines vont s'y rendre. Le *plexus* du baſſin leur donne des nerfs. Quelques-uns prétendent y avoir trouvé des glandes ; mais nous ne voyons pas quel pouroit être leur uſage, ſi ce n'eſt pour humecter leurs membranes internes. Or la lymphe peut le faire ſans cela : ce qui nous fait conclure qu'elles n'ont point le glandes, & que ceux qui y en ont cru voir, ſe ſont trompés.

## SECTION IV.

Les proſtrates.

Les *proſtates* ſont un ſeul corps glanduleux, à peu près de la figure d'un cœur, & ſitué au devant du col de la veſſie. Ils couvrent une grande partie du principe de l'urèthre. Ils ſont couverts d'une membrane muſculaire, ſemblable

blable à celle des veſicules ſeminaires, dont l'uſage, en ſe contractant, eſt de ſéparer des *proſtates* une liqueur blanchâtre qui ſe forme dans leurs glandes, & qui demeure dans de petites veſicules juſqu'au tems du coït, qu'elle eſt verſée dans le principe de l'urèthre, par neuf, dix, ou douze conduits excrétoites, qui s'ouvrent autour des vaiſſeaux deferens. Le bord de leur embouchure eſt entierement ſpongieux, pour retenir cette liqueur, dans le tems que les veſicules ſe dilatent, & pour empécher ſon écoulement continuel, qui arrive quelquefois dans la gonorrhée, quand leurs orifices ſont rongés par le *virus* verolique. Leurs vaiſſeaux ſont communs avec ceux des veſicules ſeminaires. CHAP. XXI.

Uſage de leur ſubſtance.

La liqueur blanchâtre, que les *proſtates* ſéparent, eſt une production de leurs glandes, qui procède du principe de vie du ſang des arteres, & qui ſort d'abord dans le coït, pour humecter le canal de l'urèthre, & pour ſervir de véhicule à la ſemence, afin qu'elle ſoit portée plus rapidement dans la matrice.

## SECTION V.

La verge.

La *verge* eſt une des parties les plus conſiderables de la generation, deſtinée à re-

CHAP. XXI.

cevoir l'impreſſion du mouvement, & à porter la ſemence dans la matrice. Sa ſubſtance eſt compoſée de deux corps ſpongieux, qu'on nomme les corps caverneux. Ils naiſſent de deux differens endroits de la partie inferieure des os pubis. A quelque diſtance de leur origine, ils s'uniſſent enſemble, ſéparés ſeulement par une membrane qui devient mince, à meſure qu'elle aproche du gland qui eſt à l'extremité exterieure de la *verge*.

L'urèthre.

Sous les corps caverneux eſt ſitué le canal de l'*urèthre*. Son extremité, qui eſt auprès des proſtates, eſt groſſe & ſpongieuſe, & ſe nomme la bulbe. On y a découvert trois glandes : les deux premieres ſituées une à chaque côté de l'*urèthre*, entre les muſcles accelerateurs, & la bulbe : la troiſieme dans l'angle de la courbure de l'*urèthre*.

Uſage de ſes glandes.

Ces *glandes* tranſmettent dans l'*urèthre* une humeur viſqueuſe, dans le tems que la *verge* ſe roidit par quelque occaſion qui ſe preſente, & qui met le ſang en mouvement dans cette partie. L'uſage de cette liqueur eſt de faciliter l'entrée de la *verge*. Il y a auſſi une autre *glande* ſituée au deſſous des proſtates, qui produit une liqueur mucilagineuſe dans l'*urèthre*, laquelle a peut-être le même

uſage

uſage que les précédentes, ou qui ſert à oindre & à humecter l'*urèthre*, pour le deffendre contre l'âcreté des ſels de l'urine. Les *glandes* de *tyſon*, qu'on apelle odoriferantes, ſont ſituées autour de la couronne du gland: elles ſéparent une liqueur pour l'humecter, afin que le prépuce puiſſe rouler aiſément.

Branches que la verge reçoit.

La *verge* reçoit deux branches d'arteres, & autant de veines, des vaiſſeaux hypogaſtriques, outre celles qui viennent de la veine honteuſe, & de l'artere. Elle a auſſi pluſieurs lymphatiques qui viennent des glandes des aines, dont l'uſage eſt de laver & rafraichir les parties de la *verge*, après l'action du coït.

## SECTION VI.

Effet de l'eſprit de vie ſur la verge.

Quand le ſang des arteres de la *verge* ſe met en mouvement par l'apétit ſenſuel & concupiſcible, il s'échape à travers pluſieurs petits trous qui ſont ſitués aux côtés de leurs branches capillaires, & il entre dans la cavité du tiſſu ſpongieux: ce qui fait gonfler & étendre les corps caverneux, parceque l'eſprit de vie qui eſt dans les globules du ſang, ſe mettant en mouvement, enfle les globules qui font étendre & roidir la *verge*. Si dans cet état elle entre en action pour la genera-

CHAP. XXI.

tion, les muſcles accelerateurs étant mis en mouvement, les muſcles érecteurs compriment en même tems, contre l'os pubis, les arteres de la partie ſuperieure de la *verge*, & ce mouvement réiteré cauſe enfin le départ de la *ſemence*, & le coït: ce qui ſe fait parceque les *veſicules ſeminaires*, qui ont attiré en elles la *ſemence*, ſe contractent, étant irritées, dans leur plus grande extenſion, par le mouvement des petits animalcules dont elle eſt compoſée. Cette *ſemence* eſt pouſſée dans l'urèthre avec violence, par les orifices des vaiſſeaux deferens, qui ſont obligés de ſe dilater pour lui faire paſſage. Les proſtates ſe contractent en même tems, & pouſſent auſſi dans l'urèthre leur ſubſtance blanche, qui précède toujours la *ſemence*, & qui lui ſert de véhicule, la faiſant entrer avec plus de rapidité dans la matrice. Les *veſicules ſeminaires* s'étant contractés une premiere fois, ſe dilatent encore de nouveau par la puiſſance des muſcles dilateurs, & érecteurs. En ſe dilatant, elles attirent dans leurs cellules, ou cavités, par aſpiration, à la maniere d'une pompe, la *ſemence* qui reſte dans les vaiſſeaux deferens, & même dans les teſticules. Lorſqu'elles en ſont remplies, elles ſe contractent encore, en pouſſant toujours en avant la *ſemence*, qui

Départ de la ſemence, & action des veſicules ſeminaires.

qui eſt ſuivie d'une *ſemence* nouvelle : ce qui ſe fait à pluſieurs repriſes, mais toujours en diminuant, juſqu'à ce que les reſervoirs ſoient épuiſés. La vertu du moteur étant éteinte, ou ralentie, le ſang des arteres ſe reſerre en lui-même, ſe retire & entre dans les veines ; & les parties de la generation redeviennent tranquiles comme auparavant.

Cauſe de la ceſſation de mouvement.

La cauſe du ralentiſſement du mouvement des *veſicules ſeminaires*, & des proſtates, de la ceſſation du plaiſir, & de la tranquilité des parties, vient de ce que la ſemence qui eſt attirée dans les *veſicules ſeminaires*, après leur premiere contraction, eſt en moindre quantité, & moins agitée que celle qui en eſt ſortie auparavant. Celle qui vient après celle-ci l'eſt encore moins, parceque la ſemence qui eſt dans les vaiſſeaux deferens, étant en moindre quantité que la premiere, n'eſt irritée, & miſe en mouvement, qu'à proportion qu'elle eſt proche des *veſicules ſeminaires*, où le mouvement de l'homme produit la cauſe de l'irritation, & du départ de la ſemence. Celle qui en eſt plus éloignée, & qui eſt encore en moindre quantité, & la derniere à entrer dans les *veſicules*, étant encore plus tranquile, a par conſéquent encore moins d'action ſur les tuniques de ces *veſicules*,

CHAP. XXI.

pour les faire contracter, parcequ'elle n'a pas acquis la vivacité de celle qui a précédé, & qui eſt ſortie la premiere : ce qui fait qu'une partie reſte en chemin comme inutile.

Le mouvement des animaux de la ſemence, ſemblable à celui des abeilles.

Le mouvement de la *ſemence*, en ſortant des veſicules ſeminaires, eſt ſemblable à celui des abeilles qui ſortent d'une ruche, pour s'aller établir ailleurs. Toute la difference qu'il y a, c'eſt que toutes les abeilles reſtent dans l'endroit où leur Roi s'attache, au lieu qu'un ſeul de ces petits animaux, dont la *ſemence* eſt compoſée, entrant dans un des œufs de la femme, tous ſes compagnons le quitent, & ſe retirent.

Tranquilité de la ſemence dans les teſticules.

La *ſemence* dans les teſticules, & les épididimes, doit être tranquile. Ce n'eſt que le mouvement de l'homme qui produit l'action des veſicules ſeminaires, qui la réveille, qui l'anime, qui l'irrite, afin d'exciter par ſon action les veſicules à ſe contracter, pour la pouſſer dehors. Les teſticules par eux-mêmes n'ont aucune action, étant deſtitués de muſcles. C'eſt aux veſicules ſeminaires qu'apartient celle de tirer & de pouſſer.

De la puiſſance actuelle d'engen-

De tout ce que je viens de dire, on peut tirer cette conſéquence, qu'un homme, après avoir pratiqué une femme qui concevroit de ſon fait, ne pouroit engendrer

avec

avec une autre le même jour, parceque la semence n'auroit pas encore acquis la perfection néceſſaire pour pouvoir engendrer. Il n'en eſt pas de même d'une femme, qui aïant habité en un même jour avec deux ou trois hommes, ne concevra pas quelquefois du premier, mais du dernier, parceque la conception dépend de l'accord de l'action réciproque des deux ſexes, laquelle doit ſe faire en même tems.

CHAP. XXI. drer, pour l'homme & la femme.

CHAPI.

## CHAPITRE XXII.

*Dissertation sur les parties de la femme destinées à la generation.*

### SECTION I.

Plan de ce Chapitre.

JE me dispenserai, dans ce Chapitre, de décrire la figure, la situation, & l'usage des parties exterieures de la generation de la femme. Je passerai même sous silence leurs noms, & l'usage de leurs glandes. Je me bornerai à décrire les parties interieures, & leur usage, particulierement la matrice qui est la plus considerable, & comme le centre où toutes les autres concourent pour la production de l'espèce. Je commence donc à décrire le vagin, dans lequel entre la verge de l'homme, & où le mouvement produit l'action du coït.

Le vagin.

Le *vagin* de la matrice est un long canal rond, qui descend depuis la partie honteuse jusqu'à l'orifice interne de la matrice. Dans les vierges il a environ cinq pouces de longueur. Il est situé entre la vessie & le *rectum*. Sa substance est

CHAP. XXII.

eſt compoſée de deux membranes, dont l'interne qui tapiſſe ſa cavité eſt nerveuſe, & par conſéquent très ſenſible. Dans ſa partie anterieure elle eſt pleine de rides qui ſont ſpirales, & très grandes dans les filles, plus petites dans les femmes, & qui s'effacent dans celles qui ont eu pluſieurs enfans. Ces rides ſervent à faire étendre le *vagin*, dans le tems de la groſſeſſe, & de l'accouchement. On trouve des veſicules dans toute l'étendue du *vagin*. Le col de la matrice en eſt auſſi pourvu. Leur origine eſt dans les glandes, qui ſéparent une eſpèce de mucoſité néceſſaire pour humecter le *vagin*.

Ses fibres.

La membrane externe du *vagin* eſt compoſée de *fibres* muſculaires, qui lorſque l'occaſion le requiert, ſe dilatent & ſe contractent, s'allongent & s'accourciſſent, pour s'accomoder à la longueur & à la groſſeur de la verge. Il y a de ces *fibres* qui embraſſent particulierement la partie inferieure de l'orifice du *vagin*, où il y a un corps caverneux, & un *plexus* de vaiſſeaux, qui environnent auſſi cet orifice. Ces vaiſſeaux rempliſſant ce corps caverneux de ſang arteriel, dans l'érection & dans le coït, retréciſſent l'orifice: ce qui augmente le plaiſir des deux ſexes,

CHAP. XXII.

ſexes, & accelere le départ de la ſemence.

Son uſage & celui de ſes parties.

Le *vagin* eſt un des principaux inſtrumens de la generation pour l'acte du coït: il eſt deſtiné à donner paſſage au fœtus, aux menſtrues, & aux lochies, ou vuidanges. Les arteres, & les veines du *vagin*, qui ſe diſtribuent dans ſa partie ſuperieure, viennent des hypogaſtriques. Celles qui ſe diſtribuent dans la partie inferieure, viennent des hemorrhoïdales. Ces vaiſſeaux communiquent l'un avec l'autre. Les arteres ſont deſtinées à vivifier, & animer ſes parties, pour y entretenir une ſenſibilité exquiſe, & pour faire gonfler & roidir les corps caverneux dans l'occaſion. Les veines reçoivent le ſurplus du ſang qui eſt employé, lequel elles reportent dans la veine cave.

## SECTION II.

La matrice.

La *matrice* eſt une partie très conſiderable, ſituée dans la partie inferieure de l'hypogaſtre, entre la veſſie & l'inteſtin droit. Les os pubis la deffendent par devant, l'*os ſacrum* par derriere, & les os des iſles ſont à ſes côtés. Mais comme il eſt néceſſaire qu'elle ſe gonfle dans les femmes enceintes, cela fait que ces os laiſſent

laiſſent un plus grand eſpace entre eux dans les femmes, que dans les hommes; & c'eſt pour cette raiſon que les femmes ont les hanches plus groſſes que les hommes. CHAP. XXII.

La figure de la *matrice* reſſemble à celle d'une poire dans un corps vivant, mais qui eſt aplatie dans un corps mort. Elle a trois travers de doigt de longueur, depuis ſon orifice interne juſqu'à ſon fond. Sa partie poſterieure eſt large de deux pouces, & l'anterieure d'un : elle a un pouce d'épaiſſeur dans les filles. Sa cavité peut contenir une groſſe amande. Elle change de figure, & de dimenſions dans les femmes groſſes. Elle preſſe les inteſtins, & s'étend juſqu'au nombril, quand la femme eſt prête d'accoucher, tandis que dans d'autres tems elle ne paſſe pas l'*os ſacrum*. Sa figure & ſon étendue.

Sa ſubſtance eſt compoſée de *fibres* charnues qui ſont entrelaſſées en maniere de tiſſu. Ces *fibres* forment pluſieurs plans qui ont differentes directions, pour faciliter la contraction de la *matrice* dans l'expulſion du fœtus. Les eſpaces qui ſont entre les *fibres* ſont remplis de membranes minces, & fines, formant un nombre infini de cellules couvertes d'une grande quantité de vaiſſeaux ſanguins, qui Ses fibres, & eau qu'elle contient dans la groſſeſſe.

CHAP. XXII.

qui ſont mille differens replis. L'eau qui ſe trouve au commencement de la groſſeſſe dans la *matrice*, & qui y continue de fluer juſqu'à la fin, eſt une production de ces cellules, laquelle le ſang animé des arteres de la *matrice* a formé avec la lymphe qui vient du reſervoir du chyle, & qui eſt néceſſaire à la nouriture du fœtus. Il y a beaucoup de *glandes* deſtinées à humecter la cavité de la *matrice*. Le fond s'épaiſſit à meſure qu'elle ſe dilate, de ſorte que dans les derniers mois de la groſſeſſe, elle a pour le moins un pouce d'épaiſſeur dans l'endroit où le placenta s'attache, à cauſe que les vaiſſeaux de la *matrice* entrent & prennent racine dans ſa ſubſtance, & qu'ils deviennent plus conſiderables qu'auparavant.

Son orifice.

L'entrée de l'*orifice* de la *matrice* ſe joint à la partie ſuperieure du vagin, & fait une éminence en forme de lèvre, laquelle reſſemble au muſeau d'un petit chien. Cet *orifice* eſt fort petit dans les filles: il eſt un peu plus grand dans celles qui ſont accouchées, & dans les femmes groſſes; mais dans celles-ci il y a une humeur viſqueuſe qui le ferme exactement. Néanmoins, dans l'accouchement, il laiſſe ſortir le fœtus. Cette

te partie de la cavité de la *matrice* qui eſt auprès de l'*orifice* interne, étant plus étroite que vers le fond, s'apelle le col de la *matrice*. Sa ſurface eſt inégale. Les interſtices de ſes rides contiennent pluſieurs conduits fort petits, qui déchargent une liqueur viſqueuſe, pour humecter le col de la *matrice* pendant l'écoulement des menſtrues. Le ſiége des fleurs blanches vient par ces conduits, des glandes qui ſont à leur origine, & où eſt leur ſource.

## SECTION III.

Le col de la matrice & les veſicules ſeminaires.

Le *col de la matrice* a de petits trous qui ſont les extremités des conduits qui viennent des *veſicules ſeminaires*, deſtinés à verſer dans la *matrice* une liqueur mucilagineuſe, & ſpermatique, que les *veſicules* pompent, & attirent des teſticules de la femme, & qui tient lieu de la ſemence par le plaiſir qu'elle cauſe en ſortant de ces *veſicules*, qui ſont de petits corps ſpheriques ſitués dans le *col de la matrice*. Ils ſont les réceptacles de cette liqueur ſpermatique, qui y eſt introduite par les vaiſſeaux deferens, ou éjaculatoires, leſquels ont leur origine dans les ovaires, ou teſticules de la femme. Ces *veſicules* ont des membranes ner-

CHAP. XXII.

veuſes & muſculaires, comme celles de l'homme. Elles ſe dilatent, & ſe contractent de même par des muſcles dilateurs, & contracteurs. Quand les *veſicules* ſe dilatent par l'action que le mouvement fait produire aux muſcles accelerateurs, elles attirent en elles cette liqueur ſpermatique qui les oblige à ſe contracter, & à la pouſſer avec force dans la cavité de la *matrice*, pour ſervir de véhicule à la ſemence de l'homme.

Coït & conception.

Si le ſperme des deux ſexes y entre en même tems, le plaiſir que la femme reſſent eſt complet; car dans le même moment la ſemence eſt attirée par aſpiration dans les trompes de *Fallope*, qui ſe dilatent pour la recevoir, & pour l'attirer en elles dans la partie de l'ovaire où l'œuf le plus mur ſe preſente, pour être fécondé d'un des petits vers de la ſemence. Pendant ce tems-là les veſicules ſe dilatent de nouveau, pour attirer encore la liqueur ſpermatique, qu'elles pouſſent dans la *matrice*: ce qui ſe fait de même à pluſieurs repriſes, leſquelles vont toujours en diminuant, juſqu'à ce que les parties de la generation demeurent tranquiles, comme celles de l'homme.

Com-

Quand les veſicules ſeminaires de la femme

femme ſe contractent avant celles de l'homme, ou après, il ne ſe fait point de generation, parceque leur action eſt relative à celle des trompes de *Fallope*; avec cette difference néanmoins, que les veſicules ſeminaires ſe contractent en même tems que les trompes de *Fallope* ſe dilatent. Il eſt néceſſaire que les veſicules ſeminaires des deux ſexes ſe contractent en même tems, afin que ce qu'elles pouſſent dans la *matrice* ſoit attiré dans le même tems, par la dilatation des trompes de *Fallope*, dans les ovaires qui ſe trouvant comprimés & dilatés, découvrent l'œuf qui doit être fécondé, & qui donne priſe à un des petits animaux de la ſemence, tandis que la liqueur ſpermatique des glandes des ovaires eſt attirée par les veſicules ſeminaires. L'acte du coït de la femme aïant précédé celui de l'homme, la ſemence ne peut être portée en ſon lieu. Elle ſort preſque auſſitôt, ſans avoir pu aller plus loin que le col de la *matrice*. Il faut par conſéquent, pour que la generation ait lieu, que l'acte du coït de l'homme & de la femme ſoit d'accord, & ſe faſſe dans le même moment, à la premiere éjaculation; car autrement il ne ſe fait point de generation.

CHAP. XXII. ment cette conception ſe fait, ou ne ſe fait pas.

CHAP. XXII.

Pourquoi certaines femmes n'engendrent point.

Les courtisanes, & les femmes débauchées, ou luxurieuses, engendrent rarement, & quelques-unes presque jamais, parceque leurs vesicules seminaires sont dans une habitude trop fréquente du coït: ce qui fait que les unes par leur temperament chaud se mettent trop tôt en action, & les autres trop tard, la sensibilité des parties de ces dernieres étant usée, & amortie. On peut les comparer à cet égard à des ivrognes de profession, qui à force de boire du vin, ont le goût tellement usé, qu'il leur faut les liqueurs les plus fortes pour le leur réveiller. Ce qui est donc cause que les unes & les autres ne peuvent engendrer, c'est que l'action de leurs vesicules n'est jamais d'accord avec celles de l'homme.

Cause de sterilité dans les personnes sages.

On voit bien des gens mariés sages, & bien reglés, qui n'ont point d'enfans, ce qui vient du defaut d'harmonie dans leurs parties, & de la difference des temperamens. Cela peut venir aussi de quelque imperfection de leurs parties internes de la generation, ou de quelque accident qui leur est arrivé.

## SECTION IV.

Origine

Les *arteres* & les *veines* de la *matrice* vien-

viennent des hemorrhoïdales, des hypogaſtriques, & des vaiſſeaux ſpermatiques, dont les plus gros rameaux s'anaſtomoſent l'un avec l'autre ; l'artere hypogaſtrique avec la ſpermatique, & la veine avec la veine ; comme auſſi les branches d'un côté de la *matrice*, avec celles de l'autre. Les *nerfs* de la *matrice* viennent des intercoſtales, & de ceux qui ſortent de l'*os ſacrum*. Il y a beaucoup de vaiſſeaux lymphatiques dans ſa ſurface externe, qui s'uniſſant peu à peu forment de groſſes branches qui ont leur inſertion dans le reſervoir du chyle. C'eſt aparament de ce reſervoir que viennent les eaux qui ſe trouvent dans la *matrice* au commencement de la groſſeſſe, & qui ſervent de nouriture au fœtus. Tous les vaiſſeaux de la *matrice* rampent ſur ſa ſurface externe, en faiſant pluſieurs tours & replis, afin qu'ils ne ſe rompent pas, quand elle eſt étendue.

CHAP. XXII. des arteres, des veines & des nerfs de la matrice.

## SECTION V.

La partie poſterieure de la *matrice* eſt libre. L'anterieure eſt attachée par deſſus avec la veſſie, & par deſſous avec le *rectum*, & ſes côtés ſont attachés par deux ſortes de *ligamens*. Il y en a deux qui ſe nomment les *ligamens* larges, &

Ligamens de la matrice.

CHAP. XXII.

les deux autres les *ligamens* ronds. Les deux *ligamens* larges ne ſont autre choſe qu'une production, ou continuation du peritoine, qui part des côtés de la *matrice*. Ils ſont compoſés d'une double membrane qui en contient une autre pleine de cellules dans ſa duplicature. On les compare communément, à cauſe de leur largeur, & de leur figure, aux ailes des chauve-ſouris. L'ovaire eſt attaché à une de leurs extremités, laquelle a ſes vaiſſeaux deferens : l'un qui s'inſere dans le fond de la *matrice*, & qui ſe trouve bouché par le placenta dans la groſſeſſe; & l'autre qui va ſe rendre dans les veſicules ſeminaires, ſituées vers ſon col. Les trompes de *Fallope* deſcendent le long de l'autre extremité.

Origine & ſubſtance des ligamens ronds.

Les deux *ligamens ronds* naiſſent de la partie anterieure & laterale du fond de la *matrice*, & paſſent par les productions du peritoine, à travers les anneaux des muſcles obliques & tranſverſaux de l'abdomen, pour s'aller rendre dans la graiſſe, auprès des aines, où ils forment une expanſion en pate d'oye. La ſubſtance de ces *ligamens* eſt compoſée d'une double membrane parſemée d'un grand nombre de vaiſſeaux ſanguins. Ils ſont aſſez gros vers le fond de la *matrice*, mais ils devien-

deviennent petits, à meſure qu'ils aprochent de leur inſertion. CHAP. XXII.

Il y a quatre *vaiſſeaux ſpermatiques* dans les femmes, comme dans les hommes. Ils ne different qu'en ce qu'ils ſont plus courts. Chaque artere forme pluſieurs tours, & replis. En deſcendant, elles ſe partagent en deux branches, dont la plus petite va à l'ovaire, & la plus groſſe ſe diviſe en trois autres, dont il y en a une qui ſe diſtribue ſur la *matrice*, une autre au deſſus du vagin, & la troiſieme ſur les ligamens de la *matrice*, & ſur les trompes de *Fallope*. C'eſt la même choſe quant à la veine. Vaiſſeaux ſpermatiques des femmes.

## SECTION VI.

Les *ovaires* ſont attachés par le moyen des ligamens larges, à deux travers de doigt de diſtance, ou environ, du fond de la matrice. Ils ont encore un ligament cilindrique, où eſt le vaiſſeau deferent. Ces ligamens les attachent au fond de la matrice, & ſont deux corps de figure ovale un peu aplatis par devant, & ſitués un à chaque côté de la matrice. Situation des ovaires.

Les *ovaires*, qui ſont les teſticules des femmes, ſont glanduleux & membraneux, & preſque moitié moins gros que Leur ſubſtance.

CHAP. XXII.

ceux des hommes. Leur ſurface eſt inégale & ridée dans les vieilles femmes, mais égale & polie dans les jeunes. Ils ſont couverts d'une membrane propre, qui adhere fortement à leur ſubſtance, & d'une autre membrane commune, qui vient du peritoine, & qui couvre auſſi les vaiſſeaux ſpermatiques. Leur ſubſtance eſt compoſée de glandes, de fibres, & de membranes, qui laiſſent de petits eſpaces entre elles, dans leſquels il y a pluſieurs veſicules rondes de differentes groſſeurs, pleines d'une liqueur blanche qui, après avoir bouilli, acquiert la conſiſtance du blanc d'œuf, & dont les plus groſſes égalent à peine un poix. On en trouve ſouvent dix, douze, & davantage dans un ſeul *ovaire*, qui ſont de diverſes groſſeurs, telles qu'on en remarque dans les poules, & autres volatiles. Quelquefois on n'en obſerve qu'un ſeul. Ces veſicules rondes ſont les *œufs* des femmes. Ces *œufs*, comme ceux que l'on voit dans les oiſeaux, ſont peut-être attachés chacun à des fibres comme les grains de raiſin à leur branche, ou comme les fruits des arbres à l'extremité de leur branche. En ce cas on pouroit apeller le tronc où ces fibres ſe réuniſſent, l'*arbre végétal* des *œufs* qui en ſont les fruits, cet arbre aïant ſes racines dans les extre-

Les œufs.

extremités capillaires des arteres ſpermatiques, d'où il tire ſa ſubſtance qui eſt la plus pure production du ſang animé de ces arteres, dont les *œufs* ſont formés & produits. CHAP. XXII.

Si ces *œufs* ne ſont pas attachés à leur branche par des fibres, comme les grains de raiſin à leur grape, ils doivent être au moins enfermés chacun dans une membrane, attachée à leur tronc, comme ceux des poules & des autres oiſeaux; de la même maniere que le ſont les noix, les chataignes, & beaucoup d'autres fruits & graines qui s'ouvrent dans le tems de la maturité, afin que ces fruits & ces graines tombent dans leur *matrice* commune qui eſt la terre. De quelque maniere que la choſe ſe faſſe dans la femme, elle a toujours beaucoup de raport à ce que je viens de dire; car il eſt très certain que les *œufs* des femmes tombent d'eux-mêmes, quand ils ont acquis leur maturité, ou qu'ils ſont fécondés de la ſemence de l'homme, dans les trompes de *Fallope*, & de là dans la matrice. Cela arrive naturellement, car lorſqu'ils tombent avant leur maturité, leur chute, qui eſt contre Nature, eſt cauſée par quelque indiſpoſition de la femme: ce que je vais expliquer dans la Section ſuivante. Membranes où ils ſont enfermés.

CHAP. XXII.

## SECTION VII.

Deux chutes naturelles des œufs, & une contre Nature.

Comme dans les differentes chutes de ces *œufs* il y en a deux naturelles, & une contre Nature, qui ont des effets & des productions ſingulieres, il eſt bon de les expliquer chacune en particulier. Je commence par celle de la generation.

Fécondation de l'œuf.

Il y a bien de l'aparence qu'un des petits animaux de la ſemence entre ſeul dans l'*œuf* le plus mûr, par un petit trou qu'il fait dans l'endroit de l'*œuf* qui peut être percé & où il s'attache. Pendant qu'il y eſt attaché & qu'il travaille à y faire ſon trou, ſes ſemblables ſe retirent & ſont expulſés. Après qu'il a fait ſon trou, il entre dans l'*œuf*, & occaſionne ſa chute, au bout d'un certain tems, dans la trompe de *Fallope*, en cette maniere. Auſſitôt que l'*œuf* eſt devenu fécond par le ſéjour du petit animal qui y eſt entré, il devient opaque quelque tems après, de tranſparent qu'il étoit. Il ſe couvre d'une ſubſtance épaiſſe, & jaune, qui oblige la tunique, qui le tient enfermé, de s'ouvrir en le comprimant, & il ſort enfin par la fente qui ſe fait, comme une ſemence, ou un fruit qui ſort de ſon envelope. Il tombe alors ſur l'orifice de la trompe qui eſt obligé de ſe dilater ſuffiſament

Sa premiere chute naturelle dans les femmes groſſes.

ſament pour lui permettre d'entrer, & de deſcendre dans la matrice, où la membrane externe de l'*œuf* qui devient le placenta de l'embrion, s'attache, & prend racine dans la ſubſtance de la matrice, comme une plante dans une terre qui lui eſt propre.

Sa ſeconde chute naturelle dans celles qui ne le ſont point.

La ſeconde chute naturelle de l'*œuf*, laquelle arrive aux femmes, & aux filles nubiles, & qui occaſionne leurs règles, eſt lorſqu'il a acquis ſa groſſeur & ſa maturité. Pendant qu'il eſt dans cet état, il peut être fécondé, mais étant parvenu à ſon dernier terme, qui eſt d'environ trente jours, il ſe détache de ſa branche, ou de la membrane qui le contient, laquelle s'ouvre pour le laiſſer paſſer. Il tombe auſſi-tôt, comme un fruit trop mûr qui ſe détache de ſa branche, dans la trompe de *Fallope*, & de là dans la matrice.

Cauſe des menſtrues.

La ſubſtance de l'*œuf* trop mûr, laquelle devient comme celle d'un fruit qui mollit, ou qui ſe pourrit, irritant les parties où elle paſſe, & où elle ſéjourne, fermente avec les ſubſtances qui viennent des glandes de la matrice, & acquiert un dégré de force capable de faire impreſſion ſur les extremités capillaires des vaiſſeaux ſanguins, & ſur les orifi-

CHAP. XXII.

orifices des conduits excrétoires des glandes de la matrice, qui fluent tous en même tems par cette irritation: ce qui produit les *menſtrues*, qui ſe déchargent & s'écoulent par l'orifice de la matrice, & par le vagin.

Pourquoi elles fluent abondament.

Ces *menſtrues* viennent aſſez abondament, à cauſe que de toutes les veines du corps de la femme, qui ſont ſituées perpendiculairement à l'horiſon, il n'y a que celles de la matrice qui ſoient deſtituées de valvules. On apelle les *menſtrues*, *purgations*, parcequ'en effet elles ſont formées de l'impureté du ſang, & de celle de la matrice, dont la cauſe de la ſupuration, comme il eſt facile de le concevoir, vient de la chute d'un ou de deux de ces *œufs*, qui arrive tous les mois. Après l'écoulement des *menſtrues* la matrice eſt bien diſpoſée pour la generation.

Cauſe de leur inégalité.

Il y a des femmes, & des filles, dont les *menſtrues* ſont plus longtems à fluer dans des mois, que dans d'autres. Cela vient de ce que les *œufs* des deux trompes de *Fallope* ne tombent pas en même tems dans la matrice; de ſorte que celui qui eſt retardé, fait durer l'écoulement, à proportion du tems qu'il retarde.

La

CHAP. XXII.

Troiſieme chute contre Nature des œufs.

La troiſieme ſorte de chute des *œufs* doit être apellée contre Nature. Sa cauſe vient de quelque indiſpoſition des ovaires qui les forment, ou de quelque impureté du ſang qui eſt mêlée dans la ſubſtance de ces *œufs* : ce qui eſt cauſe qu'ils ſe détachent les uns après les autres, avant le tems de leur maturité. Leur ſubſtance, qui eſt pour lors comme celle d'un fruit avorté, ou piqué de ver, irrite encore plus la cavité de la matrice que la chute naturelle de ceux qui viennent d'un bon principe, & inciſe par ſon âcreté mordicante les extremités capillaires des vaiſſeaux ſanguins : ce qui fait couler & fluer longtems le ſang tout pur des veines, en ſorte qu'il n'eſt preſque pas poſſible de l'arréter. C'eſt ce qu'on apelle *perte de ſang*, laquelle produit des douleurs, & des coliques très aiguës, & quelquefois des ulceres dans la matrice, & des accidens très facheux.

Cauſe des pertes de ſang.

Chute des œufs dans les animaux.

La chute des *œufs* dans les animaux quadrupèdes réveille & produit en eux l'apétit concupiſcible, qui les porte à s'accoupler pour la generation, & production de l'eſpèce. Il y a dans les oiſeaux une autre cauſe qui les excite à s'accoupler. Les femelles, ſans cela, peuvent

CHAP. XXII.

vent produire des *œufs*, mais ces *œufs* ſans l'accouplement du mâle ne peuvent rien produire.

## SECTION VIII.

Du tems de la fécondité & de la ſterilité des femmes.

Les œufs dans les vierges ne parviennent à leur groſſeur, & à leur maturité que quand elles ſont devenu nubiles, & réglées. Elles ont pour lors l'âge que l'on apelle de puberté, & elles peuvent engendrer, & non avant ce tems-là. Quand les femmes ont quarante ou cinquante ans, elles perdent leurs règles, parcequ'il ne ſe forme plus d'œufs dans leurs ovaires: ce qui fait qu'elles ne peuvent engendrer, non plus que les filles avant l'âge de puberté, les œufs dans ces dernieres étant comme des fruits verds qui n'ont pas encore acquis leur maturité.

Accidens, cauſe de ſterilité.

Il y en a qui ont l'âge compétent, & qui n'ont point leurs règles, ou qui ſont fort derangées. Elles ſont par conſéquent hors d'état d'engendrer. Cela peut venir du vice du ſang, de quelque obſtruction dans les viſceres, d'un temperament mal ſain, ou d'une mauvaiſe diſpoſition des parties, cauſée par quelque accident ou maladie, ou par quelque

que chagrin, qui ſuprime le cours de leurs règles, & qui leur fait venir la jauniſſe. Le remède que j'ai enſeigné pour les fièvres, dans le Chapitre XVI. eſt très bon pour ces ſortes de maladies. Mais dans celles qui ſont bien diſpoſées, il n'en va pas de même. Elles ont leurs règles dans le tems preſcrit par la Nature, qui eſt d'environ trente jours, y compris cinq ou ſix jours que les *menſtrues* fluent. Celles-ci peuvent engendrer après l'écoulement des *menſtrues*; car pour lors la matrice eſt purifiée, & bien diſpoſée pour la generation.

Remède contre le ſupreſſion des menſtrues.

Leur terme.

## SECTION IX.

Le petit animal qui eſt entré dans l'œuf pour le féconder, conſerve ſa forme de ver autant de tems qu'il ſéjourne dans la trompe de *Fallope*. Il ne s'en dépouille que dans la *matrice*, où il prend la forme humaine, parcequ'elle eſt le lieu deſtiné à cet effet: non qu'elle ait la vertu de l'opcrer par elle-même, car le principe de cette vertu eſt en puiſſance dans le petit animal, ou dans l'œuf, qui la produit, & l'effet eſt propre à la ſubſtance de l'œuf de la femme, qui lui ſert auſſi d'aliment, ainſi

Uſage de la matrice.

CHAP. XXII.

ſi qu'il eſt prouvé par un évenement des plus extraordinaires, raporté par *Mauriceau*, dans ſon Traité des maladies des femmes groſſes, dont voici l'hiſtoire.

Accident contraire à cet uſage.

On trouva dans le ventre d'une femme morte, après de grandes douleurs, un enfant de trois mois qui s'étoit formé dans l'ovaire, & dans une des trompes de *Fallope*, lequel s'étant trouvé trop ſerré dans cette partie, creva la membrane qui le contenoit: ce qui cauſa les douleurs & la mort de ſa mere.

Remarques là-deſſus.

Il eſt évident que ce qui eſt arrivé dans cette femme, eſt contraire à l'intention de la Nature, parceque l'œuf dans lequel le petit animal étoit entré, & dont avoit été produit ce fœtus de trois mois, s'étoit attaché, & avoit formé le placenta dans cette partie, par le moyen duquel l'enfant avoit été nouri du ſang & de la ſubſtance de ſa mere, parcequ'il y avoit été retenu par quelque accident qui l'avoit empéché de ſe détacher, & de deſcendre dans la *matrice*.

Du principe de la forme humaine.

Cet exemple prouve évidemment que ce n'eſt pas la *matrice* qui donne la *forme* humaine au fœtus, mais que le principe de cette *forme* eſt dans la ſemence même qui vient de l'homme, & que c'eſt une pré-

prérogative qui lui apartient, & qui eſt propre à ſa nature. La femme ne fournit ſeulement que les ſubſtances nutritives. Sa *matrice* n'eſt que le réceptacle, & le domicile qui contient le fœtus, & le moyen qui lui communique ſes ſubſtances alimentaires, pour le faire vivre & croître juſqu'au terme de ſa maturité. CHAP. XXII.

Le changement de *forme* d'un ver de la ſemence en la *forme* humaine, qui eſt ſi digne de nos admirations, & qui paroît ſi incroyable aux ignorans, n'a rien qui doive nous étonner & nous ſurprendre. La ſageſſe du Créateur, qui l'a ainſi ordonné, nous en a laiſſé dans les plus vils animaux des exemples ſenſibles, afin de nous perſuader de la puiſſance qu'il a donnée à la Nature, pour operer ſes changemens de *forme*. Il n'y a qu'à examiner la production des grenouilles, des abeilles, & des vers à ſoye, pour nous convaincre dans notre incrédulité, ſi nous en avions le moindre doute. Exemples du changement de la forme dans les animaux.

A l'égard de l'exiſtence des vers de la ſemence de l'homme, auſſi-bien que des œufs des femmes, elle a été tellement reconnue & demontrée par les Anatomiſtes modernes, qu'il n'y a plus lieu d'en douter.

## CHAPITRE XXIII.

*De la conception, de ſes ſuites, & des parties qui ſe forment avec le fœtus.*

### SECTION I.

Plan de ce Chapitre.

JE paſſerai ici ſous ſilence l'acte de la generation, pour ne m'arréter qu'à la conception, & à ſes ſuites; je veux dire à l'entrée du petit animal de la ſemence de l'homme dans l'œuf de la femme, à la chute de l'œuf dans la matrice, & à tout ce qui ſe paſſe dans cette partie juſqu'à l'expulſion du fœtus.

Action de la ſemence dans l'œuf.

Lorſque le petit animal de la *ſemence* de l'homme eſt entré dans l'*œuf* de la femme pour le féconder, il met en mouvement la ſubſtance qui y eſt contenue, laquelle fermente, & devient jaune, de blanche qu'elle étoit, & enduit toute la ſuperficie de l'*œuf*: ce qui fait que la membrane, ou les fibres qui le tenoient attaché, ou enfermé dans l'ovaire, ſe ſéparent, & ſe détachent, comme il arrive à un fruit quand il eſt mûr. L'*œuf* tombe quelques jours après dans la trom-

Chute de l'œuf dans la

pe

pe de *Fallope*, qui eſt obligée, par l'humeur chaude & irritante de l'*œuf*, d'ouvrir ſon orifice, pour le laiſſer paſſer dans la cavité de la matrice, où il s'attache, & prend racine comme une plante dans une terre qui lui eſt propre : après quoi la premiere membrane de l'*œuf* s'ouvre, & devient le placenta de l'embrion. CHAP. XXIII. trompe de Fallope & de là dans la matrice.

Il ſe paſſe pluſieurs jours, depuis que le petit animal eſt entré dans l'œuf, juſqu'à ce qu'il tombe dans la matrice, ſans que la femme s'aperçoive d'aucun ſentiment de groſſeſſe. Pendant ce tems-là il ſe forme ſous la membrane de l'*œuf* qui devient le *placenta*, deux autres membranes, dont la premiere ſe nomme le *chorion*. La deuxieme, qui eſt la plus interne, ſe nomme l'*amnios*. Elle eſt mince & tranſparente, & ſe remplit par la ſuite d'une liqueur claire, dans laquelle nage le fœtus, & qui lui ſert auſſi d'aliment. Comme ces trois membranes de l'œuf ſont très conſiderables, & qu'elles exigent une explication particuliere & recherchée, je me reſerve à en parler dans la ſuite, afin de ſuivre le principe de la ſemence dans ſon progrès. Formation du placenta, du chorion & de l'amnios.

CHAP. XXIII.

## SECTION II.

Naiſſance des arteres & de la veine ombilicales.

L'œuf étant tombé dans la matrice, la Nature, qui a déja diſpoſé les organes à l'accroiſſement, ſuplée à la nouriture qui manque au petit animal dans l'œuf, par un moyen admirable, en faiſant pouſſer par ſon nombril le principe des deux *arteres* & de la *veine ombilicales*, qui ſortent de ſon petit corps, & qui vont prendre racine dans la membrane externe de l'œuf, qui doit être le placenta, & où ſes racines étendent leurs rameaux.

Le placenta.

L'œuf étant dans la matrice, cette membrane s'ouvre, & forme le *placenta*, lequel s'attache au fond de la matrice, par les extremités de ſes vaiſſeaux, qui adherent & s'uniſſent à ceux de la matrice. Pendant ce tems-là le cordon ombilical s'allonge, & ſuſpend le fœtus, qui commence à ſe diſpoſer à quiter ſa premiere forme, pour prendre la forme humaine, auſſi-tôt que le ſang de la mere s'eſt formé des routes pour circuler dans le fœtus, afin de lui ſervir d'aliment pour l'accroiſſement, & la forme de toutes ſes parties.

Infuſion de l'ame

On doit preſumer que l'*ame* eſt infuſe dans

dans le fœtus, auſſi-tôt qu'il prend la forme humaine. Si cela eſt ainſi, combien les femmes ne ſont-elles pas obligées de ſe menager dans les premiers mois de leur groſſeſſe! Car elles ne ſont pas moins coupables de la perte de leur fruit, par raport à l'*ame*, qui eſt l'image de Dieu, que dans les derniers mois. Cette conſideration doit faire trembler ceux ou celles qui ſont aſſez inſenſés pour provoquer des avortemens, dans le commencement d'une groſſeſſe.

CHAP. XXIII. dans la forme humaine.

Pendant que le placenta s'attache, & prend racine dans la ſubſtance de la matrice, le ſang, qui n'a pas encore formé ſes canaux pour la nouriture & l'accroiſſement du fœtus, reflue, & fait refluer les humeurs qui cauſent les vomiſſemens, & les autres ſimptômes que l'on remarque dans les premiers mois de la groſſeſſe. Le fœtus reſte enfermé dans le chorion & l'amnios, juſqu'à la fin de ſon terme, qu'il vient à rompre ces deux membranes, pour ſortir de ſa priſon.

Cauſe des ſimptômes de la groſſeſſe.

Quand le fœtus eſt parvenu à ſon terme, le placenta ſe détache du fond de la matrice, comme un fruit mûr de ſa branche. La nouriture, que le fœtus recevoit de ſa mere par le cordon ombilical,

Terme de l'enfantement.

CHAP. XXIII.

étant ſuprimée, ou retranchée, par le détachement du placenta, & ſe trouvant obligé de ſe nourir de celle qui eſt renfermée avec lui dans l'amnios, laquelle ne le peut contenter, il fait des efforts pour ſortir, déchire les membranes qui le tiennent enfermé, & cauſe les douleurs de l'*enfantement*. Son impatience lui fait faire pluſieurs mouvemens, qui lui font prendre diverſes ſituations dans la matrice, leſquelles ſont la cauſe du bon, ou du mauvais *accouchement*, dont la plus ordinaire, & la plus naturelle, eſt celle où le fœtus preſente ſa tête au paſſage: ce qui arrive plutôt aux femmes qui agiſſent, qu'à celles qui ſe tiennent tranquiles, parceque dans les mouvemens que les premieres ſe donnent, la tête de l'enfant, qui eſt plus peſante qu'aucune autre partie du corps, tombe en bas, & ſe preſente la premiere au col de la matrice. Ce ſont là ordinairement les plus heureux *accouchemens*.

Accouchement heureux.

Origine & durée du flux de ſang.

Le *flux de ſang* de l'accouchement vient des extremités capillaires des vaiſſeaux ſanguins du fond de la matrice, où étoit attaché le placenta, qui ſont gros & pleins de ſang, & qui ne ſont pas encore fermés, ni retrécis par le reſerrement de la matrice, & de ceux même, où le placen-

ta

ta eſt quelquefois encore attaché, leſquels fluent abondament, quand on vient à le tirer, ou à l'arracher des endroits où il tient encore. Après que l'enfant eſt ſorti du ſein de ſa mere, ce *flux de ſang* continue juſqu'à ce que les extremités des vaiſſeaux ſanguins ſoient aſſez reſſerrés, pour ne pas permettre aux globules du ſang de paſſer, mais ſeulement à la lymphe, ou au lait, qui ſont plus ſubtils que le ſang, & qui continuent de fluer juſqu'à ce qu'il ait pris ſon cours par les mamelles: ce qui fait ceſſer la fièvre de lait. CHAP. XXIII. Flux du lait.

## SECTION III.

Comme les parties qui ſe forment après la fécondation de l'œuf, ſont conſiderables, il eſt bon de les expliquer plus en détail. Je commence donc par le *chorion*. C'eſt une membrane ſpongieuſe, & remplie d'une infinité de vaiſſeaux contigus au placenta, & à la matrice. Elle peut ſe diviſer en pluſieurs petites lames. Elle eſt un peu rude dans l'endroit de ſa ſurface externe, où le placenta s'attache. Elle couvre immédiatement l'*amnios*, ou membrane interne, qui contient cette liqueur claire dont j'ai déja parlé, & qui eſt deſtinée à la nouriture du fœtus. Le chorion. L'amnios.

CHAP. XXIII.

tus. Cette liqueur glutineuſe, & tranſparente, vient en partie du reſervoir du chyle de la mere, par des vaiſſeaux lymphatiques qui s'inſerent dans la matrice. L'autre partie ſe ſépare des glandes de l'*amnios*, leſquelles ſont aux extremités des vaiſſeaux ſanguins, qui viennent des arteres & de la veine ombilicales.

## SECTION IV.

Arteres ombilicales.

Les deux *arteres ombilicales* naiſſent du commencement des iliaques, & quelquefois de l'aorte du fœtus ; & paſſant à côté de la veſſie, elles vont à l'ombilic, à travers lequel elles paſſent en formant pluſieurs inflexions ſpirales. Elles vont ſe rendre au placenta, après avoir premierement donné des rameaux au chorion, & à l'amnios. Elles ſe diviſent en une infinité de branches dans le placenta, où elles portent le ſang du fœtus.

Veine ombilicale.

La *veine ombilicale*, qui eſt deux fois plus groſſe que les arteres, tire ſon origine d'un grand nombre de ramifications diſtribuées dans le placenta. Elle perce le chorion & l'amnios, où elle diſtribue pluſieurs petits rameaux ; & après avoir fait pluſieurs inflexions ſpirales entre les arteres, elle paſſe, couverte du cordon ombilical, à travers le nombril, pour aller

ler joindre le foye du fœtus, & ſe termine dans le ſinus de la veine porte, où elle décharge le ſang, avec le ſuc nouricier, & le principe de la vie que le fœtus reçoit de ſa mere. De là ce ſang paſſe par un canal veineux, & cylindrique, ſitué preſque à l'opoſite de la *veine ombilicale*, pour entrer dans la veine cave, & de là au cœur du fœtus, enſorte qu'il reçoit le principe de la vie par la veine, au lieu que dans les adultes c'eſt par les arteres.

CHAP. XXIII.

Source de la vie du fœtus, & des adultes.

## SECTION V.

Le *placenta*, qui reſſemble à un gâteau, eſt de figure ronde, & plane. Il a environ huit pouces de diamètre, & un pouce d'épaiſſeur. Il croît à la ſurface externe du chorion. A meſure que le fœtus augmente, les branches des vaiſſeaux ombilicaux ſe diſtribuent dans toute ſa ſubſtance. Il ſemble qu'il n'eſt autre choſe qu'un tiſſu des ramifications de la veine & des arteres ombilicales, dont les extremités s'ouvrent aux côtés des vaiſſeaux hypogaſtriques, afin que le ſurplus du ſang rentre dans la mere, & qu'il s'y faſſe une eſpèce de *circulation* entre la mere & l'enfant, qui n'eſt pourtant point totale; car quoique les extre-

Le placenta.

Circulation de la mere à l'enfant.

CHAP. XXIII.

mités des vaiſſeaux ſanguins du *placenta* adherent, & s'uniſſent avec celles des vaiſſeaux de la matrice, ce qui pouroit nous induire à croire que la totalité du ſang, qui vient dans le *placenta* par les arteres ombilicales, rentre dans le cœur de la mere, par les veines hypogaſtriques, nous croyons au contraire qu'il n'y en a que la plus petite partie, & que la plus conſiderable rentre dans le fœtus par la veine ombilicale, avec celui qui y vient de nouveau des arteres de la mere. Cela établit une *circulation du ſang*, par les vaiſſeaux ombilicaux, du fœtus au placenta, & du placenta au fœtus. C'eſt pourquoi la veine ombilicale eſt plus groſſe, à proportion, que les deux arteres priſes enſemble, parcequ'il faut que le ſang qui contient le ſuc nouricier, lequel vient tout pur des arteres de la mere, & celui qui vient par le *placenta* des arteres ombilicales, paſſe par le même canal. Cela étant ainſi, on peut dire que dans une femme enceinte il ſe fait deux *circulations du ſang* diſtinctes & differentes, quoique relatives l'une à l'autre: ſavoir celle de la mere, qui ſe fait du centre, qui eſt le cœur, aux extremités, & des extremités au centre; & l'autre du fœtus au placenta, & du placenta au fœtus: ce qui eſt bien different de celle qui ſe

Deux circulations dans une femme groſſe.

fait

fait dans l'homme, ou dans une femme qui n'eſt point enceinte.

Mais voici une autre difference plus conſiderable & plus diſtincte de la *circulation du ſang*, qui ſe fait dans les adultes, d'avec celle qui ſe fait dans le fœtus. La ſyſtole du cœur dans les adultes pouſſe le ſang par l'aorte, ou grande artere, dans toutes les parties du corps, lequel circule, & revient au cœur par la veine cave dans le ventricule droit, & de là dans les poumons qui le pouſſent dans le ventricule gauche, par la veine pulmonaire.

Difference de circulation dans les adulte & dans le fœtus.

Ce ſont les *poumons*, ou plutôt c'eſt l'air lequel agit ſur eux, qui cauſe ce mouvement: ce qui eſt bien different dans le fœtus, parceque les *poumons* ſont ſans action, & affaiſſés comme un morceau de chair, l'air ne pouvant avoir action ſur eux, tandis qu'il eſt renfermé dans le ſein de ſa mere. Ils ne peuvent auſſi en avoir ſur le ſang pour le porter au *cœur*, afin d'exciter ſon mouvement, de ſorte que le *cœur* eſt par conſéquent ſans action. Il n'y a donc que le ſang de la mere qui puiſſe operer ce mouvement. En effet il entre de la veine ombilicale dans le *cœur* du fœtus par ſa veine cave. Il y a une ouverture, ou conduit, par où le ſang paſſe du ventricule droit dans

Les poumons & le cœur ſans action dans le fœtus.

CHAP. XXIII.

dans le ventricule gauche, qui doit se fermer, de même que l'artere qui part du ventricule gauche, auſſi-tôt que les *poumons* de l'enfant entrent en action, pour pouſſer le ſang dans la veine pulmonaire, dans l'oreillette, & dans le ventricule gauche : ce qui arrive dans le moment que l'enfant reçoit l'impreſſion de l'air, en ſortant du ſein de ſa mere.

Flux & route du ſang dans le fœtus.

Il eſt facile de concevoir par tout ce que je viens de dire, que le *ſang* circule dans le fœtus d'un flux égal, parcequ'il eſt filtré par une infinité de vaiſſeaux capillaires, qui abſorbent la pulſation des arteres de la mere ; que les poumons, le cœur & les arteres ſont ſans action ; que le *ſang* a dans le cœur du fœtus une route particuliere, pour paſſer du ventricule droit dans le ventricule gauche, differente de celle des adultes ; & que la cauſe du mouvement du *ſang* vient du cœur de la mere, mais que l'air en eſt toujours le principe, ou la premiere cauſe.

## CHAPITRE XXIV.

### *De la nutrition du fœtus, de ſa ſituation dans la matrice, & de ſes differences d'avec les adultes.*

LE *fœtus* ſe nourit dans la matrice, par le cordon ombilical, du ſang animé des arteres de ſa mere, & par la bouche, de la liqueur glutineuſe qui l'environne, laquelle ſemble ſe ſéparer de l'amnios, mais qui vient immédiatement du reſervoir du chyle de ſa mere. On trouve une ſemblable liqueur dans la bouche, dans l'œſophage, & dans le ventricule du *fœtus*, & des embrions des animaux: ce qui prouve évidemment que cette ſubſtance leur ſert d'aliment; car on obſerve qu'elle eſt changée dans les inteſtins grêles, & dans les gros inteſtins, parcequ'on y trouve des excrémens en aſſez grande quantité. La raiſon pour laquelle on trouve une moindre quantité de cette liqueur dans les derniers mois de la groſſeſſe, que dans les premiers, c'eſt que le *fœtus* la conſomme, & s'en nourit,

Liqueur alimentaire du fœtus.

CHAP. XXIV.

rit, ſur tout dans les jours qui aprochent du terme de l'accouchement, parceque le placenta, qui commence à ſe détacher de la matrice, ne fournit plus la même quantité du ſang qui vient de la mere, néceſſaire pour ſa ſubſiſtance, & qui lui eſt enfin tout à fait retranché, ſur tout quand le placenta eſt entierement détaché, ou qu'il ne tient que très peu à la matrice: ce qui fait que le *fœtus* abſorbe preſque entierement cette liqueur, & qu'il fait des efforts pour ſortir, lorſqu'il ne lui en vient pas aſſez pour le nourir.

Nature de cette liqueur.

Cette liqueur glutineuſe eſt ſi propre pour la nouriture du *fœtus*, qu'on n'en ſauroit ſouhaiter une meilleure, puis qu'elle vient du chyle de ſa mere. C'eſt comme un premier lait, & un aliment proportionné à l'âge tendre & delicat du *fœtus*, & néceſſaire auſſi pour ouvrir & humecter le paſſage de l'œſophage, des inteſtins, des veines lactées, & du canal thorachique, afin d'accoutumer ces parties à leurs fonctions.

Situation du fœtus dans la matrice.

La ſituation, que tient le *fœtus* dans la matrice, eſt preſque de figure ovale. On le trouve, pour ainſi dire, aſſis, aïant la tête inclinée ſur la poitrine, les genoux auprès du menton, & les talons à ſes feſſes.

ſes. Ses mains, pour l'ordinaire, embraſſent preſque ſes pieds. Il a la tête en haut, & la face tournée du coté du dos de ſa mere. D'ailleurs ſa ſituation varie, & eſt incertaine dans les premiers mois ; mais environ vers le neuvieme, la tête qui eſt devenue plus peſante qu'aucune autre partie, tombe ordinairement en bas, dans les mouvemens que ſe donne ſa mere, & qu'il ſe donne auſſi lui-même. Lorſque la nouriture commence à lui manquer, ſes pieds ſe tournent en haut, & ſa face du côté du dos de ſa mere, parceque le pli de ſon corps trouve moins de reſiſtance du côté du ventre, & qu'il eſt dans une poſture plus commode que s'il étoit tourné autrement. Le mouvement qu'il fait pour ſortir, ou pour ſe mettre à ſon aiſe, cauſe des douleurs fréquentes à ſa mere, leſquelles occaſionnent des contractions à la matrice, pour le pouſſer dehors.

Differences entre le fœtus & les adultes.

Les differences les plus notables qu'on obſerve entre le fœtus & les adultes, ſont celles-ci.

Premiere difference.

Premierement dans l'abdomen, les veines & les arteres ombilicales, de même que le canal veineux du foye, ſont percées dans le *fœtus* ; mais dans les adul-

CHAP. XXIV.

adultes ces parties ſont ſolides. Il a le foye fort gros, & ſon apendice du *cæcum* eſt auſſi, pour l'ordinaire, plus gros que dans les adultes. Ses capſules atrabilaires ſont plus groſſes. La ſuperficie de ſes reins eſt inégale comme dans les veaux.

Seconde difference. Glande thymus.

En ſecond lieu dans le thorax, il a la glande de *thymus* plus groſſe que les adultes. Cette glande, dont je n'ai point fait mention, n'eſt proprement deſtinée que pour l'uſage du *fœtus*, & devient inutile aux adultes. Les autres parties, dont je viens de parler, ne ſont auſſi plus groſſes que parcequ'elles ſont des voyes par où le *fœtus* reçoit une bonne partie de la nouriture qui vient de ſa mere. Ses poumons qui n'ont pas encore reſpiré, ſont affaiſſés; & quand on les jette dans un vaſe plein d'eau, ils vont au fond. Ainſi l'artere pulmonaire n'eſt d'aucun uſage, non plus que la veine. Leurs canaux ſont vuides, & n'attendent pour ſe remplir que l'action de l'air, & l'uſage des poumons qui produiſent leur effet, ſi tôt que l'enfant eſt ſorti du ſein de ſa mere, & que l'air a agi ſur eux. Au defaut de l'artere pulmonaire, il ſort d'un trou ovale ſitué entre l'oreillette droite & la gauche du cœur,

Canal arteriel dans le fœtus.

cœur, un *canal arteriel*, entre l'artere pulmonaire & l'aorte, afin que la circulation du ſang ſe faſſe d'une autre maniere que dans les adultes. Auſſi-tôt que l'enfant eſt ſorti, & que l'air a eu action ſur les poumons, ce trou ovale ſe referme. Ce *canal arteriel* devient alors inutile, & n'eſt plus d'aucun uſage, étant coupé, & arrêté au cordon ombilical par la ſage-femme, dès que l'enfant eſt ſorti de ſa priſon, parceque l'artere pulmonaire ſe rempliſſant du ſang que la ſyſtole du cœur pouſſe dans les poumons de l'enfant, leſquels ſe dilatent par l'action de l'air pour le recevoir, les poumons, en ſe contractant, pouſſent ce même ſang dans le ventricule gauche par la veine pulmonaire, qui bouche ce trou ovale, pour continuer ſans intermiſſion ſa circulation. CHAP. XXIV.

Troiſiemement, dans la tête du *fœtus* les os du crâne ſont écartés l'un de l'autre, principalement dans l'endroit de la fontanelle, & ils ſont deſtitués de ſuture. Ses dents ſont encore imparfaites, leur germe étant caché dans les machoires: ſes conduits auditifs ne ſont pas encore parfaits, & ſont fermés par de petites membranes, qui diſparoiſſent après la naiſſance. Les organes de l'ouie ne ſont point encore aſſez animés du principe de vie Troiſieme difference.

CHAP. XXIV.

pour exercer leurs fonctions, de même que les organes de la vue.

Quatrieme difference.

En quatrieme lieu, tous les os, excepté fort peu, ſont imparfaits, & plus mous dans le *fœtus* que dans les adultes. Il y en a quelques-uns qui ſont entierement cartilagineux. Il y a auſſi des articulations imparfaites, & des productions qui manquent, & qui ne viennent qu'avec l'âge.

## CHAPITRE XXV.

*Des differentes productions des arteres ſpermatiques de l'homme & de la femme, & de l'origine de la ſpécification des deux ſexes.*

NOus avons tout lieu de preſumer, & même de croire que les *arteres ſpermatiques* de l'homme, qui ſont deſtinées à produire le principe de la ſemence, ont chacune en leur particulier la propriété de fixer & déterminer les deux ſexes, & de leur influer des qualités differentes. Pour ſe le perſuader, il faut examiner la maniere d'agir de la Nature, la ſtructure de ces arteres, la quantité du ſang qui les remplit, & le ſéjour qu'il y fait.

Propriété des arteres ſpermatiques.

Il eſt conſtant que la Nature eſt, comme ſon auteur, très ſimple dans ſon être, & qu'elle agit ſimplement dans le commencement de ſes premieres productions. Ses inſtrumens & ſa matiere ſont ſimples, ſinguliers comme elle, & ne produiſent qu'une ſeule choſe, une ſeule eſpèce, & un ſexe particulier dans une

Simplicité de la Nature.

CHAP. XXV.

ſeule & ſimple *matrice*, ſoit pour le mâle, ſoit pour la femelle.

Son action dans ces arteres.

Le lieu d'une telle production qui donne l'être aux œufs qui ſont le principe de la ſemence, ne peut être autre que celui que nous aſſignons dans les *arteres ſpermatiques* de l'homme, où la Nature peut agir librement, pour déterminer la matiere à la forme, parcequ'elle a tout ce qui lui convient quant à la matiere. Elle a auſſi le tems, le lieu, la liberté de l'étendue, & la chaleur convenable pour la digeſtion qu'exige la forme complète des œufs ſeminaires. Car ſi nous conſiderons la forme & la ſtructure de ces arteres, nous concevrons aiſément que leur principe, qui eſt dans l'aorte, a un orifice ſi petit, que le ſang qu'elles contiennent, donne à la Nature tout le tems néceſſaire pour achever ſa production, qui ſe termine à former des œufs mâles & femelles. Pendant qu'une petite partie de ce ſang entre, avec le principe de la ſemence, dans les teſticules, elle eſt remplacée, à meſure, par une autre qui y entre de nouveau (ce qui n'eſt pas comparable à la quantité de ſang qui remplit toujours ces arteres) comme un petit ruiſſeau qui entre dans un lac, ou dans un étang, & qui en ſort, ſans que l'on s'aperçoive de la moin-

Leur ſtructure.

moindre agitation. Cela prouve avec évidence la néceſſité de la ſtructure & de l'uſage de ces arteres ; car ſi tout le ſang entroit dans les teſticules pour y former les œufs ſeminaires, ſans que rien ralentît ſa vivacité, & qu'il y fût porté avec la même rapidité que dans les autres arteres, il ſeroit néceſſaire que les *arteres ſpermatiques* euſſent une ſtructure ſemblable à la leur. Mais comme cela n'eſt pas, on doit conclure que le principe de la ſemence ſe forme & ſe ſpécifie dans les *arteres ſpermatiques*, avant que d'entrer dans les teſticules, en conſéquence de leur ſtructure, & de leur difference d'avec les autres arteres, & que dans chacune de ces *arteres ſpermatiques* il ſe forme autant de principes ſeminaires mâles, que de femelles, parceque la Nature qui ne fait rien en vain, & que nous devons conſiderer comme une bonne & équitable mere, doit diſtribuer également ſes dons & ſes faveurs entre les deux ſexes, dans ſa premiere operation, où elle agit ſimplement & librement pour la fin qu'elle ſe propoſe, ſuivant le pouvoir qu'elle a reçu de ſon auteur. Elle ſuit la route que ſa ſageſſe lui a tracée, & dont elle ne s'écarte jamais, à moins qu'il ne ſe rencontre quel-

CHAP. XXV. Raiſons de leur néceſſité.

CHAP. XXV.

que obſtacle dans ſon principe, & dans ſon progrès.

Pourquoi les œufs ne ſe forment point dans les teſticules.

Si les *œufs* ſeminaires ſe formoient dans les teſticules, la Nature n'agiroit plus ſimplement dans la production de ces *œufs*, parceque la ſubſtance des teſticules dont ils ſeroient produits, & qui eſt une production de leurs petites glandes, ſeroit plus compoſée, & n'auroit pas cette ſimplicité premiere de la matiere, que la Nature exige, & que nous ſupoſons dans les arteres ſpermatiques. Il ne ſe trouve pas moins de difficulté en ſupoſant que la ſemence reçoit la ſpécification dans les teſticules; car ſi cela étoit, il faudroit ſupoſer que la ſpécification des *œufs*, & des vers mâles & femelles, ſe feroit pêle-mêle & tout à la fois dans les cavités des teſticules, ou qu'il y auroit des lieux particuliers pour former les mâles, & d'autres deſtinés à former les femelles; car il eſt conſtant que chaque *œuf*, de quelque animal que ſe puiſſe être, eſt ſpécifié au mâle, ou à la femelle, ainſi que l'évidence nous le montre tous les jours dans la production des *œufs* des poules, & des autres oiſeaux. La premiere ſupoſition ne pouroit ſe ſoutenir, parcequ'elle établiroit plutôt une confuſion qu'un ordre; car il n'eſt

n'eſt pas de la ſimplicité & de la maniere d'agir de la Nature, de former dans un même lieu deux choſes differentes en même tems, d'une même ſubſtance compoſée, & déja ſpécifiée & deſtinée à quelque uſage particulier. Ainſi on voit demonſtrativement que cette ſupoſition n'auroit point de fondement ſolide, & par conſéquent qu'elle n'eſt pas recevable. Celle qui établiroit dans les teſticules des lieux particuliers pour la production des *œufs* mâles, & d'autres pour les femelles, répugneroit encore à la ſimplicité de la Nature, par les raiſons que je viens d'alléguer. Car pour la faire valoir, il faudroit demontrer qu'il y a differentes ſubſtances dans la ſtructure des teſticules; mais comme cela n'eſt pas poſſible, ni vrai-ſemblable, nous eſtimons qu'il eſt plus raiſonnable de croire, que ces *œufs* ont reçu leur ſpécification dans les arteres ſpermatiques, plutôt que dans les teſticules, qui ne ſont particulierement deſtinés qu'à perfectionner ces *œufs*, à faire éclore les petits animaux de la ſemence, & à produire la ſubſtance qui leur ſert d'aliment, & de véhicule.

CHAP. XXV.

C'eſt une choſe étonnante que de voir le nombre prodigieux de ces petites créatures ſemblables à de petits *vers*, qui na-

Remarques curieuſes ſur les

CHAP. XXV. vers seminaires.

gent dans le sperme du mâle, de quelque espèce qu'il soit. Ce n'est pas une chose moins curieuse que d'observer leur mouvement languissant, dans les hommes qui sont attaqués d'une maladie venerienne, & de quelle maniere ils recouvrent leur vivacité précédente, à mesure que la maladie s'apaise. Ces animaux sont si petits, que plusieurs milliers ne forment pas un volume égal à un grain de sable, d'où il est aisé de juger que la semence en doit contenir une quantité prodigieuse.

De la copulation à l'égard des chiennes.

Il est impossible d'apercevoir dans les œufs des femmes le moindre principe, ou la moindre trace d'un animal. Ils ont pourtant beaucoup de part dans la generation, ainsi que nous l'avons fait voir; car sans ces œufs il ne se fait point de conception; & même les chiennes sont privées de leur apétit naturel & ordinaire aux parties de la generation, quand on les a coupées, & cela par la raison que j'ai raportée en parlant de la chute des œufs, laquelle occasionne les règles des femmes, puisqu'avant que d'être coupées, la chute de leurs œufs servoit d'aiguillon pour les exciter à l'amour, à quoi elles ne se portoient point dans tout autre tems. L'odeur qui est pro-

produite de la chute des œufs dans celles qui ſont en chaleur, engage les chiens à les ſuivre avec ardeur, & à diſputer à coups de dents à leurs ſemblables l'acte de la copulation. CHAP. XXV.

Le principe des *œufs* de la femme ſe forme auſſi dans ſes *arteres ſpermatiques*, de même que le principe des œufs ſeminaires de l'homme dans les ſiennes. Quoique le principe univerſel n'ait pas encore formé ces *œufs* dans les arteres, les ovaires étant deſtinés à cet effet, le ſang arteriel dans lequel eſt le principe de ces *œufs*, doit avoir été déja en quelque ſorte ſpécifié pour l'un & l'autre ſexe, avant que d'entrer dans les ovaires, non pour la forme, mais pour l'inclination ſeulement, afin de former un principe de difference, qui faſſe éclater la ſageſſe du Créateur dans la diverſité de ſes ouvrages; car la Nature, qui a un pouvoir limité pour la forme qu'il ne lui eſt pas permis de changer, influe au moins dans la matiere informe des inclinations, des propriétés, ou qualités ſemblables à celles que la ſemence reçoit dans les arteres ſpermatiques de l'homme, à cauſe de la reſſemblance de ſtructure, & de la nature de ces parties, parceque la Nature a une même voye, une même inclination,

Principe des œufs des femmes dans leurs arteres ſpermatiques.

Et de la difference dans les inclinations des deux ſexes.

CHAP. XXV.

tion, & une même maniere d'agir, dans les choſes où il y a quelque reſſemblance: de ſorte que ne pouvant former des principes d'*œufs* de vers ſeminaires dans les arteres ſpermatiques de la femme, elle influe à une partie de ſes propres principes d'œufs, des inclinations maſculines, & à l'autre des affections feminines. C'eſt ce qui fait la premiere origine des differences que l'on remarque dans les deux ſexes, & celles que l'on aperçoit dans chaque ſexe en particulier. Le principe de chaque œuf de la femme, dont l'inclination eſt déja déterminée dans l'artere ſpermatique, eſt porté dans l'ovaire de la femme pour s'y former en œufs. Le même ſang animé, qui eſt porté par les autres rameaux de l'artere dans la matrice, & dans les autres parties de la generation, eſt deſtiné à d'autres uſages. Peut-être eſt-ce la perfection que ce ſang a acquiſe dans les arteres ſpermatiques de la femme, qui fait produire à la *matrice* tant d'effets ſi ſurprenans, & qui ont donné lieu à quelques-uns de la regarder comme un animal, dans un autre animal.

Uſage des ovaires.

Il eſt évident par tout ce que j'ai dit, que ce n'eſt pas dans les *ovaires* de

de la femme que l'un & l'autre ſexe reçoit ſa ſpécification, mais que cette prérogative, ou ce privilége apartient à l'homme, ou lui eſt propre, & que la femme ajoûte ſeulement quelque choſe du ſien dans ce qui lui eſt confié. Ces *ovaires* ſont deſtinés principalement à donner la forme aux œufs, & à produire une ſubſtance qui leur ſert de véhicule, & qui occaſionne le plaiſir que la femme reſſent dans l'acte de la copulation. CHAP. XXV.

Le vulgaire ignorant s'imagine que les enfans ſont conçus, & formés dans la matrice de la femme, & il eſt bon de le faire revenir de cette erreur. Qu'il aprenne donc ici que l'enfant eſt déja formé avant qu'il ſoit dans la matrice, parceque la forme a exiſté en puiſſance dans le principe qui a été produit dans les arteres ſpermatiques de l'homme. Il eſt vrai que le fœtus reçoit dans la matrice de la femme l'ame & la forme humaine, & que c'eſt là que toutes ſes parties ſe dévelopent, & ſe perfectionnent. Elle n'eſt néanmoins, malgré tous ſes avantages, qu'une partie inſtrumentale, qui ne pouroit rien produire, ni former d'elle-même, ſans le concours des autres parties : ce qui fait

Erreur du vulgaire ſur la conception & ſur la formation des enfans.

CHAP. XXV.

fait voir qu'il y a dans la Nature, comme dans le gouvernement politique, de grandes choſes qui dépendent des petites, & que la veritable grandeur, ſelon Dieu, a ſon principe & ſon fondement ſur la plus profonde humilité.

Conception de pluſieurs enfans, & formation des faux germes.

La femme conçoit quelquefois dans ſes deux ovaires pluſieurs enfans en même tems. Ses œufs fécondés qui tombent dans la matrice, forment chacun leur placenta. Quelquefois il y a des œufs qui tombent, après que les premiers qui les ont précédés ſont déja attachés, & établis dans la matrice. Pour lors ces derniers s'anéantiſſent, ou forment de faux germes. On a vu des femmes accoucher de deux ou trois enfans, avec un faux germe qui avoit été produit d'un ſemblable principe, & qui avoit donné l'être à un corps informe, par le moyen de quelque partie de la membrane de l'œuf, laquelle s'étoit attachée à la matrice, & avoit fait croître ce corps informe.

Cauſe de la production de deux enfans d'un même œuf.

On a vu auſſi quelquefois naître deux jumeaux attachés enſemble par quelques parties, & d'autres qui n'avoient qu'un corps avec deux têtes. Ces productions qui ne ſont pas de l'intention de la Nature,

re,

re, viennent de ce que deux vers ſeminaires entrent dans un même œuf, & n'ont qu'un même placenta. Le ſéjour qu'ils font dans un même œuf fait qu'ils ſe collent, & qu'ils croiſſent enſemble, comme s'ils n'étoient qu'un même corps, ainſi que deux jeunes arbres qui ſe touchent, & qui croiſſent de la même ſève. Il eſt très rare qu'on voye naître deux enfans avec un ſeul & même placenta : cela n'eſt pas néanmoins ſans exemple.

Idée des Anciens ſur l'exiſtence des œufs.

Il ſemble que les Poetes ont eu cette idée, au ſujet de la production des deux œufs que *Leda* conçut du fait de *Jupiter*, d'où vinrent *Caſtor & Pollux*, *Helene & Clitemneſtre*. Cette idée eſt néanmoins conforme dans un ſens à la Nature, puiſque les femmes ont des œufs, & que la ſemence de l'homme qui les rend féconds, vient de l'air, repreſenté par *Jupiter*.

Cauſe des productions monſtrueuſes.

Tous les corps étrangers, qui ſe forment dans la matrice, tirent leur principe de la mauvaiſe diſpoſition des ovaires de la femme, qui forment des œufs imparfaits. Ces œufs ne peuvent former que des productions monſtrueuſes & contre Nature : ce qui procède ordinairement du mauvais temperament

CHAP. XXV.

perament de la femme. Nous connoissons des moyens certains & efficaces pour les rétablir, & pour rendre la femme féconde, & nous avons sur cela des experiences que l'on ne peut révoquer en doute.

## CHAPITRE XXVI.

### *De l'origine de la difference des reſſemblances, des affections, & des inclinations.*

SI la diverſité, & la multitude infinie des ouvrages du Créateur eſt admirable par leur ſtructure, leurs figures, leurs vertus, leurs propriétés, & leurs uſages, qui caracteriſent en une infinité de manieres, quoique très imparfaitement, ſes attributs divins, & les perfections excellentes de ſa nature, leſquels ſont inſéparables de ſon être; les differences innombrables qui ſe remarquent dans la production des créatures, ne ſont pas moins admirables, parcequ'elles ſont auſſi des productions émanées immédiatement de la divine ſageſſe, & qu'elles font éclater davantage la magnificence des ouvrages du Créateur, afin de nous porter à l'aimer, comme le ſeul & le plus digne objet de notre amour.

La difference qui eſt entre les créatures, digne d'admiration.

La Nature, qui a été la dépoſitaire des vertus, & des dons divins, qu'elle admi-

Inégalité dans la diſpenſa-

CHAP. XXVI. Distribution des dons de la Nature.

administre & distribue, suivant son pouvoir, à des sujets particuliers qu'elle en orne exprès pour manifester leur excellence au dessus des autres, ne partage pas également ses faveurs entre les mineraux, les végétaux, & les animaux qui sont soumis à son empire, ni entre les sujets de chacune de ces trois familles; car il y en a qui sont plus favorisés de ces dons, & de ces diverses variétés, que les autres, à proportion de leur excellence.

Exemple des mineraux. Les marbres.

Par exemple, dans les *mineraux*, tout ce qui est pétrifié n'a pas reçu de la Nature la variété des couleurs qu'on remarque dans les *marbres*, qui paroissent être d'une même nature, par la dureté, la compacité, & l'incorruptibilité. Cette difference, & la variété de leurs couleurs ne peuvent venir que de la terre, qui a des propriétés particulieres dans les lieux où ils se produisent, lesquelles, sans changer la nature de la matiere, l'ornent par la variété des diverses couleurs qui se remarquent dans certaines espèces, & qui sont differentes dans d'autres.

Les pierres précieuses.

La variété & l'éclat des couleurs que l'on admire dans les *pierres précieuses*, viennent aussi de la qualité de la terre dans laquelle elles se produisent. Il y en a qui sont diaphanes, & transparentes, tels

tels que ſont le rubis, le diamant, le ſaphir, l'émeraude; d'autres qui ſont opaques, comme la turquoiſe; d'autres qui ont des couleurs mêlées, comme l'agate, & enfin d'autres qui ont des propriétés & des vertus; comme l'aimant. CHAP. XXVI.

Toutes les *matrices* métalliques ne produiſent pas l'*or* & l'*argent*, quoique leurs principes ſoient les mêmes que ceux qui donnent l'être aux métaux imparfaits. Néanmoins ces principes ne tendent qu'à leur donner la perfection de l'*or*, & de l'*argent*. Il n'y a donc que la terre dans laquelle ils ſe forment, & la coction, qui en font la difference. L'*or* & l'*argent*, qui ſont formés de mercure, ne tiennent leur perfection que de la pureté de leurs principes, de la terre, & de la digeſtion qu'ils reçoivent, leſquelles les rendent tels qu'ils ſont; la Nature ne leur aïant donné, par preference aux autres, des qualités ſi éminentes, que pour les diſtinguer des imparfaits, & pour les faire eſtimer davantage, non ſeulement à cauſe de leur propre excellence, mais auſſi par raport au bon uſage que nous en devons faire, pour la fin que Dieu s'eſt propoſée en les créant, tout autre uſage ne pouvant être conſideré que comme profane, & criminel. L'or & l'argent.

CHAP. XXVI.

nel. Tous ces excellens ſujets que la Nature produit dans le règne mineral pour notre utilité, publient la gloire & la magnificence de ſon auteur.

Exemple des végétaux.

Si les *végétaux* n'expriment pas, comme les pierres précieuſes & les métaux parfaits, la beauté, la pureté, la conſtance, l'incorruptibilité, & l'immortalité des corps glorieux, ou des créatures parfaites qui ſont ſorties des mains de Dieu, au moment de leur création, ils ont au moins une maniere de s'énoncer, dans les louanges qu'ils publient ſur la magnificence du Créateur, leſquelles ſe font entendre d'une façon plus énergique, ſur ſon immenſité, ſa bonté, & ſa providence. Ils ornent la face de la terre en mille manieres, par la diverſité infinie de leurs productions. Ils ſont des êtres vivans, qui ſe multiplient à l'infini, & qui fourniſſent aux animaux des alimens, & les commodités néceſſaires à leur vie, & à leur entretien. Le principe des differences s'exprime en une infinité de manieres dans leur figure, dans leur nature, & dans la variété de leurs odeurs, de leurs goûts, & de leurs couleurs. Les differentes qualités de la terre contribuent beaucoup à cette variété.

Les fleurs & les fruits.

Quelquefois l'art ajoûte des perfections aux *fleurs* & aux *fruits*, que la Natu-

Nature ne leur peut donner seule, comme l'experience nous le montre dans la culture des plus belles *fleurs*, qui de simples deviennent doubles, d'une figure charmante, & d'une beauté variée des plus vives & des plus singulieres couleurs ; ainsi que dans celle des *fruits*, qui ont des goûts exquis, que la Nature ne leur donne point, à moins que l'art ne soit de la partie. Les differentes qualités des terres, & des climats, font les differentes qualités des *fleurs* & des *fruits*, & même celle des figures, des couleurs, & des temperamens des animaux, & des hommes.

Les animaux plus parfaits que les végétaux & les mineraux.

Les *animaux* sont des êtres plus parfaits que les végétaux, & les mineraux, & semblent rassembler dans leur nature en general tout ce qu'il y a de plus excellent dans ces deux autres espèces d'êtres ; ce qui doit particulierement s'entendre de l'homme. C'est la créature la plus parfaite, puisqu'elle a été créée à l'image de Dieu. On remarque dans les *animaux* la variété des differences, qui se manifeste en une infinité de manieres: mais la sagesse du Créateur éclate infiniment davantage dans l'homme que dans tous les autres *animaux* ; car tous les hommes étant sortis *d'Adam*, & d'*Eve*, il est étonnant, & admirable en même tems,

Excellence de l'homme.

CHAP. XXVI. De la difference des couleurs de chaque individu.

que l'on voye tant de difference entr'eux. L'origine des couleurs doit tirer ſon principe du premier homme, & de la premiere femme. Le péché y a ſans doute ajouté des imperfections; mais le fond, ou le principe a toujours ſubſiſté: car ſi nous ſupoſons qu'*Adam* a été créé avec des cheveux noirs, & friſés pour l'ornement de ſon viſage, avec un teint brun, pour caracteriſer en lui la nature maſculine, & la couleur de la matiere dont il avoit été formé; & que nous ſupoſions auſſi qu'*Eve* avoit de longs cheveux, & du plus beau blond, un teint très blanc, rehauſſé ſur les joues & les lèvres du plus vif éclat des roſes, ce qui caracteriſoit ſon ſexe, & le diſtinguoit de l'homme par la couleur de ſa chair & de ſes os, dont elle avoit été formée; il ne ſera pas difficile, après ces ſupoſitions qui paroiſſent avoir quelque aparence de verité, de concevoir que ces couleurs ſi differentes ont produit, par leur mêlange, dans leurs deſcendans, toutes les differentes couleurs que nous voyons dans les hommes, & dans les femmes. Cette difference a été ſans doute produite de la maniere, & par les principes que nous allons expliquer.

Origine de celles

Les *Aſiatiques* & les *Européens* ſont blancs,

blancs, avec des cheveux de diverſes nuances; les *Africains* noirs, & les *Ameriquains* ni blancs, ni noirs, mais ſans poils. Cette difference ne peut venir que des trois enfans de *Noé*, qui étoient de figure, de couleur, & de temperament differens, leſquels ils ont communiqués & tranſmis à leur poſterité: ce qui eſt la premiere cauſe de la difference que l'on remarque entre les peuples de l'*Aſie*, de l'*Europe*, de l'*Afrique*, & de l'*Amerique*. *Cham* étant d'un temperament chaud, d'un poil noir & très friſé, & d'un teint fort brun, de même que ſa femme, peupla, ainſi qu'il eſt marqué par le texte ſacré, l'*Afrique*, dont le climat qui eſt d'une nature extrêmement chaude, ajouta à ſes premiers peuples des qualités conformes à leur nature, ce qui les rendit tout à fait noirs. *Sem* & *Japhet*, qui ont peuplé l'*Aſie* & l'*Europe*, pouvoient être blonds, & noirs de poil, bruns, & blancs de teint. Ils ont produit des hommes conformes à leur figure, à leurs couleurs, & à leur temperament. Il s'en eſt formé d'autres qui tenoient des deux, & même des trois enfans de *Noé*, par leurs alliances: ce qui a fait la variété des couleurs, & la difference infinie des figures, & des temperamens qui ſe remar-

CHAP. XXVI. des Aſiatiques, des Européens, des Africains & des Ameriquains.

CHAP. XXVI.

quent dans leur posterité. Les *Ameriquains*, qui sont bruns de teint, qui ont peu de cheveux, lesquels sont noirs & frisés, & qui sont sans poil, tirent, suivant toutes les aparences, leur origine des premiers enfans de *Cham*, par les alliances qu'ils ont contractées avec les enfans de *Sem* & de *Japhet*, qui étoient blancs & bruns.

Causes generales de la difference entre les hommes.

Il est d'ailleurs constant que la nature de la terre, la qualité de ses fruits, & la difference des climats, ont contribué à la variété des couleurs, & à la diversité des figures & des temperamens de tous les hommes, & cela par la volonté du Créateur, qui a jugé à propos de diversifier ses plus excellens ouvrages, sur le fondement des principes que sa divine sagesse avoit établis dans le premier homme, & dans la premiere femme.

Causes particulieres de cette difference.

Il sera facile, sur ces principes, de concevoir pourquoi *Esaü*, & *Jacob*, jumeaux, étoient si differens, quoiqu'engendrés d'un même pere & d'une même mere, & pourquoi entre plusieurs enfans d'un même pere & d'une même mere, il se trouve tant de difference dans les couleurs, les figures, les temperamens, les affections, & les inclinations. Car si la terre, ses fruits, & son climat, contribuent en quelque chose à la varié-

té

té des couleurs, des figures, & des temperamens que l'on remarque dans les hommes, la ſemence doit recevoir, à proportion, des impreſſions plus fortes dans les lieux où elle ſe forme, où elle ſe perfectionne, & où elle produit ſon fruit, non ſeulement par raport aux corps, mais auſſi à l'égard des facultés, & des paſſions de l'ame : ce qui occaſionnera des differences plus conſiderables. Or ces lieux ſont les arteres ſpermatiques, & les teſticules de l'homme ; les ovaires de la femme, où nous ſupoſons que les œufs ne ſe forment qu'après avoir été déja inclinés à l'un, ou à l'autre ſexe, dans les arteres ſpermatiques, où a été leur principe ; & enfin la matrice où ils tombent, & dans laquelle la ſemence prend la forme humaine. CHAP. XXVI.

Mais comme il y a deux arteres ſpermatiques & deux teſticules dans l'homme, deux arteres ſpermatiques & deux ovaires, ou teſticules, dans la femme, avec une ſeule matrice pour la production d'un même fruit, nous ne voyons pas que cette duplicité eût été abſolument néceſſaire, ſi l'auteur de la Nature n'avoit eu en vue que de lui faire produire des hommes & des femmes ſemblables à *Adam*, & à *Eve*, parceque dans chaque artere ſper- Remarques ſur la duplicité des parties de la generation.

CHAP. XXVI.

matique de l'homme, il se forme également des principes seminaires mâles & femelles, de même qu'il se forme également des principes d'œufs dans les arteres spermatiques de la femme; d'où il resulte qu'une seule artere spermatique, & un seul testicule dans l'homme, & autant dans la femme, auroient eu le même effet pour produire des hommes, & des femmes, semblables à *Adam* & à *Eve*. Mais comme on remarque dans leur posterité des differences notables & infinies, en sorte qu'il ne se rencontre point dans les hommes, & dans les femmes, une si parfaite ressemblance à l'égard de leurs figures, de leurs temperamens, de leurs affections, & de leurs inclinations, qu'il ne s'y trouve quelque petite difference, qui ne peut venir que d'un principe interne, & non de quelque cause externe que se puisse être; nous concluons par conséquent, qu'il y a des causes particulieres qui produisent ces differences. Ces causes ne peuvent être que la duplicité des parties de la generation, lesquelles sont non seulement destinées, dans les deux sexes, à la production des fruits de leur espèce, mais encore à les diversifier en une infinité de manieres, dans les lieux où ils se produisent & se forment,

ment, & qui ont reçu du Créateur, chacun en leur particulier, des vertus ſingulieres, pour influer à ces fruits des qualités qui les rendent differens les uns des autres. La combinaiſon, & le mêlange de ces diverſes vertus & propriétés des parties de la generation, qui ont influé ſur tous les ſujets qu'elles ont produits, ont été les cauſes, ou l'origine des differences infinies que l'on remarque dans la nature humaine, & que l'on n'aperçoit point dans les autres eſpèces d'animaux.

Le côté droit plus privilégié que le gauche.

Pour concevoir que cela ſe fait d'une maniere très naturelle, il faut croire, ou ſupoſer, ſi l'on veut, que les parties de la generation qui ſont ſituées du côté droit, ont reçu du Créateur des propriétés particulieres, & plus excellentes que celles qui ſont ſituées du côté gauche; & que ces premieres ont été deſtinées à influer des inclinations ſur la ſubſtance ſpirituelle, pour déterminer les puiſſances de l'ame vers le ſouverain bien, dans le fruit qu'elles doivent produire, & d'autres ſur la matiere, pour incliner les affections du cœur à l'uſage des moyens qui pouvoient procurer à l'ame le ſouverain bien. Mais comme ces propriétés des parties de la generation ont été

CHAP. XXVI.

beaucoup dégradées de leur premiere excellence, par le péché qui a répandu des tenèbres sur l'esprit, & de la corruption dans le cœur, l'ame ne pouvoit donc plus, dans l'état present, se procurer ce souverain bien que par un secours surnaturel, la Nature corrompue la rendant impuissante pour le bien, & puissante pour le mal, à cause que l'esprit se trouve soumis à la chair, au lieu qu'avant le péché la chair étoit soumise à l'esprit. Néanmoins ces inclinations de l'ame & du cœur subsistent toujours pour la même fin, comme elles ont commencé ; mais elles sont très foibles, en comparaison de ce qu'elles étoient avant la chute de nos premiers parens.

Principes qui peuvent rendre l'homme parfait dans sa nature.

Sur ce principe établi, si un ver mâle a eu son principe dans l'artere spermatique droite, & qu'il soit entré dans l'œuf de l'ovaire du même côté, qui aura eu son principe mâle dans l'artere spermatique droite de la femme, il aura par conséquent reçu des inclinations masculines propres à son sexe, lesquelles lui auront été influées dans tous les lieux où il aura été formé, & où il aura passé : & si la femme qui l'aura conçu, a reçu son être de la même maniere dans les lieux convenables à son sexe, il est évident que l'en-

l'enfant qui en viendra, aura toutes les bonnes & grandes qualités propres à ſon ſexe, & dans un dégré éminent. Ainſi il ſera bon, genereux, brave, prudent, magnanime, conſtant, patient, robuſte, complaiſant, honnête, moderé, chaſte, pieux, intègre, d'un eſprit & d'un genie ſuperieur, propre à entreprendre, à exécuter, & à ſe faire obéir de ſes inferieurs: enfin il ſera d'un poil & d'une couleur mâles, & d'une taille avantageuſe & bien proportionnée.

Et la femme dans la ſienne.

De même, ſi un ver femelle, qui aura eu ſon principe dans l'artere ſpermatique droite, entre dans un œuf femelle de l'ovaire du même côté, la femme, qui en viendra, aura toutes les belles & bonnes qualités propres à ſon ſexe. Elle ſera ſage, vertueuſe, ſincere, docile, douce, complaiſante, fidelle, modeſte, conſtante dans la pratique du bien, patiente dans le mal, prudente & circonſpecte dans ſes actions, & dans ſes demarches, diſcrète dans ſes paroles, & moderée dans ſes plaiſirs. Elle ſera d'une taille charmante, d'un maintien reſpectable, d'une beauté parfaite, d'un poil blond, & d'un teint de lis & de roſes. Elle aura enfin toutes les qualités attribuées à la femme forte, pour procurer le bonheur d'un époux,

CHAP. XXVI.

la paix dans ſa famille, la bonne éducation des enfans, & enfin le bon exemple : de ſorte qu'elle ſera la gloire de Dieu, & l'honneur de ſon ſexe.

Principes qui donnent les bonnes qualités des deux ſexes à l'homme.

Si un ver mâle, qui a eu ſon principe dans l'artere ſpermatique droite, entre dans un œuf femelle du même côté, l'homme qui en viendra, aura les bonnes qualités qui ſe remarquent dans les deux ſexes, & des couleurs qui tiendront de l'un & de l'autre. Mais ces bonnes qualités ne ſeront pas dans un dégré ſi éminent; car ce qui eſt compoſé de deux choſes differentes de ſexe, quoique parfaites en leur nature, n'eſt jamais ſi parfait que ce qui eſt ſimple, & d'une même nature de principe.

Et à la femme.

Les mêmes qualités dans un même dégré ſe trouveront dans une femme qui aura eu pour principe un ver femelle du côté droit, & un œuf mâle du même côté, pourvu que les meres qui concevront les enfans avec de tels principes, tiennent leur origine & leur être de principes ſemblables à ceux des peres ; car s'il y avoit de la difference dans l'origine des uns, ou des autres, il y en auroit auſſi dans leurs enfans, de même que les qualités differentes de la terre ſe font remarquer dans les qualités differentes de ſes fruits.

On

CHAP. XXVI.

Cauſe de la difference entre les peres & meres, & leurs enfans.

On voit quelquefois des enfans très beaux & bien faits, naître de peres & de meres laids, & contrefaits, comme auſſi des enfans pieux, ſages & ſpirituels, naître de peres & de meres dereglés, & ſtupides. Cela vient de ce que ces enfans ont été produits de principes qui ont eu leur origine du côté droit des parties de la generation. On voit au contraire des enfans laids & contrefaits, & d'autres qui ſont vicieux, dereglés, & ſtupides, naître de peres & de meres beaux, bien faits, ſages, vertueux & ſpirituels: ce qui vient de ce que ces enfans ont eu leur principe du côté gauche des parties de la generation. Les peres & meres ajoûtent à ceux-ci, dans les principes qui leur donnent l'être, ce qu'ils ont de mauvais dans leur nature, & dans leurs affections, & non ce qu'ils ont de bon; & aux autres qui viennent du côté droit, ce qu'ils ont de bon, & non ce qu'ils ont de mauvais. Ceci a du raport au proverbe cité par *Jeſus Chriſt* même, qu'*un mauvais arbre ne peut porter de bon fruit, ni un bon arbre de mauvais.* Au reſte cela doit s'entendre principalement des parties de la generation, & non des peres, & des meres; car on a vu des peres & meres très vertueux, avoir

des

CHAP. XXVI.

des enfans impies & libertins, & des peres & meres deréglés, avoir des enfans très raiſonnables. Il y a ſur cela des exemples très fameux dans l'hiſtoire des Rois de *Juda*. L'inclination des enfans, qui les porte au mal, ne les peut excuſer, parcequ'il ne leur eſt pas impoſſible de ſe corriger, & de réprimer leur mauvais panchant, puiſque *Socrate* même, qui étoit l'homme le plus ſage de ſon ſiècle, a avoué qu'il ſentoit en lui des inclinations très puiſſantes qui le portoient au vice, leſquelles il avoit ſçu réprimer par le ſecours de la philoſophie. Mais les ſecours ſurnaturels de la grace que l'on peut acquerir, ſont infiniment plus puiſſans pour nous faire éviter le mal, & pratiquer le bien: ce qui rendra inexcuſables ceux même qui auront eu les inclinations les plus vicieuſes, & qui n'auront pas voulu faire uſage des moyens qui étoient à leur diſpoſition, pour s'en corriger, ou les réprimer.

Moyens pour la correction des vices.

Premiere ſource du mal.

Toutes les imperfections, & les inclinations mauvaiſes du genre humain, qui ont été, & qui ſeront la ſource du mal, dont le péché eſt la premiere cauſe, tirent leurs effets des principes qui ſont dans les parties de la generation de l'homme, & de la femme, ſituées du côté

té gauche, parcequ'elles influent sur la matiere qui détermine les affections du cœur, après quoi celles-ci déterminent les passions de l'ame vers les objets sensibles, & materiels: ce qui produit le mal qui apartient, & qui est propre à notre nature corrompue; de sorte que si la semence mâle du côté droit de l'homme, féconde un œuf mâle de l'ovaire gauche de la femme, quoique cette semence soit bonne dans son principe, elle recevra néanmoins des impressions mauvaises, qui dégraderont le fruit qui en viendra, lequel participera de ce qu'il y aura de bon dans un sexe, & de ce qu'il y aura de mauvais dans l'autre; avec cette difference pourtant qu'il y aura plus de bonté que de malice, parceque le principe seminaire dominera toujours. Mais lorsque le principe seminaire viendra du côté gauche, & qu'il s'insinuera dans un œuf du côté droit, il y aura par la même raison plus de malice que de bonté. Si le principe seminaire vient du côté gauche, & qu'il féconde un œuf de son sexe du même côté, la malice sera à son comble. Si le principe est mâle, & que l'œuf soit d'un principe femelle, l'homme qui en viendra, aura toutes les imperfections

Détail des premieres causes des differens dégrés de bonté & de malice.

CHAP. XXVI.

fections des deux ſexes. Si au contraire le principe ſeminaire eſt femelle, & que l'œuf ſoit mâle, la femme qui en viendra, aura de même toutes les imperfections des deux ſexes. La matrice de la femme ajoûte auſſi, ou diminue quelque choſe de ſa part, ſur le fruit qui prend en elle la forme humaine, dans les impreſſions que la ſemence a déja reçues. Il eſt donc conſtant par tout ce que je viens d'établir, que toutes les diverſes impreſſions des parties de la generation de l'homme, & de la femme, jointes à celles de la matrice, produiſent des differences dans les fruits, c'eſt à dire dans les hommes, & dans les femmes qui en viennent.

Autres cauſes de ces differences.

En ſupoſant les mêmes principes, & les mêmes effets dans tous les hommes, & dans toutes les femmes, il ſera facile de concevoir, que leurs alliances & leurs mêlanges produiront des differences infinies, non ſeulement dans les paſſions de l'ame, & dans les affections du cœur, mais encore dans les figures, les couleurs, & les temperamens. L'éducation, la nouriture, le climat, & même les influences celeſtes, peuvent ajouter ou diminuer le bien, ou le mal: ce qui n'ôte point à l'homme

la

la liberté du choix de l'un ou de l'autre, lequel eſt à ſa diſpoſition. On peut tirer ſur ce ſujet bien des conſéquences, ſur les differences infinies que l'on remarque dans les hommes & dans les femmes, & dans les enfans d'un même pere & d'une même mere. CHAP. XXVI.

## CHAPITRE XXVII.

### *Idée generale de la lymphe.*

J'Ai parlé de la *lymphe* en plusieurs endroits de ce Traité, ſans parler de ſon principe, de ſa nature, & de ſon uſage, m'étant reſervé de le faire ici, afin de donner une explication plus étendue, & plus conforme aux principes que j'ai établis, & aux effets qu'elle produit dans le corps humain.

Definition & utilité de la lymphe.

La *lymphe*, à proprement parler, eſt l'élement de l'eau, le principe mercurial, & la ſubſtance ſimple dans laquelle s'inſinue le principe ſulphureux, & le principe ſalin. Elle eſt dans le corps animal leur véhicule, ainſi que celui de la ſemence primitive, du ſang, & des humeurs. Elle eſt le domicile de l'ame, & ſon principal inſtrument dans les parties deſtinées aux mouvemens volontaires. L'élement de l'eau, dans ſa ſimplicité, entre dans la compoſition & la production de tous les Mixtes des trois familles de la Nature. Sans cet élement rien ne

ſe

se fait : c'est le principal instrument de l'archée, & le moyen par lequel il spécifie la semence primitive dans chaque sujet. Il devient, avec le concours des autres élemens, le véhicule cahotique qui constitue l'espèce. Il est reconnu pour lors par les Philosophes sous la nature & le nom de *mercure*, par la qualité chaude & humide qu'il a acquise, & qu'il n'avoit pas dans sa nature indéterminée dans les mineraux. C'est ce qu'on apelle *humidité mercuriale*, laquelle fait fluer les métaux & les pierres les plus dures dans le feu. On l'apelle *sève* dans les végétaux, & dans les animaux *lymphe*. C'est donc à ce dernier terme que je m'arrête, mon dessein étant de traiter de la *lymphe*, de son principe, de sa nature, de son usage, & de son évacuation superflue du corps de l'homme que j'ai pour objet, parcequ'il est comme le modele de la création de tous les autres animaux, surtout en ce qui regarde la disposition, l'ordre, l'harmonie interieure de leurs parties, & le mouvement de leurs fluides; car elles ont beaucoup plus de raport avec les parties interieures de l'homme, qu'il n'y en a dans ce qui paroît à l'exterieur, & qui fait voir la difference de leur espèce.

CHAP. XXVII.

Ses differens noms suivant ses diverses natures.

CHAP. XXVII. Effets de la lymphe.

La *lymphe* fait dans le corps de l'homme ce que fait l'eau dans la région élementaire, ou dans le globe de la terre. Elle donne la fluidité au ſang, & contribue à le faire circuler dans les arteres, & dans les veines. Elle dilate ſes globules dans les muſcles deſtinés aux mouvemens volontaires, quand l'ame le requiert. Elle fait auſſi fluer les humeurs, & penètre le corps par une infinité de vaiſſeaux capillaires, pour l'humecter, le rafraichir dans toutes ſes parties, & faciliter les fonctions organiques néceſſaires à leur mouvement. Elle contribue de toutes manieres à la vie du corps, & y entretient l'équilibre dans les élemens dont il eſt compoſé. Elle tempere & réprime le feu, & la trop grande vivacité de la bile. Elle émouſſe la pointe des ſels trop acides, qu'elle diſſout. Elle amolit ce qui eſt dur, qu'elle penètre. Elle endurcit ce qui eſt mou, en ſe retirant. Elle aide à la digeſtion. Elle eſt comme un moyen qui unit les contraires, & qui produit la paix entre les ennemis, en réuniſſant les diverſes ſubſtances des alimens en une ſeule, qui conſtitue l'eſſence du corps humain, pour ſa vie, ſon entretien, & ſa fécondité. En voilà aſſez pour l'idée generale

le que nous nous ſommes propoſé de donner de la *lymphe*. Entrons à preſent dans un détail plus grand, plus ſenſible, & plus circonſtancié de ce qu'elle eſt par ſa nature, & par ſes effets, en commençant par ſon origine. CHAP. XXVII.

## CHAPITRE XXVIII.

### *De l'origine de la lymphe; de ſon excellence & de ſes propriétés.*

La lymphe mal expliquée juſqu'ici.

TOus les Anatomiſtes anciens, & modernes, ont parlé de la *lymphe*, aïant trouvé dans preſque toutes les parties du corps de l'homme, & de quelques animaux, des vaiſſeaux lymphatiques qui communiquoient aux viſceres, & aux glandes, & qui s'inſinuoient dans diverſes parties du corps, où leur petiteſſe n'étoit pas perceptible; mais ſans avoir donné aucune notion certaine, & qui pût ſatisfaire, ſur l'origine & l'uſage de cette *lymphe*. Je tâcherai donc d'en donner ici l'explication, & de la rendre autant ſenſible qu'il me ſera poſſible, afin de pouvoir tirer des conſéquences qui puiſſent être de quelque utilité.

Son excellence.

Si les diverſes propriétés que j'attribue à la *lymphe*, ſont telles que je viens de les décrire, nous devons ſans doute concevoir une haute idée de ſon origine & de ſon excellence, & la conſiderer com-

comme la plus ſimple, la plus ſubtile, la plus parfaite ſubſtance du corps humain, & la plus proche de l'ame par ſa nature ſimple & ſpirituelle, ne pouvant y en avoir d'autre avec laquelle elle puiſſe mieux s'unir, & lier commerce. Mais comme nous ne pouvons juger de l'excellence des principes, que par l'excellence de leur production, & qu'ils ſont d'autant plus cachés à nos ſens & à notre entendement, qu'ils ſont plus ſimples & plus parfaits, ce qui multiplie la difficulté, & nous empêche de les bien connoître, cela eſt cauſe que les effets de la *lymphe* ont été juſqu'à preſent inconnus, & à plus forte raiſon leur principe. Il faut néanmoins, puiſqu'il eſt important de les connoître, eſſayer de les découvrir, & d'expliquer leurs productions & leurs effets. CHAP. XXVIII.

Pour y parvenir, on doit avoir des vues élevées & profondes, & ne pas ramper ſur la terre comme des reptiles, ſans la penétrer juſqu'à ſon centre. Il ne faut pas s'arrêter, comme des corbeaux, ſur des cadavres privés de vie, & de ſentiment, ſans penſer qu'il y a quelque choſe qui nous environne, en qui reſide le principe de la vie, & dont l'origine eſt toute celeſte. Ce principe eſt cet eſprit univerſel, qui ſe revèt de toutes les formes, Diſpoſitions néceſſaires pour la connoître.

CHAP. XXVIII.

à qui les Anciens ont donné divers noms, & qu'ils ont repreſenté ſous diverſes figures. Mais comme nous croyons l'avoir ſuffiſament expliqué, dans quelques Chapitres de ce Traité, nous nous diſpenſerons d'en dire ici davantage. Il y a un autre principe dans le centre de chaque partie de la matiere, qui eſt entré dans la compoſition du corps de l'homme, dont nous avons auſſi fait mention, & qui eſt de même nature que le premier, avec cette difference néanmoins, que celui qui eſt dans le centre, eſt déterminé & ſpécifié, & que l'autre eſt libre & indéterminé. Mais comme ce qui doit être plus ſimple, & plus parfait, exige de la Nature plus d'operations que ce qui eſt moins parfait, & plus compoſé, c'eſt pour cela que la *lymphe*, qui eſt très ſimple, & plus parfaite qu'aucune autre ſubſtance, n'a reçu ſon être, & ſa perfection, qu'après beaucoup de digeſtions dans diverſes parties, afin que le principe univerſel, qui eſt ſpécifié dans chaque partie de la matiere, puiſſe être dégagé de ſes liens, par ſon ſemblable, qui prend diverſes formes, avant que de s'unir intimement à lui, pour former enſemble une ſubſtance très ſimple, qui eſt la *lymphe*.

Comment elle reçoit ſa perfection.

Si

CHAP. XXVIII.

Erreur où l'on eſt au ſujet de la lymphe.

Si je ſuivois l'opinion commune, & que l'on a eue juſqu'à preſent ſur le lieu où la *lymphe* ſe produit, & reçoit ſon être, je pourois me fixer à la premiere digeſtion, qui ſe fait dans l'eſtomac, des alimens & des liqueurs qui y entrent. On veut que ce ſoit là que la *lymphe* ſe ſépare du chyle qui ſe forme dans ce viſcere, & on prétend que c'eſt la même qui ſe ſépare des glandes; ſans ſupoſer les changemens que nous jugeons néceſſaires pour ſa perfection. Mais comme cette digeſtion n'a pour fin que la diſſolution des alimens, où ſe termine ſon pouvoir, qui eſt une premiere operation de la Nature dans le corps animal, laquelle ſe fait par des cauſes éloignées & prochaines, pour diſpoſer les diverſes ſubſtances des alimens à former le chyle, je ne ferois, en expliquant ces cauſes, que répéter ce que j'ai déja expliqué ailleurs. Il ne s'agit donc pas de cela à preſent, mais d'aprofondir la matiere, pour connoître la nature de la *lymphe*, le lieu où elle reçoit ſa perfection, & ſon uſage qu'il eſt important d'expliquer, & que l'on doit connoître, auſſi-bien que les cauſes éloignées & prochaines.

La lymphe, ſource de la per-

La *lymphe* ne reçoit point ſon être du chyle, en quelque lieu qu'il ſe trouve, parcequ'il eſt une ſubſtance imparfaite,

CHAP. XXVIII.

fection du chyle.

à l'égard du ſang, & qu'il n'a de perfection qu'autant qu'il lui en faut pour être tel, & pour devenir ſang. Encore ne l'a-t-il reçue que de la *lymphe*, dans les glandes du meſentere, & dans ſon reſervoir où il a paſſé, avant que d'être changé en ſang. Le ſang même des arteres, tout parfait qu'il eſt, ne doit être néanmoins conſideré que comme une ſubſtance imparfaite, à l'égard de la *lymphe*, puiſque, quelque dégré de perfection qu'il ait acquis dans les poumons, & dans les ventricules du cœur, il n'eſt toujours qu'une ſubſtance deſtinée à fournir aux glandes la nouriture néceſſaire, pour former & produire la ſubſtance de la *lymphe*; & par conſéquent les glandes du meſentere ſont les lieux où la *lymphe* reçoit ſon être, & ſa perfection: d'où il faut conclure qu'elle eſt la plus excellente & la plus parfaite de toutes les autres ſubſtances du corps humain, parcequ'elle eſt parvenue au dernier terme de la perfection, & que les autres ſont encore dans le chemin pour y arriver. Elle eſt, dans cet état de perfection, le domicile & le véhicule de l'ame, ſon principal inſtrument dans les fonctions organiques des parties deſtinées aux mouvemens volontaires. Elle eſt le lien qui attache & unit l'ame au corps, parcequ'elle eſt une

En quel endroit elle reçoit ſon être.

ſub-

CHAP. XXVIII.

ſubſtance ſimple, & unique comme elle, par ſa ſubtilité qui eſt toute ſpirituelle, quoiqu'elle ſoit matiere. Elle penètre, & occupe le corps dans toutes ſes parties. Elle communique de ſa perfection, & de ſa ſimplicité, à ce qui ne l'a pas: c'eſt pourquoi elle ſe mêle dans la production de toutes les ſubſtances, & ſurtout dans celles qui ſont deſtinées à former le chyle, qu'elle achève de perfectioner dans les glandes du meſentere, afin de le diſpoſer à prendre la couleur, & la nature de ſang dans les veines.

CHAPI-

## CHAPITRE XXIX.

*De quelques effets remarquables & ſinguliers de la lymphe; de la tranſpiration naturelle, ou forcée, de ſon humeur ſuperflue par les pores de la peau.*

Néceſſité indiſpenſable de la lymphe.

LA *lymphe* eſt ſi univerſellement néceſſaire qu'aucune partie du corps humain ne s'en peut paſſer, & ne peut être formée, ni exiſter réellement ſans elle, puiſqu'elle eſt le véhicule de toutes choſes, le premier moyen, & le principal inſtrument que le mouvement remue, pour réduire en acte la puiſſance de la ſemence, ſans lequel elle ne peut rien produire. J'ajouterai néanmoins à ce que j'ai dit de la ſubtilité de la *lymphe*, qu'elle paſſe dans la cavité des fibres des muſcles: elle s'étend dans leurs tuniques pour les faire agir, lorſque le cas le requiert, & ſe fait jour à travers les membranes les plus ſerrées.

Son uſage.

Sa ſubſtance la plus ſpiritueuſe penètre les cartilages, & même les os les plus durs

durs qu'elle vivifie, & qu'elle rétablit dans leurs luxations, ou fractures, & elle ſépare les parties qui ſont offencées. Elle humecte & rafraichit les parties organiques, & les jointures des os, pour faciliter leurs fonctions, & pour les entretenir en bon état. Elle ouvre la cavité de ces plus petits vaiſſeaux, pour en faire des arteres capillaires, & enſuite de groſſes branches d'arteres dans les parties obſtruées, ou quand les membres ſont rétranchés. CHAP. XXIX.

Il y a une infinité de vaiſſeaux lymphatiques qui ont leur origine dans les veines, & qui ſont d'une petiteſſe extrême, où les globules du ſang ne peuvent paſſer. C'eſt par ces vaiſſeaux que le ſuperflu de la *lymphe* tranſpire, par les pores de la peau où eſt leur ſortie: ce qui produit la ſueur. Cette ſueur eſt excitée, ou produite par quelque cauſe externe, ou interne, qui prédomine ſur la chaleur naturelle: ce qui rend la ſueur plus ou moins abondante, à proportion que cette cauſe eſt forte, ou foible. Sa tranſpiration.

Il y a eu dans la Nature humaine un motif bien puiſſant, pour forcer le ſang à ſortir avec la *lymphe* & la ſeroſité, par les pores de la peau. Il n'y avoit qu'un homme-Dieu qui pût produire un effet ſi éton- Effet prodigieux & unique de la lymphe & du ſang.

CHAP. XXIX.

étonnant, par la conſideration de la perte du genre humain qu'il vouloit réparer, & de ce qu'il falloit faire pour ſatisfaire la juſtice divine, & rétablir l'homme dans le droit que le péché lui avoit fait perdre : ce qui produiſit une agonie que les douleurs de mille morts ne pouvoient égaler, & dans laquelle le corps auroit ſuccombé, ſi la Divinité n'avoit arrété, ou ſuſpendu pour quelque tems le pouvoir de la mort. Il n'y a jamais eu d'exemple que le ſang ait forcé ſes barrieres, & qu'il ſoit ſorti du corps humain aſſez abondament par les pores de la peau, pour former des ruiſſeaux capables d'arroſer la terre. Il n'apartenoit qu'à un Dieu ſauveur, qui vouloit le répandre juſqu'à la derniere goute pour les hommes, de produire un tel effet. Quelle idée peut-on concevoir de la perplexité de ſon ame, & de l'agitation de ſon cœur dans cette occaſion!

La ſeroſité.

Ce que j'entends par l'humeur ſuperflue de la lymphe, eſt ce qu'on apelle *ſeroſité*, qui eſt bien differente de la lymphe, & qui ne doit être conſiderée, à ſon égard, que comme un excrément, ou un flegme, qui eſt néanmoins néceſſaire pour la fluidité du ſang, & des humeurs. Mais il y a toujours quelque

por-

portion de la lymphe qui s'échape, & qui ſe mêle à cette *ſeroſité*, lorſqu'elle s'évacue par les ſueurs, ſur tout dans les actions violentes, ou par la force des remèdes qui excitent à la ſueur: ce qui fait qu'après le travail, quoique l'on ſoit en pleine ſanté, & après des ſueurs abondantes, dans la maladie, le corps ſe trouve épuiſé & affoibli par la perte exceſſive de cette lymphe. CHAP. XXIX.

Les *ſueurs* ont été néanmoins toujours eſtimées très ſalutaires pour la ſanté du corps humain. C'eſt pour cela que l'on a inventé des jeux & des exercices penibles & laborieux, pour les procurer, & que les bains & les étuves étoient ſi fort en uſage chez les *Romains*. L'évacuation ſuperflue de la ſeroſité dans pluſieurs eſpèces de maladies, eſt très néceſſaire, & arrive quelquefois fort à propos, par des criſes qui ſurviennent aux malades, & qui leur ſauvent la vie. La néceſſité de provoquer la *ſueur*, fait qu'on donne aux malades des ſudorifiques qui ont de bons effets, en faiſant tranſpirer la ſeroſité, qui emporte ſouvent avec elle la cauſe de la maladie. Cette maniere de traiter les malades, quand on a des remèdes efficaces pour agir au dedans, eſt preferable à celle de leur tirer la plus grande par- Utilité de la ſueur.

CHAP. XXIX.

partie du ſang des veines ; car ſouvent on tire le bon avec le mauvais, & le malade ſe trouve, après cela, ſi foible qu'il eſt en danger de n'en pas revenir : ce qui arrive aſſez ſouvent dans les pleureſies, & dans les fluxions de poitrine, ces maladies n'étant produites que par un ſang coagulé, ou trop épais, qui ne pouvant circuler, cauſe de l'inflammation dans les poumons, ou qui s'étend, ou reflue ſur la pleure. Il ne s'agit que de faire prendre aux malades des remèdes pour le diſſoudre, tel que le ſang de bouquetin, ou, à ſon defaut, pluſieurs remèdes ſimples & faciles, dont beaucoup de gens du commun ſavent faire un uſage ſalutaire.

Cauſe des pleureſies & fluxions de poitrine.

CHAPI-

## CHAPITRE XXX.

*Explication de l'évacuation interne de la ſeroſité.*

OUtre l'évacuation ſuperflue de la *ſeroſité*, qui ſe fait par les pores de la peau, & qui vient immédiatement des veines, il y en a encore une autre interne, continuelle & néceſſaire, qui part des viſceres & des inteſtins, dont une partie ſe va rendre dans les veines, par les pores du peritoine, où une infinité de vaiſſeaux lymphatiques très deliés aboutiſſent pour la recevoir, leſquels ont, ſuivant toutes les aparences, des valvules à leur entrée, afin d'empécher ſon retour; & l'autre entre dans les pores de la veſſie, encore plus promptement que par les pores du peritoine.

Evacuation interne de la ſeroſité.

Ces *pores* de la *veſſie*, qui ſont ouverts en dehors, ont des valvules en dedans qui les ferment exactement, pour contenir l'urine qui eſt produite en partie par cette ſeroſité, & empécher qu'elle ne ſorte de la *veſſie*, lorſqu'elle y eſt

Pores de la veſſie.

CHAP. XXX.

une fois entrée. L'experience confirme cela ; car en retournant une *veſſie* de porc, elle ne peut contenir longtems l'eau dont on l'a remplie, & qui ſort par ſes pores ; au lieu qu'étant dans ſon état naturel, elle la contient toute, ſans qu'il s'en écoule une ſeule goute : ce qui prouve que la *veſſie* a des pores qui ſont ouverts en dehors, & fermés en dedans par des valvules. Cette *ſeroſité* paſſe dans les pores de la *veſſie* avec d'autant plus de facilité qu'elle a dans le corps vivant une tenſion naturelle, qui lui donne une figure ſpherique ; au lieu que dans un corps mort, elle eſt comme une poire aplatie. La *veſſie* étant ainſi tendue, la *ſeroſité* qui ſort comme une fumée, ou une vapeur ſubtile de l'eſtomac & des inteſtins, & qui remplit toute la capacité de l'abdomen, eſt forcée d'y entrer, ainſi que dans les pores du peritoine, par la contraction continuelle des muſcles de l'abdomen & du thorax. Cette vapeur ſubtile & humide, qui entre ſi aiſément dans la *veſſie*, ſe condenſe dans ſa capacité, comme les vapeurs dans un balon, ou dans le chapiteau d'un alambic : ce qui augmente le volume de l'urine qui vient des reins.

Pourquoi la ſeroſité y entre avec facilité.

De l'ex-

Lorſque les muſcles contracteurs de la

la veſſie agiſſent, pour expulſer l'*urine*, la veſſie ſe contracte, & les muſcles qui reſſerrent le ſphincter, ſont obligés de ſe dilater, pour laiſſer ſortir dehors l'*urine*, qui s'écoule par le canal de l'urèthre. Après que l'*urine* eſt ſortie, & que les muſcles contracteurs ont ceſſé d'agir ſuivant la volonté, les muſcles du ſphincter par leur action naturelle ſe reſſerrent, & la veſſie reprend ſa tenſion naturelle, comme auparavant.

CHAP. XXX. pulſion de l'urine.

Quand le corps de l'homme ſue beaucoup par le travail, ou par un tems chaud, il urine peu, parceque la ſeroſité tranſpire abondament à travers les pores de la peau, & qu'une partie ſort comme une fumée, ou une vapeur ſubtile & imperceptible, pendant que l'autre coule ſur la peau, en formant des goutes & des ruiſſeaux: au lieu que dans un tems froid, il urine beaucoup, & ne ſue point, les pores étant reſſerrés. Alors une bonne partie de la ſeroſité vaporeuſe, qui eſt renfermée & preſſée dans la capacité de l'abdomen, & du thorax, entre dans la veſſie par ſes pores, & l'autre dans les pores du peritoine, & enſuite dans les veines. Celle-ci, après être entrée dans le ſang, s'évacue dans les reins par les veines, & les arteres émulgentes, d'où

Cauſes de la differente quantité dans l'évacuation.

CHAP. XXX.

elle se rend dans la vessie par les uretaires, & sort par l'urèthre qui est le canal de l'*urine*.

Route de l'urine provenant des liqueurs aperitives.

C'est par ces voies que l'*urine* passe si promptement, quand on use des eaux minerales, ou que l'on boit du vin de *Champagne*, ou quelque autre liqueur aperitive. Toutes ces liqueurs, qui entrent dans le ventricule de l'estomac, & dans les intestins, & que l'on rend si promptement par la voie des *urines*, n'ont point circulé entierement avec le sang, ni pu se rendre en si peu de tems dans la vessie, avant que d'être changés en *urine*; comme bien des gens le prétendent. Il n'y en a que la moindre partie, la plus grande passant nécessairement par un chemin plus court, & par les mêmes voies que je viens de décrire. Il y a bien de l'aparence que cette serosité, ou *urine*, vient immédiatement de l'estomac & des intestins, & qu'elle penètre, & passe à travers leurs membranes, comme une vapeur subtile qui remplit la capacité de l'abdomen, & du thorax, à cause de l'acidité des sels qu'elle porte avec elle, lesquels font plus ouvrir les pores que dans un autre tems, & dont la plus grande partie entre dans la vessie, & la moindre dans les veines

par

CHAP. XXX.

par les pores du peritoine, d'où elle eſt déchargée dans les reins par les émulgentes, ſans être obligée de circuler avec le ſang. Il ſe fait par conſéquent dans le ventricule & les inteſtins, comme une eſpèce de leſſive, qui ſépare l'humidité ſuperflue, & les ſels volatils des alimens, qui ſont portés très promptement dans la veſſie, ſans avoir circulé avec le ſang. L'odeur des aſperges que l'on ſent en urinant, preſque auſſi-tôt après les avoir mangées, en eſt une preuve, de même que l'odeur de la violette, après avoir uſé de la terébentine, ou mangé des citrons confits des *Barbades*. On peut voir par la production du chyle, & la route du ſang que j'ai décrite, qu'il ne ſeroit pas poſſible que ces odeurs puſſent ſe manifeſter en ſi peu de tems, ſi la ſubſtance des choſes qui les produiſent, avoit tant de chemin à faire. Car quand même on ſupoſeroit que toute la maſſe du ſang auroit achevé ſa circulation en auſſi peu de tems qu'on le prétend, ce dont je ne conviens pas, il y auroit toujours beaucoup de difficulté à accorder ce ſentiment, parceque le ſang arteriel ſeroit aſſujetti à recevoir toutes les impreſſions des diverſes ſubſtances des remèdes, & des alimens; &

Des diverſes odeurs de l'urine.

CHAP. XXX.

ces impressions se faisant sentir dans toutes les parties du corps, causeroient divers accidens.

La demonstration que j'ai dessein de faire sur la route la plus courte de la serosité, qui produit une grande partie de l'*urine* en certains cas, prouvera avec évidence la certitude de ma proposition, & l'erreur où on est à cet égard.

Humidité vaporeuse nécessaire, selon son usage.

La vapeur humide, produite par la lessive qui se fait continuellement dans le ventricule & les intestins, est nécessaire pour humecter toutes les parties internes, & faciliter le mouvement qu'elles reçoivent de l'impulsion des poumons, & des muscles du thorax & de l'abdomen, & surtout pour faire rouler les intestins, & aider à l'expulsion des excrémens. Le thorax en a aussi besoin, pour faciliter le mouvement du cœur & des poumons. Le superflu de ces humidités, qui ont besoin d'être renouvellées à tout moment, & de toutes ces vapeurs qui humectent toutes les parties internes du corps, est porté dans la vessie par les conduits que j'ai décrits, & dans les veines par les pores du peritoine.

Autre usage qu'elle a & sa nécessité.

Cette *humidité vaporeuse*, si nécessaire pour humecter les parties internes, a encore un autre usage naturel qu'il est important

portant d'expliquer, ainſi que l'uſage du diaphragme, avant que de parler de l'hidropiſie produite de la même humidité, par des cauſes accidentelles & contre Nature. Cet uſage naturel de l'*humidité vaporeuſe* qui remplit la capacité du thorax, & de l'abdomen, ſe raporte à leur dilatation & contraction. Il eſt tellement néceſſaire pour ces deux actions, que ſi cette *humidité vaporeuſe* manquoit, les poumons ne pouroient dilater le diaphragme, & le diaphragme ne pouroit dilater l'abdomen. Ces deux parties n'étant point dilatées, leurs fibres demeureroient tranquiles & ſans action, & par conſéquent ne les contracteroient point. Il eſt donc néceſſaire que l'une & l'autre ſoient continuellement remplies de cette *humidité vaporeuſe*, & que la chaleur naturelle de ces parties entretienne cette vapeur humide dans ſa rarefaction, afin qu'elle humecte les viſceres, & que le ſuperflu puiſſe entrer dans les veines par les pores du peritoine qui tapiſſe la cavité de ces parties, & que l'action de l'air qui enfle les poumons, la comprime, pour faire dilater le thorax, le diaphragme & l'abdomen. CHAP. XXX.

Or l'*humidité vaporeuſe*, qui remplit la capacité du thorax, ne peut venir que Route de cette humidité.

CHAP. XXX.

de l'abdomen. Cela étant ainſi, il faut néceſſairement que le diaphragme ait des pores ouverts en dehors, & fermés par des valvules en dedans, comme ceux de la veſſie, afin que les poumons, venant à ſe dilater, faſſent dilater le thorax & le diaphragme; que ceux-ci faſſent dilater l'abdomen, & que l'abdomen, venant enſuite à ſe contracter, faſſe entrer par les pores du diaphragme dans le thorax la vapeur néceſſaire, pour y remplacer celle qui eſt entrée dans les veines, par les pores du peritoine, qui tapiſſe ſa cavité: de même que la vapeur ſuperflue de l'abdomen entre dans ceux du peritoine, qui tapiſſe la ſienne; parcequ'il eſt néceſſaire que cette vapeur humide ſoit renouvellée à tout moment. Mais comme la contraction des poumons facilite l'entrée de l'*humidité vaporeuſe* dans le thorax, & qu'elle y entre par les pores du diaphragme, qui ſe ferme pour empécher ſon retour, il ſera toujours vrai de dire que cette vapeur eſt plus rarefiée, & plus comprimée que celle qui eſt contenue dans l'abdomen, parceque la chaleur eſt plus conſiderable dans le thorax, où eſt la cauſe principale du mouvement, que dans l'abdomen où ſe produit ſon moindre effet.

CHP. XXX. De l'action du thorax.

Il eſt facile, ſur ce que je viens d'établir, de concevoir que le *thorax* ne ſe dilate point de lui-même, ainſi qu'on le prétend, & qu'il n'a que la faculté & la puiſſance de repouſſer les poumons, comme un reſſort, & d'accelerer leur contraction : encore eſt-elle aidée par la contraction de l'abdomen, qui repouſſe le diaphragme.

Cauſe de l'hidropiſie.

Il eſt facile auſſi, ſur ce principe, d'expliquer la cauſe de l'*hidropiſie* de poitrine, & celle de l'*hidropiſie* univerſelle. L'une & l'autre n'eſt produite que par un defaut de chaleur naturelle, qui cauſe le relâchement des extremités des fibres, qui ſont à l'embouchure des lymphatiques dans le peritoine. Ces fibres manquant de force pour comprimer l'humidité vaporeuſe qui les remplit, & la ſeroſité qui en eſt formée ne pouvant être pouſſée dans les veines, pour s'évacuer avec les urines & la ſueur, elle ſe condenſe dans le thorax : ce qui forme l'*hidropiſie* de poitrine ; & de même dans l'abdomen, l'*hidropiſie* du bas ventre. On conçoit aiſément que la même cauſe, qui produit le relâchement des fibres du peritoine, produit auſſi le relâchement des fibres de toutes les autres parties du corps : ce qui facilite l'exten-

CHAP. XXX.

sion de l'*hidropisie*. Mais parceque la chaleur naturelle, qui étoit répandue également partout, avant l'*hidropisie*, s'est retirée & referrée dans les viscéres, & dans les glandes qui produisent les fluides nécessaires à la dissolution des alimens qu'elle absorbe, ou qu'elle échauffe avec excès par ses forces trop réunies, qui y causent une sechereſſe habituelle, cela fait que les hidropiques sont toujours alterés, & veulent boire sans cesse: ce qui les conduit à l'*hidropisie* universelle.

Hidropisie universelle.

L'*hidropisie universelle* commence ordinairement par les pieds, les jambes, & les cuisses, parceque la serosité superflue & trop abondante, qui ne peut s'évacuer par les voies ordinaires, à cause de ce relâchement des fibres, court & s'insinue dans toutes les parties du corps, remplissant les interstices des fibres des muscles & des membranes, qui sont relâchés par le defaut de la chaleur naturelle. Elle court aussi sous la peau, entre cuir & chair; ensorte qu'elle vient à un tel point, qu'il n'y a presque pas une partie qui n'en soit inondée, & surtout le bas ventre dans lequel toutes ces eaux refluent, ou tombent comme dans leur

refer-

reſervoir. Ces eaux continuant leur progrès, forment le comble de l'*hidropiſie univerſelle*, tellement qu'on ne les peut vuider que par la ponction, qui eſt un moyen & un remède très équivoque pour la guériſon du malade, ainſi que l'évacuation que l'on provoque par des vomitifs violens, qui diminuent en quelque ſorte l'*hidropiſie*, ou l'enflure, mais qui ne l'ôtent pas tout à fait; car elle revient preſque auſſi-tôt, & quelquefois plus conſiderable qu'elle n'étoit auparavant; ce qui fait qu'on recommence les operations, tant qu'à la fin le malade ſuccombe & meurt.

Remèdes efficaces contre cette maladie.

Cela n'ariveroit pas, ſi on ſe ſervoit de remèdes capables de ranimer la chaleur naturelle, afin de rendre aux fibres leur premiere vigueur, & diſſiper les obſtructions, en faiſant couler & évacuer le ſuperflu de la ſeroſité par les voies naturelles & ordinaires, & en évacuant auſſi en même tems les humeurs ſuperflues & nuiſibles, par des purgatifs convenables, afin que les ſucs, & les fermens des glandes, leſquels aident aux digeſtions & à la production du chyle, puſſent, étant bien dégagés, rétablir la maſſe du ſang, moyennant de bonnes nouritures, & un bon régime,

CHAP. XXX.

regime, à mesure que la cause de la maladie se dissiperoit, par la vertu & l'efficacité de ces remèdes, dont nous avons vu des experiences que l'on ne peut révoquer en doute, sur plusieurs malades, à quelqu'un desquels on avoit fait la ponction, & qui ont été parfaitement gueris.

## CHAPITRE XXXI.

### *De l'urine, & des parties deſtinées à ſa ſéparation, & à ſon évacuation.*

L'Urine qui vient du ſang par les reins, & celle qui vient par la leſſive qui ſe fait dans l'eſtomac, contiennent beaucoup d'eau & de ſel volatil, un peu de ſoufre & de *ſel fixe*. Le *ſel fixe*, qui reſte dans les excrémens, contient interieurement un eſprit igné, dont on peut faire des phoſphores, auſſi bien qu'avec le *ſel fixe* de l'urine. Le *ſel fixe* des excrémens eſt celui qui reſte de la diſſolution des alimens, lequel n'a pu entrer dans la compoſition du chyle & du ſang, à cauſe du peu de tems qu'il a ſéjourné dans les lieux où il a paſſé & où ſe font les digeſtions ; de ſorte qu'il n'a pu ſe diſſoudre, & changer ſa nature en celle de l'homme, en paſſant trop vite par un excès de fluidité, ou parceque les ſucs, ou fermens qui aident à la digeſtion & diſſolution des alimens, n'ont pas été aſ-

Du ſel fixe de l'urine & des alimens.

ſez

CHAP. XXXI.

sez abondans, par le defaut de la mastication.

Description des reins.

Les *reins*, dans lesquels se sépare l'urine, sont deux visceres rougeâtres, de la figure d'une fève, situés un à chaque côté des lombes. Leur partie concave est tournée en dedans, & leur convexe en dehors. Ils sont ordinairement couverts de deux membranes, & d'une grande quantité de graisse. Leurs veines se rendent à la veine cave, & leurs arteres viennent de l'aorte. Ces arteres & ces veines se nomment émulgentes. Elles percent les *reins* dans leur partie concave. Elles sont renfermées dans une même membrane, & se partagent en plusieurs branches qui environnent le bassinet. Ces branches se divisent en une infinité d'autres plus petites, qui vont se rendre à l'exterieur des *reins*, où elles s'anastomosent, & forment une espèce de nœud, ou de lacis, d'où partent leurs extremités qui vont se terminer dans une infinité de petites glandes. Ces glandes, qui sont d'une figure ronde, composent la substance exterieure des *reins*, qui a environ un demi pouce d'épaisseur. On observe un petit conduit long, qui sort de chacune de ces glandes. Ces conduits composent la substance interieure des

*reins*,

*reins.* A meſure qu'ils aprochent du baſſinet, ils s'uniſſent en petits paquets, dont les extremités percent la membrane du baſſinet, dans les éminences de ſa partie concave. C'eſt par ces conduits que l'urine ſe filtre & paſſe, pour entrer dans le baſſinet. Ils ſe nomment les mamelons. Le baſſinet eſt une cavité ſituée au milieu du *rein*, & formée par la dilatation des uretaires. Il a pluſieurs productions par leſquelles les conduits urinaires ſont partagés en dix ou douze paquets, qui forment une eſpèce de capſule pour les vaiſſeaux ſanguins. CHAP. XXXI.

Les reins ſervent à ſéparer l'*urine* d'avec le ſang, que l'on prétend venir de l'artere aorte deſcendante, & être pouſſé par le mouvement du cœur dans les arteres émulgentes. On prétend encore que celles-ci le portent dans la ſubſtance exterieure des reins; que la ſeroſité, s'y étant ſéparée, entre dans l'orifice de chaque conduit urinaire, qui va de l'exterieur des reins dans le baſſinet; que de là, l'*urine* coule par les uretaires dans la veſſie, & que le ſang arteriel qui a été porté dans les reins, pour les vivifier, après y avoir dépoſé ſa ſeroſité ſuperflue, rentre dans les veines émulgentes, pour continuer ſa route & ſa circulation. Opinion generale ſur l'origine & la route de l'urine.

Par

CHAP. XXXI.

Cette opinion examinée & combatue.

Par le raiſonnement que je fais ici, qui eſt conforme au ſentiment commun, il paroît que toute l'*urine*, qui ſe ſépare dans les reins, ne vient que par les arteres émulgentes, & non par les veines, qui ſemblent, ſuivant ce raiſonnement, n'être deſtinées uniquement qu'à reporter le ſurplus du ſang dans la veine cave, ainſi que cela ſe fait dans toutes les autres parties du corps. Mais nous avons ſur cela une idée toute differente ; car quoiqu'il ſoit conſtament vrai, que le ſang des arteres rentre dans les veines, & que la même choſe ſe faſſe dans les reins, ce n'eſt pas une conſéquence que toute l'*urine*, qui vient s'y rendre, ſe ſépare du ſang arteriel qui vient des arteres émulgentes. Nous demeurons bien d'accord que quelque portion de la lymphe, & de la ſeroſité, s'en ſépare, & qu'elle peut bien augmenter un peu le volume de l'*urine* ; mais nous croyons en même tems que la plus grande partie de cette *urine* reflue des veines émulgentes. Cela eſt aiſé à concevoir par tout ce que j'ai déja dit de la perfection du ſang des arteres, lequel ſoufriroit du déchet dans ſa qualité, par le flux trop abondant de la ſeroſité qui produit l'*urine*, ſur tout quand on uſe des eaux minerales, & des liqueurs aperitives: car en comparant le

ſang

ſang des arteres avec celui des veines, on trouve entre l'un & l'autre une très grande difference. Le ſang des arteres eſt dépouillé de toutes les impuretés, qu'il avoit contractées dans l'origine des veines. Il eſt animé & vivifié de nouveau, & auſſi pur en ſortant du cœur qu'il le peut être. Ainſi il n'a rien qui ne ſoit bon, & qui ne convienne à ſa nature, pour conſtituer l'eſſence des parties du corps qu'il vivifie, qu'il alimente, & qu'il entretient; & par conſéquent cette abondance de ſeroſité qui fait l'*urine*, ne lui peut convenir en aucune ſorte.

Sentiment plus naturel & plus vraiſemblable.

Ce n'eſt donc pas dans le ſang des arreres qu'il faut chercher la ſource de cette ſeroſité, mais plutôt dans celui des veines; car le ſang des veines, qui eſt dépouillé de la plus grande partie de ce qu'il avoit de bon, a contracté, à ſon origine, ce qu'il a de mauvais, qu'il porte avec lui, comme un fardeau nuiſible, & qu'il doit dépoſer en chemin avec la ſeroſité ſuperflue de toutes les parties du corps, qui vient s'y mêler, ſoit qu'elle vienne de la dépuration du chyle, ou de la leſſive de l'eſtomac & des inteſtins, laquelle entre dans les veines par les pores du peritoine: de ſorte

CHAP. XXXI.

que la veine cave, & toutes ſes branches en étant gonflées, cette ſeroſité, qui eſt plus ſubtile que le ſang, doit refluer & s'évacuer néceſſairement en quelque lieu, avant que le ſang ſoit porté au cœur. Or ce ne peut être ailleurs que dans les reins, par les veines émulgentes, parceque les reins ſont très proches de la veine cave. C'eſt donc par ces deux veines que la ſeroſité ſuperflue ſe ſépare du ſang, qui eſt plus groſſier. L'*urine*, qui ſe rend dans chaque baſſinet des reins, coule par les uretaires dans la veſſie, où elle ſe joint à celle qui y entre par ſes pores, parcequ'elle eſt le réceptacle & le reſervoir commun de toute l'*urine*: ce qui n'enterrompt en aucune ſorte le cours du ſang vers le cœur par la veine cave aſcendante. Au contraire elle le facilite, en le dépouillant de ce qui peut lui être nuiſible, l'*urine* le chariant & l'emportant avec elle.

Il eſt facile de concevoir, par toute cette diſcuſſion, que toute l'*urine*, qui vient dans les reins, & dans la veſſie, n'a point circulé avec le ſang, comme on le prétend, & que celle qui vient ſi promptement, & ſi abondament, lorſqu'on uſe des eaux minerales, ou que l'on boit des liqueurs aperitives, ne peut

être

être portée dans les reins & dans la veſſie, par d'autres voies que celles que je viens d'expliquer, & qui me paroiſſent les plus courtes, les plus certaines & les plus naturelles. CHAP. XXXI.

Lorſqu'il y a dans le ſang quelque impureté qui vient d'un principe pierreux que la ſeroſité charie dans les reins, & que cette impureté eſt capable de faire obſtruction dans les petits conduits capillaires où paſſe l'urine, ou qu'elle vient dans le baſſinet en aſſez grande quantité, pour boucher tout d'un coup l'uretaire, & former le commencement d'une *pierre*, qui empêche l'écoulement de l'urine, il ſe fait pour lors un reflux du ſang des veines, lequel remonte dans l'eſtomac, & cauſe des vomiſſemens, & en même tems une irritation dans les parties du bas ventre, laquelle les reſſerre, & arrête l'écoulement des excrémens: ce qui contribue auſſi au vomiſſement. Pendant ce tems-là on reſſent de très grandes douleurs, qui continuent juſqu'à ce que la *pierre*, qui bouche le canal de l'uretaire, dans laquelle elle ſe forme, comme dans un moule, ſoit deſcendue & tombée dans la veſſie. Cette maladie, qu'on apelle *colique nefrétique*, ne finit que quand la *pierre* eſt ſortie par De la pierre & des accidens qui la ſuivent.

CHAP. XXXI.

l'urèthre. Cette *pierre* s'arrête quelquefois dans la veſſie, quand elle eſt trop groſſe, & qu'elle ne peut emboucher & paſſer par le canal. Elle y groſſit par pluſieurs couches qui ſe forment à meſure, & devient une *pierre* conſiderable, dont on ne peut être delivré qu'en ſe faiſant tailler. On peut néanmoins prévenir ce mal, & en ôter la cauſe, en purifiant le ſang & les humeurs, par des remèdes convenables qui ayent la vertu de ſéparer le pur de l'impur, & d'évacuer du corps tout ce qui en peut troubler l'harmonie.

## CHAPITRE XXXII.

### *Des glandes contre Nature, & des croissances accidentelles du corps humain.*

LA Nature suit son intention pour le bien dans ses productions : elle tend toujours à la perfection du sujet qu'elle veut former, ou réparer. Il n'y a que les accidens qui mettent obstacle à la fin qu'elle s'est proposée : & ce sont ces accidens qui donnent naissance à tant de monstres qui se produisent à nos yeux, & à tant de maladies dont le corps humain est affligé. Tout ce qui est contraire à la Nature produit le mal, ou un principe vicieux, dont la source funeste vient du péché du premier homme. Ce principe vicieux n'a d'autre effet que d'empécher l'intention de la Nature, & d'autre fin que la ruine du sujet, ou de la créature qu'elle a produit, parcequ'un mauvais principe change ce qu'il a de bon en mal ; en sorte que ce qui étoit destiné à procurer, ou entretenir la santé, & la

Des accidens contraires au cours de la Nature.

CHAP. XXXII.

vie du corps, devient, par la force superieure du principe vicieux qui domine, un poiſon nuiſible, ou mortel qui le détruit peu à peu, & qui enfin lui donne la mort.

Glandes contre Nature.

Telles ſont les *glandes contre Nature*, qui ſe forment dans les viſceres, ou dans les autres parties interieures & exterieures du corps humain, par la corruption des fermens qui produit le vice du ſang, & de la lymphe. Cette corruption tire ordinairement ſon principe d'un mauvais régime, ou de la mauvaiſe nourriture; quelquefois des nourices, ou de la mauvaiſe conſtitution des peres & des meres; quelquefois d'une copulation déréglée, qui influe un *virus* verolique, & quelquefois auſſi de l'intemperie d'une demeure mal ſaine, d'un air contagieux, ou de quelque autre cauſe que ſe puiſſe être.

Leur formation.

Le commencement de ces *glandes* vient de l'obſtruction qui arrive dans quelque partie, par une mauvaiſe cauſe, qui empêche que le ſang n'y circule, pour les animer & les vivifier, n'y aïant que la lymphe, ou la ſeroſité, qui y puiſſe avoir accès, à cauſe de leur ſubtilité. Cette lymphe, ou ſeroſité, qui a contracté le vice du ſang, porte continuellement

ment avec elle une ſubſtance terreſtre & viſqueuſe, qu'elle charie & dépoſe dans chacune de ces parties affectées, qui groſſiſſent à meſure qu'il y vient de cette mauvaiſe ſubſtance, & qui deviennent par la ſuite des *glandes* conſiderables, dans leſquelles il ſe forme quelquefois des reſervoirs, qui ſe rempliſſent d'une ſubſtance encore plus mauvaiſe, par un dégré de malignité qu'elle y acquiert, & qu'elle dépoſe dans les parties où leurs conduits excrétoires s'inſerent. Cette ſubſtance, ou ce mauvais ferment, gâte & corrompt tout ce qu'il touche, dans les lieux où il paſſe, & où il fait ſon ſéjour. CHAP. XXXII.

Quelquefois il ſe forme de ces mauvaiſes *glandes*, qui ont leur inſertion & leur conduit excrétoire dans l'œſophage, dans l'eſtomac, & dans les inteſtins, où elles dégorgent une humeur mauvaiſe qui corrompt le chyle. Quelquefois ces conduits, ou ces fiſtules, ſe manifeſtent au dehors, comme celles qui s'ouvrent autour de l'anus. Leurs effets.

C'eſt de ces mauvaiſes *glandes* que ſe forment les ſquirres, & les autres *croiſſances contre Nature*, qui ſont ſouvent les cauſes d'une mort prochaine, que l'on ne peut éviter, quelque remède que l'on Croiſſances contre Nature, & monſtrueuſes.

CHAP. XXXII.

puiſſe faire, quand une fois elles ſont venues à un certain point. Il y a de ces *croiſſances* qui viennent ſous la peau, & qui forment les loupes. D'autres pouſſent leurs productions ſur la peau; ce qui defigure les perſonnes qui les ont, ſurtout quand elles ſont placées ſur les parties qui ſe voyent. On a vu de ces *croiſſances* accidentelles & contre Nature, d'une groſſeur énorme, telle qu'eſt celle que l'on voit à *Paris*, dans le cabinet de Mr. *Deſnoües*, Auteur des anatomies de cire colorées, laquelle fut trouvée dans le ventre d'une femme, & qui contenoit dans ſa cavité près de cinquante pintes d'eau. On prétend que cette *croiſſance* avoit eu ſon principe d'un vaiſſeau lymphatique, qui s'étant fermé à ſon extremité par quelque accident, s'étoit allongé, & avoit cru juſqu'à cette monſtrueuſe groſſeur, avec des veines & des arteres répandues ſur toute ſa ſurface externe. On trouve de même des rameaux d'arteres, & de veines, ſur d'autres *glandes & croiſſances contre Nature*, qui s'allongent & ſe communiquent, à meſure qu'elles croiſſent. Alors le ſang, ne pouvant les penétrer, à cauſe de leur denſité, & de la groſſeur de ſes globules, ſe répand par une infinité de petits rameaux

meaux ſur leur ſurface externe, parceque la Nature, toujours agiſſante, s'efforce autant qu'elle peut de ranimer les parties, pour les rétablir. Mais ſi l'art ne vient à ſon ſecours, elle ne fait au contraire qu'augmenter le mal, au lieu de le diminuer, ou de le détruire.

Ecrouelles, ou humeurs froides.

Du nombre de ces mauvaiſes *glandes* ſont celles que l'on apelle ſcrophulaires, *humeurs froides*, ou *écrouelles*, qu'aucun médicament topique ne ſauroit faire aboutir, ni ſupurer, parcequ'étant privées du principe de vie, il ne ſe peut faire dans ces *glandes* de fermentation, pour les diſſoudre: ce qui les gueriroit par une ſupuration louable, à moins que cette fermentation ne ſoit excitée par l'uſage d'un remède efficace pris intericurement, lequel ait la vertu de purifier le ſang. Cela n'eſt pas impoſſible à trouver, ou à découvrir, puiſque nous en avons vu pluſieurs experiences. Mais ces remèdes ſont rares, & peu connus. Il n'apartient qu'à ceux qui connoiſſent la Nature plus particulierement que le vulgaire, de les apercevoir. Ceux-là ſuivent ſes voies, & ſavent faire uſage des moyens qu'el-

CHAP. XXXII.

le leur fournit, pour rendre la ſanté aux corps languiſſans, & la vie à ceux à qui la mort ſemble être prochaine, & inévitable.

Les cancers, & leurs progrès.

Nous comprenons dans le nombre de ces mauvaiſes *glandes*, les *glandes* ſquirreuſes, qui viennent plus ordinairement dans les mamelles, que dans les autres parties. Ces *glandes*, à cauſe du progrès de leur humeur, ſont les plus dangereuſes, & paſſent pour incurables. Cette eſpèce de *glande*, qui dégenere en *cancer*, commence ſans douleur, & ne paroît d'abord que comme un pois, ou une noiſette. Mais enſuite elle croît aſſez vîte, & devient fort douloureuſe. Son principe vient des obſtructions qui ſe forment par un ſang limoneux, & melancolique, lequel produit une tumeur dure, inégale, raboteuſe, ronde & immobile, de couleur cendrée, livide ou plombée, environnée de pluſieurs veines aparentes, & tortues. Elle reçoit la cauſe de ſon progrès d'une humeur viſqueuſe, terreſtre & ſaline, que la lymphe & la ſeroſité y aportent continuellement; le ſang ne pouvant y circuler, pour la diſſiper, ou la détourner: de ſorte que cette humeur s'étend en long,

en

en large, & en épaiſſeur; & l'humeur maligne qui la forme, mange, détruit, & corrompt tout ce qu'il y a de bon, qu'elle change en mal: ce qui fait long-tems languir, & cauſe enfin la mort. CHAP. XXXII.

CHAPI-

## CHAPITRE XXXIII.

### *Des productions vermineuſes du corps humain.*

Formation des vers dans le corps humain.

L'Homme renferme en lui-même un principe vermineux, & mortel, fruit funeſte du péché, qui ſe produit & ſe manifeſte par la corruption de la ſubſtance materielle des alimens dont il ſe nourit, & par celle de ſa propre ſubſtance, ſoit qu'il ſoit vivant, ou qu'il ſoit mort. Il ſe produit dans le corps vivant des *vers*, de la ſubſtance des alimens qui forment le chyle. Il s'en produit auſſi dans les chairs, & dans les fluides; mais leur principe eſt dans la propre ſubſtance de ſon être. Tous ces *vers*, de quelque figure & nature qu'ils puiſſent être, ne s'engendrent point ſans œufs; & vraiſemblablement ils ont tous un ſemblable & même principe dans les animaux, comme dans l'homme. Ce principe eſt l'eſprit univerſel qui eſt ſpécifié & déterminé en chacun d'eux, par les principes

cipe des formes, ainſi que nous l'avons expliqué ailleurs. Mais comme ce principe univerſel étoit deſtiné à donner l'être à tout, en formant des œufs qui devoient contenir leur ſemence, pour produire des fruits purs & parfaits, avant la chute de l'homme, le péché, qui a été la cauſe de cette chute, a formé de ce même eſprit univerſel un principe de corruption, qui n'a produit que des fruits de mort. Ces fruits de mort ont produit de ce même principe des principes vermineux, qui n'avoient d'autre fin que la deſtruction, & la mort de chaque ſujet : de ſorte que le principe de tous les animaux, qui a commencé par des œufs & des vers, finit de même par des œufs & des vers. Tel eſt le principe & la fin dans la Nature corrompue : ce qui doit être un grand ſujet d'humiliation pour l'homme, bien capable d'abatre ſon orgueil, & un puiſſant motif pour le détourner d'idolâtrer un corps, qui doit être la pâture des *vers*. CHAP. XXXIII.

Les *vers*, qui ſe produiſent dans l'eſtomac, & dans les inteſtins, ont leur principe, ou leurs œufs, dans les alimens, & tirent leur production des mauvais fermens, & des ſucs gâtés & corrompus des Principe de vers dans les alimens.

CHAP. XXXIII.

des humeurs, leſquels en ſont la cauſe occaſionnelle.

Vers de differente figure & eſpèce.

On en trouve de differentes figures & eſpèces. Il y en a qui ſont ſinguliers, plâts comme des rubans, longs de dix, vingt & trente pieds, que l'on apelle *vers ſolitaires*, parcequ'on prétend qu'il n'y en a jamais qu'un ſeul dans le corps où il ſe produit. Il y a de ces *vers ſolitaires* qui ont la tête ſi petite, qu'elle n'excède pas la groſſeur d'un petit pois, avec un cou de ſept à huit pouces de long, qui s'élargit inſenſiblement juſqu'à ſa plus grande largeur, qui eſt d'environ un demi pouce, plus ou moins. Il y en a d'autres qui ont la tête auſſi large que le corps: d'autres qui ont des interſtices plus ſerrés, & d'autres plus grands, dont les figures ne ſont pas partout ſemblables. Il y a de ces *vers ſolitaires* qui, en vieilliſſant dans les inteſtins, deviennent tout velus. Il y a d'autres eſpèces de vers qui ſont ſemblables aux vers de terre, c'eſt-à-dire ronds par le corps, pointus aux deux extremités, longs de ſix, huit & dix pouces. Il eſt rare qu'il ne s'en trouve qu'un ſeul. Il en ſort quelquefois quinze & vingt de cette eſpèce, plus ordinairement dans les enfans, que dans les gran-

grandes perſonnes. Il s'en produit encore dans certains corps, d'une eſpèce ſinguliere, qui ſont gros comme une paille, & qui n'ont pas un pouce de long, & la tête auſſi groſſe que le corps: ceux-là ſont en grand nombre. Il s'en trouve d'autres plus petits dans les excrémens, leſquels ſont de differentes eſpèces & figures. Tous ces *vers*, qui ſont formés avec le chyle, s'en nouriſſent. C'eſt pourquoi ils ſont tous de ſa couleur, & ont eu leur principe dans les alimens. CHAP. XXXIII.

Il ſe produit auſſi des *vers* dans le ſang, la lymphe, la ſeroſité, l'urine, dans la ſubſtance du cerveau, dans celle de l'épine, dans les viſceres, la moelle des os, dans les dents, dans les chairs, & dans la peau. Tous ces *vers* s'engendrent des œufs qui ſe forment de la ſubſtance de l'homme. On peut voir leurs differences dans le Traité que le celèbre Mr. *Andry*, à preſent Doyen de la Faculté de Médecine de *Paris*, a fait *de la generation des vers* dans le corps humain. Vers qui ſe produiſent en differens lieux.

Il ſe produit auſſi des *vers* dans le corps humain d'une eſpèce ſi petite, qu'on ne peut les apercevoir qu'avec le microſcope. Tels ſont ceux que l'on obſerve dans la *gangrene* en un nombre pro- Vers de la gangrene.

CHAP. XXXIII.

prodigieux. Ces petits *vers* de la *gangrene*, qui rongent & penètrent la chair vive, à meſure qu'ils ſe multiplient, ne peuvent être arrétés dans leur progrès que par le retranchement de la partie affligée, ou affectée, qui eſt noire & livide, & qu'il faut ôter juſqu'au vif; car pour peu qu'il en reſte, les *vers* qui y ſont ſe multiplient en peu de tems à l'infini, ainſi que l'a remarque le P. *Kirker*, qui raporte qu'aïant mis ſur une feuille de papier blanc un de ces petits *vers* venimeux, qui corrompent la chair, en la rongeant, il en produiſit cinquante autres dans l'eſpace d'un *Miſereré*. Ainſi le plus ſûr eſt de retrancher la partie juſqu'au vif, lorſqu'elle eſt une fois attaquée de la *gangrene*. L'eſprit de vin, ou l'eau de chaux, dont on ſe ſert pour achever de diſſiper cette vermine, ne ſont pas toujours des remèdes efficaces pour arréter ſon progrès. Il y a un remède plus certain, lequel pris interieurement a la vertu d'arréter le progrès de la *gangrene*. Mais ce remède n'a pas encore été rendu public. Les *vers* de cette eſpèce ne ſont produits que parceque le principe de vie n'a pu avoir accès dans les parties obſtruées, & attaquées par la

*gan-*

*gangrene*, à cauſe que l'obſtruction a fermé le paſſage au ſang arteriel : de ſorte que le principe univerſel qui y eſt ſpécifié, n'étant point ranimé par ſon ſemblable qui eſt libre, forme ces œufs & ces vers gangreneux, par la fermentation qui ſe fait dans cette partie : ce qui produit ce nombre prodigieux de *vers*, leſquels augmentent le progrès de la *gangrene*, à meſure qu'ils ſe multiplient, & cauſent enfin la mort en peu de tems, ſi on manque d'y aporter les remèdes qui conviennent, dont le plus ſûr eſt de couper tout ce qui eſt atteint de ce venin. CHAP. XXXIII.

Les *vers*, qui ſe produiſent de la corruption du corps mort de l'animal, ont leur principe dans ſa propre ſubſtance. L'eſprit univerſel, qui y a été ſpécifié, fixé & déterminé, pendant qu'il étoit vivant, n'étant plus ranimé par ſon ſemblable, ſe dégage, dans la corruption qui ſurvient par la fermentation qui ſe fait dans les chairs par le moyen des fluides, & produit ce nombre prodigieux de vers qui rongent juqu'aux os le corps de l'animal, tant que les fluides, qui les ont fait naître & qui leur ſervent de véhicule, ſubſiſtent. Vers produits de la corruption du corps mort.

La matiere de ce dernier Chapitre, qui termine ce premier Traité que je donne au Public, eſt je l'avoue bien Tableau de la miſere de l'homme.

CHAP. XXXIII.

humiliante, & bien desagréable ; mais je n'ai pu me dispenser d'en faire mention, aïant entrepris d'expliquer l'homme materiel, tel qu'il est dans son principe, & dans sa fin. J'ai donc cru devoir lui mettre devant les yeux le tableau de sa propre misere, pour lui faire remarquer ses imperfections, & sa fin encore plus humiliante que la bassesse rampante de son origine, commune avec les plus vils insectes, & cela pour rabatre son orgueil, & l'humilier par la vue du principe de la corruption de sa nature, qui est le péché; pour lui en donner de l'horreur par celle de la mort qui en est une suite, & qui se termine à la poussiere du tombeau, reste funeste de la pouriture & des vers; & pour lui faire connoître son néant, & qu'il n'est que cendre & que poussiere ; qu'il n'a rien dans la matiere de son être qui ne lui soit commun avec celle des autres animaux, & que tout ce qu'il y a de bon en lui, & tout le bien qu'il peut faire, entre les deux termes de son principe & de sa fin, ne peut venir que de son Créateur, lequel seul il doit honorer, puisque de lui il tient tout. L'homme n'a donc d'autre ressource que de travailler à sauver la meilleure partie de lui-même, qui est son ame créée pour le ciel, où

où il doit tendre de toutes ſes forces, par le bon uſage des graces naturelles & ſurnaturelles qui lui ſont accordées par celui qui l'a créé, qui a créé toutes choſes pour lui, qui l'a voulu & qui le veut ſauver, pour le faire rentrer dans ſon droit à la vie éternelle, que le péché lui a fait perdre. CHAP. XXXIII.

FIN.

# TABLE DES MATIERES.

## A.

*Accouchement*. Son terme, 213. Ce qu'il faut pour qu'il ſoit heureux, 214.

*Air*. Qualités & figure de ſes corps, 17. Ses propriétés, 18. Son action ſur les poumons, 46, 53. Son impulſion combien néceſſaire, 47. Sa force ſur les vaiſſeaux ſanguins, 55.

*Ame*. Remarques ſur celle de l'homme, 2. Sept propriétés qu'elle a, *ibid*. Son union, avec le corps, 5. Combien elle en dépend, *ibid*. Comment elle fait agir le corps, 104-105. Reſide en chaque muſcle, 107. Abſurdité du mouvement qu'on lui attribue, 108-109. Quand infuſe dans le fœtus, 212-213.

*Alimens*. Néceſſité de leur tranſmutation, 118-119. Liqueur qui ſert d'aliment au fœtus, 221-222. Sel fixe des alimens, 285.

*Amnios*. Voy. *Membranes*. Sa deſcription & ſa formation, 215.

*Aorte*. Sa deſcription, 71. Ses ſouclavieres, *ibid.* Productions de l'aorte deſcendante, 72-73.
*Artere*. Uſage de l'artere bronchiale dans le fœtus, 53. Et dans les adultes, 54. Deſcription de l'artere pulmonaire, 61, 70. Arteres décrites en general, 66. Leurs membranes, *ibid.* Arteres, principes des veines, 67. Explication de la pulſation des arteres, 68. Leurs fibres, cauſe du mouvement du ſang, 69. Arteres carotides, 72. Arteres capillaires, 75. Arteres *ſpermatiques*. Voy. ce mot. Naiſſance des arteres dans le fœtus, 212.

B.

*Bile*. Celle du foie, 126. Du fiel, 127. Du pore biliaire, 129.
*Biliaire* (Pore). Sa deſcription, 128.
*Bras*. Leur deſcription, 34.

C.

*Canal inteſtin*. Sa deſcription, 38. Ses membranes, 39.
*Cancer*. Deſcription de cette maladie, 298.
*Cerveau*. Sa deſcription, 31-32.
*Chiennes*. Quand elles ſont coupées n'appètent plus la copulation, 232.
*Chorion*. Voy. *Membranes*. Sa deſcription, 215.
*Chyle*. Ce que c'eſt, 145. Son uſage, *ibid.* Dégrés par leſquels il parvient à ſa perfection, 146.
*Cœcum*. Deſcription de cet inteſtin, 42.
*Cœur*. Sa deſcription, 57. Ses deux oreillettes,

tes, 58. Ses deux ventricules, 59. Leur difference, 60. Uſage du ventricule droit, *ibid.* Et du gauche, 64. Fibres du cœur, 61. Ses deux mouvemens, 64. Il eſt cauſe du mouvement du ſang, 69. Méchanique du cœur & de ſes oreillettes, 81. Son inaction dans le fœtus, 219.

*Colon.* Deſcription de cet inteſtin, 43.

*Conception.* Comment ſe fait, 168, 194-195. Ce qui la fait manquer, 195. Son hiſtoire, 210-220. Erreur du vulgaire ſur ce ſujet, 235. Conception de pluſieurs enfans, 236.

*Corps.* Ses principes fondamentaux, 2. Ses deux ſubſtances, *ibid.* Parties diverſes qu'elles forment, 3. Cauſe de leurs differences, 3-4. Son union avec l'ame, 5. Combien il en dépend, *ibid.* Eſt le modele des autres créatures, 7. Materiaux des corps, 8. Diviſion de celui de l'homme, 29.

*Couleurs.* D'où vient la difference de celles de l'homme & de la femme, 244. Et des divers peuples du monde, 245-246.

*Crâne.* Sa deſcription, 30.

*Créatures.* Elles étoient incorruptibles avant le péché d'Adam, 10. Et le redeviendront au dernier jour par le feu, *ibid.* Dépendent réciproquement les unes des autres, 81. On doit reſpecter les parfaites, 170. Combien eſt admirable leur difference, 239.

*Cuiſſes.* Leur deſcription, 35.

## D.

*Difference.* D'où vient celle qu'il y a dans les créatures, 239-244. Et entre les hom-

hommes, 246-247. 255-256, &c. Entre les parens & leurs enfans, 253.
*Digeſtion.* Erreurs des Modernes à ce ſujet, 116-117. Refutées, 117.
*Diſſimilaires.* Parties du corps nommées ainſi, 3.
*Dos.* Sa deſcription, 33-34.
*Droit.* Côté droit plus privilégié que le gauche, 249-250, *& ſuiv.*
*Duodenum.* Sa deſcription, 40.

## E.

*Eau.* Un des principes fondamentaux du corps, 2. Ses qualités & propriétés, 18.
*Ecrouelles.* Difficiles à guerir, 297.
*Elemens.* Ce que c'eſt que les élemens ſimples, 9. Et les compoſés, 10. Trois principes produits par eux, 10-11. 19. Leur nature, 15. Le ſecours qu'ils ſe prètent, 19. Trois figures parfaites qui s'y trouvent, *ibid.* Ils ſont les premiers principes materiels, 119.
*Engendrer.* Remarques ſur la puiſſance actuelle d'engendrer, 186-187. Pourquoi certaines perſonnes, ſoit débauchées, ou ſages, n'engendrent point, 196.
*Epididymes.* Leur ſituation, & leur ſubſtance, 177. Leurs productions, *ibid.*
*Eſprit univerſel.* Ce que c'eſt, 9, 21-22. Un des principes de la production des Mixtes, 21. Comment introduit dans les animaux, 22. Dans les végétaux, *ibid.* Dans les mineraux, 23. Sa definition & ſon origine, *ibid.* Son action dans les animaux, 24. Dans les végétaux, 25. Ses productions infi-

nies, 26. Par quoi déterminé à produire telle ou telle choſe, 26-27. Tend à la perfection, & pourquoi n'y arrive point, 27.
*Eſtomac.* Sa deſcription, 37. Ses membranes, 38. Son uſage, *ibid.*

## F.

*Feu.* Ses propriétés, 16. Ses divers dégrés de chaleur, *ibid.*
*Fibres.* Leur nature & leurs effets, 47. En quoi different d'un reſſort, *ibid.* Comparées avec les vers de terre, 48. Celles du cœur, 61. Leur étendue, 62.
*Fiel* (Veſicule du). Sa conſtruction, 125. Effets de ſa contraction, *ibid.* Expliqués, 126. Ses glandes & ſa bile, 127. Ses effets à l'égard de la bile, *ibid.* Ses vaiſſeaux lymphatiques, 128. Sa contraction extraordinaire, cauſe du premier accès de fièvre, 133.
*Fièvres.* Principes des fièvres réglées, 132. Origine des accidens qui en préviennent le premier accès, 132-134. Pourquoi le ſecond accès eſt pire que le premier, 135. Accidens des autres accès, 136. Faute des Médecins à ce ſujet, 137. Remède propoſé par l'Auteur, 138-139.
*Fluides.* Ce qui eſt compris ſous ce nom dans le corps, 3.
*Fluxions.* Cauſe de celles de poitrine, 272.
*Fœtus.* Hiſtoire de ſa formation, 210-220. Sa nutrition, ſituation, & ſes differences d'avec les adultes, 221, *& ſuiv.* Cauſe des fœtus doubles, 236.

*Formes.*

*Formes*. Leurs principes, 8. Ne produiſent ſeules rien d'achevé, 8-9.
*Foie*. Sa deſcription, 123. Ses vaiſſeaux lymphatiques, 124. Uſage de la bile qu'il envoie, 126.

## G.

*Gangrene*. Vers de cette maladie, 303. Leur multiplication prodigieuſe, 304. Remède contre la gangrene, *ibid*.
*Generation*. Conſtruction admirable des parties qui y ſont deſtinées, 165. Propriétés de ces parties, 166. Leurs diſpoſitions à la production de l'eſpèce, 166-167. Leurs effets en general, 167. Leur éloge, 168-169. Cauſe de leur duplicité, 247, *& ſuiv*.
*Germes* (faux). Leur formation, 236.
*Glandes*. Deſcription des glandes ſimples, 110. Et des glandes conglomerées, 111. Les glandes ſont des Matrices, *ibid*. Uſages de celles qui ſont deſtinées à la digeſtion, 112, *& ſuiv*. Glandes maxillaires, 114. Sublinguales, *ibid*. Amygdales, 115. Celles des joues & de la langue, *ibid*. De l'œſophage, 115. Et de l'eſtomac, 116. Uſage des fermens des glandes, 120. Glandes inconnues, 159. Celles des mamelles, 160. Des articulations des os, 162. Leur uſage, *ibid*. Glandes contre Nature, 294.
*Gout*. Uſage du ſang arteriel pour le gout, 99.
*Groſſeſſe*. Cauſe de ſes ſymptômes, 213.

## H.

*Homme*. Sa definition, 1. Chef-d'œuvre du Créateur, 4. A la connoiſſance duquel il conduit, *ibid.* Raport entre lui & les autres créatures, 7. Sa miſere, 305.
*Humidité*. Uſage de l'humidité vaporeuſe du corps, 278 - 279. Sa route, 279-280.
*Hydropiſie*. Cauſe de cette maladie, 281. Deſcription de l'hydropiſie univerſelle, 282. Comment il faudroit la traiter, 283.

## I.

*Jejunum*. Sa deſcription, 41.
*Iléon*. Sa deſcription, 41-42.
*Iliaque*, double, l'interne & l'externe, 74. Leurs productions, *ibid.*
*Iliaques* (veines). Leur diviſion, 153.
*Inclinations*. D'où naiſſent celles de l'homme, 24. Cauſe de la difference de celles des deux ſexes, 233. Et des divers individus. Voy. *difference*.
*Inteſtins*. Comment diviſés, 39.

## L.

*Lactées* (veines). Leur deſcription, 141. Leur uſage, 142. Lactées ſecondes, *ibid.* Reçues dans le reſervoir du chile, 143.
*Lait*. Comment ſe forme, 160. Nouriture convenable à l'enfant, 161-162. L'épanchement en eſt dangereux, 162. Quand il prend ſon cours par les mamelles, 215.

*Lan-*

*Langue.* Sa deſcription, 33.
*Lobes.* Voy. *Poumons.*
*Lymphe.* Son uſage, 100, 268. Sa tranſpiration, 101, 269. Sa definition, 258. Son utilité, *ibid.* Ses divers noms, 259. Ses effets, 260, 268. Erreurs à ſon ſujet, 262, 265. Son excellence, 262, 266. Elle eſt la ſource de la perfection du chyle, 266. Où elle reçoit ſon être, *ibid.* Néceſſité indiſpenſable dont elle eſt, 268. Remarques ſur cette ſueur de J. C. où elle ſortit avec le ſang, 269-270.

M.

*Macher.* Combien avantageux de bien mâcher, & pernicieux de ne le pas faire, 113.
*Mâchoires.* Leur deſcription, 31.
*Maladies.* Deſſein de l'Auteur d'en donner un Traité, 157.
*Mamelles.* Leur deſcription, 160. Comment le lait s'y forme, *ibid.* Pourquoi elles groſſiſſent dans la groſſeſſe, 161.
*Mamelon.* Sa deſcription, 160.
*Matiere.* Son union avec la ſubſtance de l'homme, 120.
*Matrice.* Sa ſituation, 190. Sa figure & ſon étendue, 191. Ses fibres & l'eau qu'elle contient dans la groſſeſſe, 191-192. Son orifice, 192-193. Col de la matrice, *ibid.* Origine des arteres, veines & nerfs de la matrice, 196-197. Ses ligamens & leur origine, 197-198. Uſage de la matrice, 207.
*Matrices.* Il y en a de pluſieurs ſortes en cha-

chaque animal, 11. Quelles ſont celles de l'homme, 11-12. Celles de la femme, 12. Celles qui ſont communes aux deux ſexes, 13. Celles des végétaux, 13-14. Celles des mineraux, 14. Elles ſont le ſecond principe de la production des Mixtes, 21. Déterminent l'eſprit univerſel à produire plutôt une choſe qu'une autre, 26-27. Sont le principe des formes, ou differences, 119.

*Membranes.* Formation de celles qui enveloppent le fœtus, 211.

*Menſtrues.* Cauſe de leur flux, 203. Cauſe de leur abondance, 204. Et de leur inégalité, *ibid.* Remède contre leur ſupreſſion, 207. Leur terme, *ibid.*

*Monſtres.* Leurs cauſes, 237.

*Mouvement.* Dieu en a créé deux, le direct & le circulaire, 45. Effets de ce dernier dans les animaux, 45-46. Mouvement du cœur & de ſes oreillettes, 64. Cauſe du mouvement du ſang, 69. Muſcles, cauſe des mouvemens volontaires, 102.

*Muſcles.* Leur diviſion, 100. Leurs uſages, *ibid.*, & 102. Leur nature & leur forme, 102-103. Leur conſtruction & leurs noms, 103. Comment remués par l'ame, 104-105. Cauſe de leurs contractions, 105. Et de l'inſenſibilité de cette contraction, 106. Erreur des Modernes à ce ſujet, 107. Reſidence de l'ame en chaque muſcle, *ibid.*

## N.

*Nature.* Accidens contre Nature, 293.
Croiſſances contre Nature, 295.
*Nitre.* C'eſt un air congelé, 17.

## O.

*Odorat.* Uſage du ſang arteriel pour ce ſens, 99.
*Oeſophage.* Sa deſcription, 36. Ses membranes, 36-37. Ses muſcles, 37.
*Oeufs.* Ceux de l'homme comment produits, & éclos, 11-12. Ceux de la femme, 12, 200. Leur uſage pour la ſanté, 12-13. Comment fécondés, 168, 202. Membranes qui les enferment, 201. Ils tombent naturellement & quand, 202-203. Et contre Nature, 205. Et dans les animaux, *ibid.* Action de la ſemence dans l'œuf, 210. Chute de l'œuf dans la trompe de *Fallope*, & dans la matrice, 210-211. Pourquoi les œufs ne ſe forment point dans les teſticules, 230. Idée des Anciens ſur l'exiſtence des œufs, 237.
*Ombilical.* Formation des arteres & de la veine ombilicales, 216.
*Ongles.* Conjecture ſur leur origine, 163.
*Oreillettes.* Deſcription des oreillettes du cœur, 58. Leur double mouvement, 64.
*Ovaires.* Leur ſituation, 199. Leur ſubſtance, 199-200. Enfant conçu dans un ovaire, 208. Uſage des ovaires, 234-235.
*Ouie.* Uſage du ſang arteriel pour l'ouie, 98-99.

P.

*Pancréas.* Sa deſcription, 130.
*Pancréatique* (Suc). Son origine & ſon uſage, 130-131.
*Parties* du corps humain. Leur diviſion generale, 2. Autre diviſion, 29. Parties genitales. Voy. *Generation.*
*Pertes de ſang.* D'où elles viennent, 205.
*Pierre.* Accidens qui ſuivent cette maladie, 291.
*Placenta.* Voy. *Membranes.* Sa formation & ſituation, 212. Sa figure, 217.
*Pleureſies.* Leur cauſe, 272.
*Poils.* Leur origine, 163. Cauſe de leurs differences & de leurs changemens, *ibid.* Leur uſage, 164.
*Poitrine.* Sa deſcription, 33.
*Poumons.* Leur force prodigieuſe, 47, 55-56. Leur forme & conſtruction, 48, 50-51. Leurs lobes, 52. Leurs vaiſſeaux, *ibid.* Leur effet ſur le ſang par le moyen de l'air, 53, 77. Effet de leur contraction, 54, 77. Leur inaction dans le fœtus, 87, 219.
*Principes.* Les principes chymiques que forme l'action des élemens, 19. Sont la principale matiere des corps, 20. Double principe de la production des Mixtes, 21.
*Proſtates.* Deſcription de ce corps, 180. Son uſage, 181.
*Pulmonaire* (Veine). Décrite, 61. Eſt la cauſe motrice du cœur, des oreillettes du cœur, & des arteres, 79.

## R.

*Rate.* Sa deſcription, 122.
*Rectum.* Deſcription de cet inteſtin, 43-44.
*Remède.* Celui de l'Auteur dans les fièvres réglées, 138-139. Bon dans d'autres maladies encore, 140.

## S.

*Saignée.* Ne vaut rien dans les fièvres réglées avant la purgation, 137.
*Salivaire*, (Conduit) 112.
*Salive.* Glandes pour la ſalive, 112.
*Sang*, (flux de) dans l'accouchement. Son origine & ſa durée, 214.
*Semence.* Ce que c'eſt que celle de la femme, 25. Erreur des Anatomiſtes ſur l'origine de la ſemence, 152. Production de la ſemence, 167. Comment la ſemence differe du ſperme, 176. Son émiſſion comment ſe fait, 184-185. Mouvement des animaux de la ſemence ſemblable à celui des abeilles, 186. Tranquilité de la ſemence dans les teſticules, *ibid.*
*Sang.* Double cauſe de ſon mouvement, 69. Sa circulation longtemps ignorée & mal expliquée, 76. Premier principe de ſon mouvement, 77. Sa circulation entretenue par la ſyſtole & la diaſtole, 80. Son cours dans tout le corps, *ibid.* Quantité de celui qui entre & ſort du cœur, mal connue, 86. Quelle elle eſt, 87. Circulation

tion du ſang dans le fœtus, 87. Nature de celui des veines, 90. Comment il ſe perfectionne, *ibid.* Ses deux dégrés de digeſtion, & leur effet, 90-91. Difference de celui des veines, & de celui des arteres, 91-92. Uſages du ſang arteriel, 92-93. 95-96, *& ſuiv.* Moyen de rendre au ſang ſa perfection, 94. Sa circulation de la mere au fœtus & réciproquement, 217-218. Circulation differente dans le fœtus & dans les adultes, 219-220.

*Seroſité.* Ce que c'eſt, 270-271. Son évacuation interne, 273.

*Similaires.* Parties nommées ainſi proprement & improprement, 3.

*Sperme.* Comment il differe de la ſemence, 176.

*Splenique* (Rameau). Sa deſcription, 154-155.

*Sterilité.* Cauſes qui la produiſent en diverſes ſortes de perſonnes, 196. Autres cauſes, 206.

*Sueur.* Celle de J. C. au jardin des Olives, 269-270. Utilité des ſueurs, 271.

*Surdité.* D'où elle vient, 99.

## T.

*Terre.* Qualités, figure, & propriétés de cet élement, 18-19.

*Teſticules.* Leur conſtruction, 175-176. pourquoi vaſculeux & glanduleux, 176.

*Tête.* Celle de l'homme conſiderée en general, 29. Ses parties exterieures & interieures, 29-30.

*Thorachique.* (Canal). Sa deſcription, 144. Ses valvules, *ibid.* Sa ſituation, 145.
*Thorax.* Sa deſcription, 33. Ne ſe dilate point de lui-même, 281.
*Toucher.* Uſage du ſang arteriel pour ce ſens, 99.
*Trachée Artere.* Sa deſcription, 49. Ses cartilages, 50.

## V.

*Vagin.* Deſcription de ce canal, 188. Ses fibres, 189. Son uſage, 190.
*Vaiſſeaux.* Changement des vaiſſeaux lymphatiques en vaiſſeaux ſanguins, 88-89. Néceſſité de la contraction des vaiſſeaux biliaires, 124. Vaiſſeaux lymphatiques du foye, 124-125. Vaiſſeaux deferens, 178. Pourquoi leurs orifices ſon étroits, 178-179. Vaiſſeaux ſpermatiques des femmes, 199.
*Végétation.* Comment elle ſe fait, 25.
*Veines.* Veine pulmonaire. Voy. *pulmonaire.* Veines lactées. Voy. *lactées.* Principe des veines, 67. Leur nature & leur diviſion principale, 148. Leurs tuniques, *ibid.* Leurs valvules, 149. Veines coronaire, azygos, ſouclavieres, & jugulaires, comment ſituées, 150. Veines émulgentes, 152. Spermatiques, *ibid.* Iliaques. Voy. ce mot. Meſenteriques, 155-156. Naiſſance de la veine ombilicale, 212.
*Veine cave.* Veine cave deſcendante, 150. Et veine cave aſcendante, 151.
*Veine porte.* Sa deſcription, 154, *& ſuiv.* Origine de pluſieurs maladies, 156.

*Ventre.* Sa deſcription, 34.
*Ventricules.* Deſcription de ceux du cœur, 59-60. Leur uſage, 60, 64. Trois obſervations à leur ſujet, 84-85.
*Verge*, décrite, 181-182. Ses arteres & ſes veines, 183. Effet de l'eſprit de vie ſur elle, 183.
*Vers.* Leur formation dans le corps humain, 300. Ont leurs principes dans les alimens, 301. Leurs différentes figures & eſpèces, 302. Diverſes parties du corps où ils ſe trouvent, 303. Vers de la gangrene, 303. *& ſuiv.* Vers produits de la corruption du corps mort, 305.
*Vers* ſpermatiques, 11-12, 168, 177. Sont le principe de la forme humaine, 208. Leur changement de forme, 208-209. Leur multitude & mouvement, 232.
*Vertus.* Principe phyſique de celles de l'homme, 250. Et de la femme, 251. Comment l'un & l'autre peut avoir les vertus des deux ſexes, 252.
*Veſicules ſeminaires.* Leur deſcription, 179. Leurs diverſes parties, 180. Leur action, 184. Cauſes du ralentiſſement de leur mouvement, 185. Veſicules ſeminaires de la femme, & leur uſage, 193. Comment elles concourent à la conception, 195.
*Veſſie.* Ses pores, 273. Pourquoi la ſeroſité y entre, 274.
*Vices.* Leurs ſources, 254.
*Vie.* Source de la vie du fœtus & des adultes, 217.
*Vomitifs.* Meilleurs que la ſaignée dans les fièvres réglées, 137.

*Urèthre.* Deſcription de ce canal, 182. Uſage de ſes glandes, 182-183.
*Urine.* Cauſes de ſon expulſion, 274. Et de la differente quantité de ſes évacuations, 275. Sa route, 276. Ses diverſes odeurs, 277. Ses ſels fixes, 285. Opinion generale ſur ſon origine & ſur ſa route, 287. Examen de cette opinion, 288. Sentiment de l'Auteur, 289.
*Vue.* Uſage du ſang arteriel pour la vue, 96. Pourquoi les enfans nouveau-nés n'ont pas l'uſage de la vue, 97. Pourquoi elle s'affoiblit & ſe perd, *ibid.*

*Fin de la Table des Matieres.*